

สำหรับเวียนขอความเห็นผู้เกี่ยวข้อง

(ร่าง)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

(ฉบับที่ ..) พ.ศ.

ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒

เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๕)

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาหารที่มีสารพิษตกค้าง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๖ (๒) และ (๓) แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกความใน (๒) (๓) และ (๔) ของข้อ ๔ แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๒) พบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits; MRLs) ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี้ ได้ไม่เกินข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)

กรณีไม่มีข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme) พบได้ไม่เกินข้อกำหนดของอาเซียน (ASEAN MRLs)

(๓) กรณีนอกเหนือจาก (๑) และ (๒) พบได้ไม่เกินค่าดีฟอลต์ลิมิต (default limit) สำหรับพืชและสัตว์ ๐.๐๑ มิลลิกรัมสารพิษตกค้างต่อกิโลกรัมอาหาร เว้นแต่ค่าดีฟอลต์ลิมิต (default limit) สำหรับพืชและสัตว์ที่มีการกำหนดไว้เฉพาะในบัญชีหมายเลข ๓ แนบท้ายประกาศนี้

(๔) ไม่พบปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous Maximum Residue Limits, EMRLs) เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศนี้ กรณีนอกเหนือจากบัญชีหมายเลข ๔ แนบท้ายประกาศนี้ พบได้ไม่เกินข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme)

กรณีไม่มีข้อกำหนดของคณะกรรมการอาหารของโครงการมาตรฐานอาหาร เอฟ เอ โอ/ดับบลิว เอช โอ (Codex Alimentarius Commission, Joint FAO/WHO Food Standards Programme) พบได้ไม่เกินข้อกำหนดของอาเซียน (ASEAN EMRLs)”

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

ข้อ ๒ ให้ยกเลิกบัญชีหมายเลข ๒ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit; MRL) แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๓๙๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๒) และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔๔๙) พ.ศ. ๒๕๖๗ ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. ๒๕๒๒ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ และให้ใช้บัญชีหมายเลข ๒ แนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๓ ให้ยกเลิกบัญชีหมายเลข ๓ ดีฟอลต์ลิมิต (default limits) สำหรับพืช และบัญชีหมายเลข ๔ ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL) แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ ๓๘๗ พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้บัญชีหมายเลข ๓ และ ๔ แนบท้ายประกาศนี้แทน

ข้อ ๔ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่

แนบท้าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 5)

บัญชีหมายเลข 2

ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limits, MRLs)

แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
1	2,4-ดี (2,4-D)	ผลรวมของ 2,4-ดี (sum of 2,4-D)	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.2
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	1
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1
			ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	2,4-ดี (2,4-D) (ต่อ)	ผลรวมของ 2,4-ดี (sum of 2,4-D) (ต่อ)	ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.01
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.05
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.05
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริก หนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.1
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.2
			สับปะรด (pineapple)	0.05
			อ้อย (sugar cane)	0.05
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	2,4-ดี (2,4-D) (ต่อ)	ผลรวมของ 2,4-ดี (sum of 2,4-D) (ต่อ)	กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2
2	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเน็บ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเน็บ, มาเน็บ และแมนโคเซ็บ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb)	ไดไทโอคาร์บาเมตทั้งหมด วิเคราะห์และรายงานผลเป็น คาร์บอนไดซัลไฟด์ (total dithiocarbamates, determined and expressed as CS ₂)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นกลุ่มย่อย ส้มเปลือกอ่อน และกลุ่มย่อยส้ม เปลือกไม่อ่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (group of citrus fruits, except subgroup of mandarins and subgroup of oranges, sweet, sour)	2
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่อ่อน ทั้ง เปรี้ยวและหวาน (รวมทั้งลูกผสมที่ คล้ายส้มเปลือกไม่อ่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	2
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกอ่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	10
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.2
			กระเทียม (garlic)	0.5

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเน็บ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเน็บ, มานีบ และแมนโคเซ็บ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb) (ต่อ)	ไดไทโอคาร์บาเมตทั้งหมด วิเคราะห์และรายงานผลเป็น คาร์บอนไดซัลไฟด์ (total dithiocarbamates, determined and expressed as CS ₂) (ต่อ)	กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	0.5
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	1.5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	1.5
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	3
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.15
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.1
			คะน้า (broccoli, Chinese)	15
			เงาะ (rambutan)	0.6
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	1
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	10
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเน็บ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเน็บ, มานี็บ และแมนโคเซ็บ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb) (ต่อ)	ไดไทโอคาร์บาเมตทั้งหมด วิเคราะห์และรายงานผลเป็น คาร์บอนไดซัลไฟด์ (total dithiocarbamates, determined and expressed as CS ₂) (ต่อ)	แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.5
			แตงโม (watermelon)	1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.1
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำ ใน ฝัก) หรือเอดามามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.2
			ทุเรียน (durian)	2
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.1
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	0.5
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป่ายซ่าย (Chinese cabbage (type Pe- tsai))	5
			ผักบุ้ง และผักบุ้งจีน (water spinach and water convolvulus)	0.3
			เผือก (taro)	0.1
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริก หนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	1.5
			พริกหวาน (รวมทั้งพืเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเน็บ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเน็บ, มานี็บ และแมนโคเซ็บ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb) (ต่อ)	ไดไทโอคาร์บาเมตทั้งหมด วิเคราะห์และรายงานผลเป็น คาร์บอนไดซัลไฟด์ (total dithiocarbamates, determined and expressed as CS ₂) (ต่อ)	พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
			ฟักทอง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (pumpkins, several cultivars)	0.2
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	2
			มะม่วง (mango)	2
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.2
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์ และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.5
			ลำไย (longan)	15
			ลิ้นจี่ (litchi)	15
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	5
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.1
			หอมแดง (shallot)	0.2
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.5
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	กลุ่มไดไทโอคาร์บาเมต ได้แก่ ซีเน็บ, ซีแรม, ไทแรม, โพรพิเน็บ, มานีบ และแมนโคเซ็บ (dithiocarbamates such as zineb, ziram, thiram, propineb, maneb and mancozeb) (ต่อ)	ไดไทโอคาร์บาเมตทั้งหมด วิเคราะห์และรายงานผลเป็น คาร์บอนไดซัลไฟด์ (total dithiocarbamates, determined and expressed as CS ₂) (ต่อ)	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
3	กลูโฟซิเนต (glufosinate)	ผลรวมของกลูโฟซิเนต, กรด 3- [ไฮดรอกซี(เมทิล)ฟอสฟิโน ออล] โพรพิโอนิก และ เอ็น- อะซีทิล- กลูโฟซิเนต คำนวณ เป็นกลูโฟซิเนต (กรดอิสระ) {sum of glufosinate, 3- [hydroxy(methyl)phosphi noyl]propionic acid and N-acetyl glufosinate, calculated as glufosinate (free acid)}	กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่ เปลือกบริโภคได้ (group of assorted tropical and sub-tropical fruits: edible peel)	0.1
			กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่ เปลือกบริโภคไม่ได้ ยกเว้นกล้วย และกีวีฟรุต (group of assorted tropical and sub-tropical fruits: inedible peel, except banana and kiwifruit)	0.1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	กลูโฟซิเนต (glufosinate) (ต่อ)	ผลรวมของกลูโฟซิเนต, กรด 3- [ไฮดร็อกซี(เมทิล)ฟอสฟิโน ออล] โพรพิโอนิก และ เอ็น- อะซีทิล- กลูโฟซิเนต คำนวณ เป็นกลูโฟซิเนต (กรดอิสระ) {sum of glufosinate, 3- [hydroxy(methyl)phosphi nol]propionic acid and N-acetyl glufosinate, calculated as glufosinate (free acid)}	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.05
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.1
			กีวีฟรุต และลูกผสม (kiwifruit and hybrids)	0.3
			ข้าว (rice)	0.9
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.1
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.3
			แครอท (carrot)	0.05
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	2
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.5
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	0.1
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริก หนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.15
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.1

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	กลูโฟซิเนต (glufosinate) (ต่อ)	ผลรวมของกลูโฟซิเนต, กรด 3- [ไฮดร็อกซี(เมทิล)ฟอสฟิโน ออล] โพรพิโอนิก และ เอ็น- อะซีทิล- กลูโฟซิเนต คำนวณ เป็นกลูโฟซิเนต (กรดอิสระ) {sum of glufosinate, 3- [hydroxy(methyl)phosphi nonyl]propionic acid and N-acetyl glufosinate, calculated as glufosinate (free acid)}	สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	0.3
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.4
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
			อ้อย (sugar cane)	0.2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	3
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
4	คลอร์ฟินาเพอร์ (chlorfenapyr)	คลอร์ฟินาเพอร์ (chlorfenapyr)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นกลุ่มย่อย ผลไม้จำพวก เลมอนและไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (group of citrus fruits, except subgroup of lemons and limes (including citron))	1.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	คลอร์ฟินาเพอร์ (chlorfenapyr) (ต่อ)	คลอร์ฟินาเพอร์ (chlorfenapyr) (ต่อ)	กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอน และไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (subgroup of lemons and limes (including citron))	0.8
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแดง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.3
			กระเทียม (garlic)	0.01
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.5
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.08
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	3
			มะม่วง (mango)	0.3
			มันเทศ (sweet potato)	0.05
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	คลอร์ฟินาเพอร์ (chlorfenapyr) (ต่อ)	คลอร์ฟินาเพอร์ (chlorfenapyr) (ต่อ)	หอมแดง (shallot)	0.01
			หอมแบ่ง (หัว) (multiplier onion, bulb)	0.01
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.02 (fat)
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วย นม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.6
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.03
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.6 (fat)

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
5	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole)	คลอแรนทรานิลิโพรล (ละลายในไขมัน) [chlorantraniliprole (fat soluble)]	กลุ่มผักบรีโคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	0.6
			กลุ่มผักบรีโคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.3
			กลุ่มผักใบ ยกเว้นกลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (group of leafy vegetables, except subgroup of leaves of Brassicaceae)	20
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นกลุ่มย่อยธัญพืชจำพวก ข้าวโพดหวาน และข้าว (group of cereal grains, except subgroup of sweet corns and rice)	0.02
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลบแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.3
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	11
			กระเทียม (garlic)	0.3
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.15
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.04
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.4

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) (ต่อ)	คลอแรนทรานิลิโพรล (ละลายในไขมัน) [chlorantraniliprole (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
			คะน้า (broccoli, Chinese)	4
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	3
			ถัวยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.8
			ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) without pods (succulent seeds))	0.05
			ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (peas with pods (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) (pods and succulent seeds))	2
			ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ด ที่ อวบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) immature pods and succulent seeds)	0.8
			ทุเรียน (durian)	0.7

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) (ต่อ)	คลอแรนทรานิลิโพรล (ละลายในไขมัน) [chlorantraniliprole (fat soluble)] (ต่อ)	น้ำมันเมล็ดในปาล์ม (ดิบ) (palm kernel oil, crude)	0.05
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้ง ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	25
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.8
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
			มะพร้าวแก่ (coconut)	0.02
			มะม่วง (mango)	4
			ลำไย (longan)	4
			ลิ้นจี่ (litchi)	2
			สะระแหน่ หรือมินต์ ชนิดต่าง ๆ และลูกผสม (mint, species and hybrids)	15
			หอมแดง (shallot)	0.3
			หอมแบ่ง (หัว) (multiplier onion, bulb)	0.3
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.3
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	1
			อ้อย (sugar cane)	0.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	คลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantraniliprole) (ต่อ)	คลอแรนทรานิลิโพรล (ละลายในไขมัน) [chlorantraniliprole (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.2
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.08
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วย นม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.2
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.07
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	0.2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
6	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil)	พืช: คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) สูตร: 2,5,6- ไตรคลอโร-4- ไฮดรอกซีไอโซฟทาโลไนไตรล์ (2,5,6- trichloro-4- hydroxyisophthalonitrile)	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (group of pulses, except soya bean (dry))	1
			กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมัน ฝรั่งชนิดต่าง ๆ, และฮอร์สแรดิช (group of root and tuber vegetables, except potato, and horseradish)	0.3
			กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอก กระจุก แน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	5
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผล นอกเหนือจากกลุ่มแตง - จำพวก มะเขือ (subgroup of eggplants)	7
			กระเทียมต้น หรือลี้ก (leek)	15
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.1
			คะน้า (broccoli, Chinese)	5
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	10
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	3
			แตงโม (watermelon)	5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) (ต่อ)	พืช: คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) สัตว์: 2,5,6- ไตรคลอโร-4- ไฮดรอกซีไอโซฟทาโลไนไตรล์ (2,5,6- trichloro-4- hydroxyisophthalonitrile) (ต่อ)	ถัวยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	2
			ถั่วงอก (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	7
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.2
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อบน้ำ ใน ฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	2
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป่ายซาย (Chinese cabbage (type Pe- tsai))	1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	5
			มะม่วง (mango)	1
			มันฝรั่ง ชนิดต่าง ๆ (potato)	0.2
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.05
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์ และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	2
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	5
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1.5
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) (ต่อ)	พืช: คลอโรทาโลนิล (chlorothalonil) สัตว์: 2,5,6- ไตรคลอโร-4- ไฮดรอกซีไอโซฟทาโลไนไตรล์ (2,5,6- trichloro-4- hydroxyisophthalonitrile) (ต่อ)	กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วย นม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.07
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก ยกเว้นหนัง สัตว์ปีก (group of avian, edible offal of, except avian skin)	0.07
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
			กลุ่มนม (group of milks)	0.07
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
			หนังสัตว์ปีก (avian, skin)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
7	คลีโทดิม (clethodim)	พืช: ผลรวมของคลีโทดิม และ เมแทบอลิต์ที่สามารถคำนวณ กลับให้อยู่ในรูปไดเมทิล 3-[2-(เอทิลซัลโฟนิล) โพรพิล]- เพน ตะนไดเอท (ดีเอ็มอี) และ ได เมทิล 3-[2-(เอทิลซัลโฟนิล) โพรพิล]-3-ไฮดร็อกซี เพนตะน ไดเอท (ดีเอ็มอี-โอเอช) รายงาน ผลเป็น คลีโทดิม (sum of clethodim and its metabolites convertible to dimethyl 3-[2-(ethylsulfonyl)propyl]- pentanedioate (DME) and dimethyl 3-[2-(ethylsulfonyl) propyl]-3- hydroxy-pentanedioate (DME-OH), expressed as clethodim) สัตว์: ผลรวมของคลีโทดิม และ เมแทบอลิต์ที่สามารถคำนวณ กลับให้อยู่ในรูปดีเอ็มอี รายงานผลเป็นคลีโทดิม (ละลายในไขมัน) (sum of clethodim and its metabolites convertible to DME, expressed as clethodim (fat soluble))	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	10
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	5
			หอมแบ่ง (หัว) (multiplier onion, bulb)	0.5
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.2
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.2
8	ควินคลอแร็ค (quinclorac)	ควินคลอแร็ค รวมกับคอนจู เกตของควินคลอแร็ค (ละลาย ในไขมัน) [quinclorac plus quinclorac conjugates (fat soluble)]	ข้าวกล้อง (rice, husked)	10
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	8
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	10

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ควินคลอแร็ค (quinclorac) (ต่อ)	ควินคลอแร็ค รวมกับคอนจู เกตของควินคลอแร็ค (ละลาย ในไขมัน) [quinclorac plus quinclorac conjugates (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วย นม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05 (fat)

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
9	ควินโตซีน (quintozene)	พืช: ควินโตซีน (quintozene) สัตว์: ผลรวมของควินโตซีน, เพนตะคลอโรแอนิลีน และ เมทิลเพนตะคลอโรฟีนิลซัลไฟด์ รายงานผลเป็นควินโตซีน (sum of quintozene, pentachloroaniline and methylpentachlorophenyl sulphide, expressed as quintozene)	กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือ เบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.02
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	0.1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ราก หรือ เหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	2
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
10	คาร์บาริล (carbaryl)	คาร์บาริล (carbaryl)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	15
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	1
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (subgroup of leaves of Brassicaceae)	1
			กระถิน (ใบ) (white lead tree, leaves)	0.02
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	1
			ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.1
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	คาร์บาริล (carbaryl) (ต่อ)	คาร์บาริล (carbaryl) (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.1
			ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	10
			เงาะ (rambutan)	1
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	3
			แตงโม (watermelon)	1
			ทุเรียน (durian)	30
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.02
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.5
			พริกหวาน (รวมทั้งพริกเมียนโด) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	5
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	คาร์บาริล (carbaryl) (ต่อ)	คาร์บาริล (carbaryl) (ต่อ)	มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูก ต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	1
			มะพร้าวแก่ (coconut)	1
			มะม่วง (mango)	3
			มังคุด (mangosteen)	20
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.1
			เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (cashew nut)	1
			ถั่ว (peanut)	0.02
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เมล็ดถั่วเหลือง (castor bean)	0.05
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	2
			แมคคาเดเมีย (macadamia nut)	1
			ลำไย (longan)	20
			ลิ้นจี่ (litchi)	1
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	15

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	คาร์บาริล (carbaryl) (ต่อ)	คาร์บาริล (carbaryl) (ต่อ)	องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.5
			อ้อย (sugar cane)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
11	คาร์เบนดาซิม, เบนอิมิล หรือ ไทโอฟา เนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate- methyl)	ผลรวมของคาร์เบนดาซิม, เบนอิมิล และไทโอฟาเนต-เมทิล รายงานผลเป็นคาร์เบนดาซิม (sum of carbendazim, benomyl and thiophanate- methyl, expressed as carbendazim)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	2
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	2
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.5
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.5
			ถั่วลันเตา (เมล็ดที่อวบน้ำ) (garden pea (succulent seeds))	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	คาร์เบนดาซิม, เบนโนมิล หรือ ไทโอฟา เนต-เมทิล (carbendazim, benomyl or thiophanate- methyl) (ต่อ)	ผลรวมของคาร์เบนดาซิม, เบนโนมิล และไทโอฟาเนต-เมทิล รายงานผลเป็นคาร์เบนดาซิม (sum of carbendazim, benomyl and thiophanate- methyl, expressed as carbendazim) (ต่อ)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
			มะม่วง (mango)	5
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.1
			ลำไย (longan)	0.5
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.5
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3
12	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	ผลรวมของคาร์โบซัลแฟน และ คาร์โบฟูราน รายงานผล เป็น คาร์โบซัลแฟน (sum of carbosulfan and carbofuran, expressed as carbosulfan)	ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.03
			ถัวยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.04
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.03
			มะม่วง (mango)	0.015

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan) (ต่อ)	ผลรวมของคาร์โบซัลแฟน และ คาร์โบฟูราน รายงานผล เป็น คาร์โบซัลแฟน (sum of carbosulfan and carbofuran, expressed as carbosulfan) (ต่อ)	มังคุด (mangosteen)	1
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.03
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.3
			อ้อย (sugar cane)	0.03
13	แคปแทน (captan)	แคปแทน (captan)	กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล ยกเว้นแอปเปิล, แพร์, สาลี่ หรือสาลี่ จีน หรือไชนีสแพร์, สาลี่หิมะ, และ พลับภูญี่ปุ่น (group of pome fruits, except apple; pear; pear, Oriental or Chinese pear; snow pear; and persimmon, Japanese)	15
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้ง พ룬สด) (subgroup of plums (including fresh prunes))	6
			ข้าวบาร์เลย์ (barley)	0.05
			ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.01
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำ ในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	แค็ปแทน (captan) (ต่อ)	แค็ปแทน (captan) (ต่อ)	ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.07
			พลับญี่ปุ่น กากิฟรุต และพลับจีน (persimmon, Japanese; kaki fruit; and persimmon, Chinese)	6
			พีช (peach)	5
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	7
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	5
			มะม่วง (mango)	5
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.05
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	20
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	15
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	4
			แอปเปิล (apple)	7

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
14	โคลิโธอะนิดิน (clothianidin)	โคลิโธอะนิดิน (clothianidin)	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.07
			กลุ่มผักบรีโคโนผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง ยกเว้นเก๋ากี้ (group of fruiting vegetables, other than cucurbits, except goji berry)	0.05
			กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและ เมล็ดที่อบน้ำ) (group of legume vegetables, except beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.01
			กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพดหวาน (subgroup of sweet corns)	0.01
			กลุ่มย่อยผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ (subgroup of stems and petioles)	0.04
			เก๋ากี้ (goji berry)	0.06
			เก๋ากี้แห้ง (goji berry, dried)	0.3
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.5
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.9

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โคลิโธอะนินดิน (clothianidin) (ต่อ)	โคลิโธอะนินดิน (clothianidin) (ต่อ)	ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
			ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ด ที่อวบน้ำ)	0.2
			(beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) immature pods and succulent seeds)	
			ทุเรียน (durian)	0.9
			มะม่วง (mango)	0.04
			มะละกอ (papaya)	0.01
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.2
			เมล็ดยี่หระ (cumin, seed)	1
			รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	1
			สับปะรด (pineapple)	0.01
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โคลิโธอะนินดิน (clothianidin) (ต่อ)	โคลิโธอะนินดิน (clothianidin) (ต่อ)	กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.4
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
			ตับของโค กระบือ แพะ สุกร และแกะ (liver of cattle, goats, pigs and sheep)	0.4
15	ซัลฟูริลฟลูออไรด์ (sulfuryl fluoride)	ซัลฟูริลฟลูออไรด์ (sulfuryl fluoride)	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	3
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว (group of cereal grains, except rice)	0.05
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1
			ผลไม้แห้ง (dried fruits)	0.06

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
16	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของ ไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers)] (fat soluble)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นกลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอ และเกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสม ที่คล้ายแซดด็อกและผลไม้ใกล้เคียง เกรปฟรุตประเภทอื่น) (group of citrus fruits, except subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.3
			กลุ่มผักบริเวณผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.07
			กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) และ ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบขึ้นในฝัก) (group of legume vegetables; except garden pea (immature pods) and soya bean (succulent seeds in pods))	0.7
			กลุ่มผักใบ ยกเว้นกลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (group of leafy vegetables, except subgroup of leaves of Brassicaceae)	0.7
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) (ต่อ)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของ ไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายใน ไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers)] (fat soluble) (ต่อ)	กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว, ข้าว บาร์เลย์, ข้าวโอ๊ต, ไรย์, ข้าวสาลี, ข้าวโพดเมล็ดแห้ง, ข้าวโพดฝักอ่อน, และข้าวโพดหวาน (group of cereal grains, except rice, barley, oats, rye, wheat, maize, baby corn, and sweet corn)	0.3
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและ เกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้าย แซดด็อกและผลไม้ใกล้เคียง เกรปฟรุตประเภทอื่น) (subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.5
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.03
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือ เบอร์รี่ ยกเว้นกระวาน ทั้งฝักและเมล็ด (subgroup of spices, fruit or berry, except cardamom, pods and seeds)	0.5
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือ เหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) (ต่อ)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของ ไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายใน ไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers)] (fat soluble) (ต่อ)	กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.5
			กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	0.05
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	2
			ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
			คะน้า (broccoli, Chinese)	1.5
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.05
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบขึ้น ในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	2
			ทุเรียน (durian)	1
			ใบและดอกกระเทียม (garlic, leaves and flowers)	0.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) (ต่อ)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของ ไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายใน ไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers)] (fat soluble) (ต่อ)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.2
			มะเฟือง (carambola or star fruit)	0.2
			มะม่วง (mango)	0.7
			มะละกอ (papaya)	0.5
			มันเทศ (sweet potato)	0.01
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.1
			ลำไย (longan)	1
			ลิ้นจี่ (litchi)	2
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	0.07
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.4
			หอมแดง (shallot)	0.1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไซเพอร์เมทริน (cypermethrin) (ต่อ)	ไซเพอร์เมทริน (ผลรวมของ ไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายใน ไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers)] (fat soluble) (ต่อ)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
			อ้อย (sugar cane)	0.2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat) (fat)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	2 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	0.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
17	เดลตาเมทรีน (deltamethrin)	ผลรวมของเดลตาเมทรีน และ แอลฟา-อาร์- และแทรนส์- เดลตาเมทรีน ไอโซเมอร์ต่าง ๆ (ละลายในไขมัน) (sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans- isomers) (fat soluble)	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	1
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.02
			กลุ่มผักบริเวณผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.2
			กลุ่มผักแบบฝักถั่ว (group of legume vegetables)	0.2
			กลุ่มผักใบ ยกเว้นผักกาดหอม และผักกาดเขียว หรือขุนฉ่าย (group of leafy vegetables, except lettuce, leaf; and mustard greens)	2
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกลุ่มย่อยของกะหล่ำที่มี ช่อดอกกระจุกแน่น และผักกาดขาว ปลีห่อ ชนิดป่ายช่าย (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except subgroup of flowerhead brassicas, and Chinese cabbage (type Pe-tsai))	0.1
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพด พันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (group of cereal grains, except sweet corn (corn-on- the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เดลตาเมทริน (deltamethrin) (ต่อ)	ผลรวมของเดลตาเมทริน และ แอลฟา-อาร์- และแทรนส์- เดลตาเมทริน ไอโซเมอร์ต่าง ๆ (ละลายในไขมัน) (sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans- isomers) (fat soluble) (ต่อ)	กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอก กระจุกแน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	0.1
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและ หมัก (Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented)	5
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือ เบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.03
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ราก หรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.5
			กระเทียม (garlic)	0.1
			กระเทียมต้น หรือลี้ก (leek)	0.2
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.05
			ขนุน (jackfruit)	0.2
			ข้าวโพดฝักอ่อน พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เดลตาเมทริน (deltamethrin) (ต่อ)	ผลรวมของเดลตาเมทริน และ แอลฟา-อาร์- และแทรนส์- เดลตาเมทริน ไอโซเมอร์ต่าง ๆ (ละลายในไขมัน) (sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans- isomers) (fat soluble) (ต่อ)	ข้าวสาลีโฮลมีล (wheat wholemeal)	2
			แครอท (carrot)	0.02
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.3
			ทุเรียน (durian)	0.05
			เนกทารีน (nectarine)	0.05
			แป้งสาลี (wheat flour)	0.3
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.05
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดปายช่าย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	0.5
			ผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (mustard greens)	0.5
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	0.5
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.1
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	1
			พีช (peach)	0.05
			มะกอกกินสด (table olives)	1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เดลตาเมทริน (deltamethrin) (ต่อ)	ผลรวมของเดลตาเมทริน และ แอลฟา-อาร์- และแทรนส์- เดลตาเมทริน ไอโซเมอร์ต่าง ๆ (ละลายในไขมัน) (sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans- isomers) (fat soluble) (ต่อ)	มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.3
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.3
			มะม่วง (mango)	0.3
			มะละกอ (papaya)	0.2
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
			เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (cashew nut)	0.02
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.1
			เมล็ดโกโก้หรือเมล็ดคาเคา ชนิดย่อย ต่าง ๆ (cocoa bean or cacao bean, sub-species)	0.1
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.04
			รำข้าวสาลีที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, unprocessed)	5
			แรดิช (radish)	0.01
			ลันจี (litchi)	0.05
			วอลนัต (walnut)	0.02

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เดลตาเมทริน (deltamethrin) (ต่อ)	ผลรวมของเดลตาเมทริน และ แอลฟา-อาร์- และแทรนส์- เดลตาเมทริน ไอโซเมอร์ต่าง ๆ (ละลายในไขมัน) (sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans- isomers) (fat soluble) (ต่อ)	สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.2
			สับปะรด (pineapple)	0.01
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.1
			หอมแดง (shallot)	0.1
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
			เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (Mushrooms, cultivated cultivars)	0.05
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.2
			อ้อย (sugar cane)	0.05
			แอปเปิล (apple)	0.2
			ฮาเซลนัต (hazelnut)	0.02
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.1 (fat)
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เดลตาเมทริน (deltamethrin) (ต่อ)	ผลรวมของเดลตาเมทริน และ แอลฟา-อาร์- และแทรนส์- เดลตาเมทริน ไอโซเมอร์ต่าง ๆ (ละลายในไขมัน) (sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans- isomers) (fat soluble) (ต่อ)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.03
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05 F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5 (fat)
18	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	ไดคลอร์วอส (dichlorvos)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.2
			กลุ่มพืชเครื่องเทศ (group of spices)	0.1
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว และข้าวสาลี (group of cereal grains, except rice and wheat)	0.2
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	1.5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.15
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	7
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.5
			มันเทศ (sweet potato)	0.1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดคลอร์วอส (dichlorvos) (ต่อ)	ไดคลอร์วอส (dichlorvos) (ต่อ)	เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
			รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	15
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (Group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01

อันดับ	วัตถุดิบทราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
19	ไดโคฟอล (dicofol)	พืช: ไดโคฟอล (ผลรวมของออร์โทพารา และพารา พาราไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) (dicofol (sum of o,p' and p,p' isomers)) (fat soluble) สัตว์: ผลรวมของไดโคฟอล และ 2,2-ไดคลอโร-1,1-บิส(4-คลอโรเฟนิล) เอทานอล (พารา พารา-เอฟดับเบิลยู 152) รายงานผลเป็นไดโคฟอล (ละลายในไขมัน) (sum of dicofol and 2,2-dichloro-1, 1-bis(4-chlorophenyl) ethanol(p,p' – FW 152), expressed as dicofol) (fat soluble)	กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented)	3
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	0.05
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.1
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.02
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.02
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	1
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดโคฟอล (dicofol) (ต่อ)	พืช: ไดโคฟอล (ผลรวมของออร์โท พารา และพารา พาราไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) (dicofol (sum of o,p' and p,p' isomers)) (fat soluble) สัตว์: ผลรวมของไดโคฟอล และ 2,2-ไดคลอโร-1,1-บิส(4-คลอโรเฟนิล) เอทานอล (พารา พารา-เอฟ ดับเบิลยู 152) รายงานผลเป็น ไดโคฟอล (ละลายในไขมัน) (sum of dicofol and 2,2-dichloro-1, 1-bis(4-chlorophenyl) ethanol(p,p' – FW 152), expressed as dicofol) (fat soluble)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1 F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
20	ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran)	พืช: ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) สัตว์: ผลรวมของไดโนทีฟูแรน และ 1-เมทิล-3-(เตตระไฮโดร-3-ฟูริลเมทิล) ยูเรีย (ยูเอฟ) รายงานผลเป็นไดโนทีฟูแรน (sum of dinotefuran and 1-methyl-3-(tetrahydro-3-furylmethyl) urea (UF), expressed as dinotefuran)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	1
			กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง ยกเว้นเก๋ากี้ (group of fruiting vegetables, other than cucurbits, except goji berry)	0.5
			กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) (ต่อ)	พืช: ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) สัตว์: ผลรวมของไดโนทีฟูแรน และ 1-เมทิล-3-(เตตระไฮโดร-3- ฟูริลเมทิล) ยูเรีย (ยูเอฟ) รายงานผลเป็นไดโนทีฟูแรน (sum of dinotefuran and 1- methyl-3-(tetrahydro- 3furylmethyl) urea (UF), expressed as dinotefuran) (ต่อ)	กลุ่มผักใบ ยกเว้นวอเตอร์เครส (group of leafy vegetables, except watercress)	6
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	2
			กระเทียม (garlic)	0.1
			เก๋ากี้ (goji berry)	0.6
			เก๋ากี้แห้ง (goji berry, dried)	2
			แก้วมังกร หรือพิทahaya (dragon fruit or pitaya)	5
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	2
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.3
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	8
			เซเลอรี และจีนฉ่าย (celery and Chinese celery)	0.6
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	4
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	4
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.3
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) (ต่อ)	พืช: ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran)	ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.1
		สัตว์: ผลรวมของไดโนทีฟูแรน และ 1-เมทิล-3-(เตตระไฮโดร-3- ฟูริลเมทิล) ยูเรีย (ยูเอฟ) รายงานผลเป็นไดโนทีฟูแรน (sum of dinotefuran and 1- methyl-3-(tetrahydro- 3furylmethyl) urea (UF), expressed as dinotefuran) (ต่อ)	ทุเรียน (durian)	0.7
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้ง ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
			มะม่วง (mango)	0.5
			มะละกอ (papaya)	5
			มันเทศ (sweet potato)	0.1
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.2
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.2
			ยางสด และลองกอง (langsats and duka)	5
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	3
			สละ และระกำ (salak and salacca)	5
			สับปะรด (pineapple)	0.15
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.5
			หอมแดง (shallot)	0.15

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) (ต่อ)	พืช: ไดโนทีฟูแรน (dinotefuran) สัตว์: ผลรวมของไดโนทีฟูแรน และ 1-เมทิล-3-(เตตระไฮโดร-3- ฟูริลเมทิล) ยูเรีย (ยูเอฟ) รายงานผลเป็นไดโนทีฟูแรน (sum of dinotefuran and 1- methyl-3-(tetrahydro- 3furylmethyl) urea (UF), expressed as dinotefuran) (ต่อ)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.9
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1
21.	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole)	พืช: ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) สัตว์: ผลรวมของไดฟีโนโคนา โซล และ 1-[2-คลอโร-4-(4- คลอโร-ฟีน็อกซี)-ฟีนิล]-2- (1,2,4-ไตรอะซอล)-1-อิล-เอ ทานอล รายงานผลเป็นไดฟีโน	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.03
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นกลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน (group of citrus fruits, except subgroup of mandarins)	0.6

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) (ต่อ)	โคนาโซล (ละลายในไขมัน) (sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4- chloro-phenoxy)-phenyl]- 2-(1,2,4-triazol)-1-yl- ethanol), expressed as difenoconazole) (fat soluble)}	กลุ่มผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง ยกเว้นเก๋ากี้ และพริกเผ็ด (รวมทั้ง พริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่ เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (group of fruiting vegetables, other than cucurbits, except goji berry and peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.6
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	2
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)	0.15
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.05
			กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด (subgroup of maize cereals)	0.015
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	2
			กระเทียม (garlic)	0.02
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.1
			เก๋ากี้ (goji berry)	5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) (ต่อ)	พืช: ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) สัตว์: ผลรวมของไดฟีโนโคนา โซล และ 1-[2-คลอโร-4-(4- คลอโร-ฟีน็อกซี)-ฟีนิล]-2- (1,2,4-ไตรอะซอล)-1-อีล-เอ ทานอล รายงานผลเป็นไดฟีโน โคนาโซล (ละลายในไขมัน) (sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4- chloro-phenoxy)-phenyl]- 2-(1,2,4-triazol)-1-yl- ethanol), expressed as difenoconazole) (fat soluble)} (ต่อ)	เก๋ากี้แห้ง (goji berry, dried) แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya) ข้าวกล้อง (rice, husked) ข้าวขัดสี (rice, polished) ข้าวเปลือก (rice, paddy) ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn) คะน้า (broccoli, Chinese) แครอท (carrot) เซเลอรี และจีน่าย (celery and Chinese celery) แตงโม (watermelon) ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry)) ใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) (radish leaves (including radish tops)) ผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (mustard greens) ฝรั่ง (guava)	15 0.15 0.5 0.07 8 0.01 8 0.2 3 0.02 0.1 8 5 0.15

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) (ต่อ)	พืช: ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) สัตว์: ผลรวมของไดฟีโนโคนา โซล และ 1-[2-คลอโร-4-(4- คลอโร-ฟีน็อกซี)-ฟีนิล]-2- (1,2,4-ไตรอะซอล)-1-อีเอ ทานอล) รายงานผลเป็นไดฟีโน โคนาโซล (ละลายในไขมัน) (sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4- chloro-phenoxy)-phenyl]- 2-(1,2,4-triazol)-1-yl- ethanol), expressed as difenoconazole) (fat soluble)} (ต่อ)	พริกไทย (pepper) พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars)) พริกแห้ง (peppers, chili, dried) มะม่วง (mango) มะละกอ (papaya) เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars) เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars)) ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas)) สตรอว์เบอร์รี (strawberry) หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus) หอมหัวใหญ่ (onion, bulb) องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.3 0.9 5 0.6 0.2 0.01 0.7 6 2 0.03 0.1 3

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) (ต่อ)	พืช: ไดฟีโนโคนาโซล (difenoconazole) สัตว์: ผลรวมของไดฟีโนโคนา โซล และ 1-[2-คลอโร-4-(4- คลอโร-ฟีน็อกซี)-ฟีนิล]-2- (1,2,4-ไตรอะซอล)-1-อีล-เอ ทานอล รายงานผลเป็นไดฟีโน โคนาโซล (ละลายในไขมัน) (sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4- chloro-phenoxy)-phenyl]- 2-(1,2,4-triazol)-1-yl- ethanol), expressed as difenoconazole) (fat soluble)} (ต่อ)	อะโวคาโด (avocado)	0.6
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.03
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1.5
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)
22	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph)	ไดเมโทมอร์ฟ (ผลรวมของ ไอโซเมอร์ต่าง ๆ) [dimethomorph (sum of isomers)]	กลุ่มผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	1.5
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5
			กระเทียม (garlic)	0.6
			กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	0.8
			กะหล่ำปม (kohlrabi)	0.02

อันดับ	วัตถุดิบรายการ ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) (ต่อ)	ไดเมโทมอร์ฟ (ผลรวมของ ไอโซเมอร์ต่าง ๆ) [dimethomorph (sum of isomers)] (ต่อ)	กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	6
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	1.5
			เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	15
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	9
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	9
			ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) without pods (succulent seeds))	0.15
			ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (beans without pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (succulent seeds))	0.7

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) (ต่อ)	ไดเมโทมอร์ฟ (ผลรวมของ ไอโซเมอร์ต่าง ๆ) [dimethomorph (sum of isomers)] (ต่อ)	บร็อกโคลี (broccoli)	4
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	10
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	9
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.09
			ลำไย (longan)	7
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.5
			สับปะรด (pineapple)	0.01
			หอมแดง (shallot)	0.6
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.6
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดเมโทมอร์ฟ (dimethomorph) (ต่อ)	ไดเมโทมอร์ฟ (ผลรวมของ ไอโซเมอร์ต่าง ๆ) [dimethomorph (sum of isomers)] (ต่อ)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
23	ไดเมโทเอต (dimethoate)	ไดเมโทเอต (dimethoate)	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้นกลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (group of pulses, except subgroup of dry beans)	0.01
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.7
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ลอน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ลอน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	2
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกลอน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกลอน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.1
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.05
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.03
			ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.01
			ข้าวสาลี (wheat)	0.06
			จมูกข้าวสาลี (wheat germ)	0.2
			แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.05
			ถั้วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.07
			ถั้วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.01
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.01
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.01
			มะม่วง (mango)	0.1
			มันเทศ (sweet potato)	0.1
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			รำข้าวสาลีที่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, processed)	0.3
			เรปซีด (rape seed)	0.15
			หอมแดง (shallot)	0.01
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
			อะโวคาโด (avocado)	2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.001
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.001
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.03
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.001
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.001

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	กลุ่มนม (group of milks)	0.001
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.001
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.001
	โอเมโทเอต (omethoate)	โอเมโทเอต (omethoate)	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้นกลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (group of pulses, except subgroup of dry beans)	0.01
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.08
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.015
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.02
			กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.03
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	โอเมโทเอต (omethoate) (ต่อ)	ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.01
			ข้าวสาลี (wheat)	0.03
			จมูกข้าวสาลี (wheat germ)	0.06
			แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.05
			ถัวยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.05
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.01
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.01
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.01
			มะม่วง (mango)	0.01
			มันเทศ (sweet potato)	0.05
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	โอเมโทเอต (omethoate) (ต่อ)	รำข้าวสาลีที่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, processed)	0.15
			เรปซีด (rape seed)	0.03
			หอมแดง (shallot)	0.01
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
			อะโวคาโด (avocado)	0.15
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.001
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.001
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.003
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.001
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.005
			กลุ่มนม (group of milks)	0.0015
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.001

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดเมโทเอต (dimethoate) (ต่อ)	โอเมโทเอต (omethoate) (ต่อ)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.005
24	ไดอะซินอน (diazinon)	ไดอะซินอน (ละลายในไขมัน) (diazinon) (fat soluble)	กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและ หมัก (Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented)	0.05
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือ เบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	5
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ราก หรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.5
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดอะซินอน (diazinon) (ต่อ)	ไดอะซินอน (ละลายในไขมัน) (diazinon) (fat soluble) (ต่อ)	ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.01
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.05
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.1
			ถั้วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.5
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป่ายชาย (Chinese cabbage (type Pe- tsai))	0.05
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	0.3
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.05
			พริกหวาน (รวมทั้งพื้เมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.05
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.5
			พรุณ, แห้ง (prunes, dried)	1
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไดอะซินอน (diazinon) (ต่อ)	ไดอะซินอน (ละลายในไขมัน) (diazinon) (fat soluble) (ต่อ)	มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.02
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02 F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
25	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole)	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (subgroup of beans with pods)	3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.3

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	กระเทียม (garlic)	0.1
			กระเทียมต้น หรือสีก (leek)	0.7
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	1.5
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.05
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	1
			แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya)	1
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.5
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1.5
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.6
			แครอท (carrot)	0.4

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	2
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	2
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.2
			แตงโม (watermelon)	0.1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.15
			ทุเรียน (durian)	0.02
			บร็อกโคลี (broccoli)	0.2
			พริกไทย (pepper)	0.01
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
			พริกหวาน (รวมทั้งพริกเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	1
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.7

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.1
			มะม่วง (mango)	0.05
			มะละกอ (papaya)	2
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.4
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.15
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	2
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.15
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	7
			หอมแดง (shallot)	0.15
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.15
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	ทีบูโคนาโซล (tebuconazole) (ต่อ)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
26.	โทลเฟนไพเรด (tolfenpyrad)	พืช: โทลเฟนไพเรด (tolfenpyrad) สัตว์: ผลรวมของโทลเฟนไพ เรด, กรดพีที-ซีเอ (4-[4-[(4- คลอโร-3-เอทิล-1-เมทิล-ไพรา ซอล-5-อิล)คาร์บอนิลแอมิโน เมทิล]ฟีนอกซี]เบนโซอิก และ กรดโอเอช-พีที-ซีเอ (4-[4-[(4- คลอโร-3(1-ไฮดรอกซีเอทิล) - 1-เมทิลไพราซอล-5-อิล)คาร์โบ นิลแอมิโนเมทิล] ฟีนอกซี]เบนโซอิก รายงานผล เป็นโทลเฟนไพเรด (sum of tolfenpyrad, and free and conjugated PT- CA (4-[4-[(4-chloro-3- ethyl-1-methylpyrazol-5 yl)carbonylaminomethyl] phenoxy]benzoic acid and OH-PT-CA (4-[4-[(4-chloro-	กลุ่มผักแบบหัวหอม (group of bulb vegetables)	0.09
			กลุ่มย่อยกะหล่ำตัน (subgroup of stem brassicas)	0.15
			กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว (subgroup of head brassicas)	0.15
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอน และไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (subgroup of lemons and limes (including citron))	0.4
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและ เกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้าย แซดด็อกและผลไม้ใกล้เคียง เกรปฟรุตประเภทอื่น) (subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.15

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โทลเฟนไพเรด (tolfenpyrad) (ต่อ)	3(1-hydroxyethyl) -1-methylpyrazol-5-yl]carbonylaminomethyl] phenoxy] benzoic acid), expressed as tolfenpyrad)	กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยักเว้นคะน้ำ, ผักกาดฮ่องเต้, และใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese; Chinese cabbage (type Pak-choi); and radish leaves (including radish tops), several varieties)	0.15
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.08
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.08
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.2
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.3
			ชาเขียว, แห้ง (tea, green, dried)	30
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.6
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad) (ต่อ)	พืช: โทลเฟนไพแรด (tolfenpyrad) สัตว์: ผลรวมของโทลเฟนไพ แรด, กรดพีที-ซีเอ (4-[4-[(4- คลอโร-3-เอทิล-1-เมทิล-ไพรา ซอล-5-อิล)คาร์บอนิลแอมิโน เมทิล]ฟีน็อกซี]เบนโซอิก และ กรดโอเอช-พีที-ซีเอ (4-[4-[[4- คลอโร-3(1-ไฮดร็อกซีเอทิล) - 1-เมทิลไพราซอล-5-อิล)คาร์โบ นิลแอมิโนเมทิล] ฟีน็อกซี]เบนโซอิก รายงานผล เป็นโทลเฟนไพแรด (sum of tolfenpyrad, and free and conjugated PT- CA (4-[4-[(4-chloro-3- ethyl-1-methylpyrazol-5- yl)carbonylaminoethyl] phenoxy]benzoic acid and OH-PT-CA (4-[4-[[4-chloro- 3(1-hydroxyethyl) -1- methylpyrazol-5- yl]carbonylaminoethyl] phenoxy] benzoic acid), expressed as tolfenpyrad) (ต่อ)	แตงโม (watermelon) ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods)) ใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) (radish leaves (including radish tops)) ผักกาดหัว หรือหัวไชเท้า (radish, Japanese) ผักกาดฮ่องเต้ (Chinese cabbage (type Pak- choi)) พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดชนิดต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars)) พริกหวาน (รวมทั้งพริกเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento)) พริกแห้ง (peppers, chili, dried) มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato)) มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato) กลุ่มไข่ (group of eggs) กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.04 2 1 0.03 0.1 0.5 0.15 5 0.2 0.01 0.01 0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โทลเฟนไพเรด (tolfenpyrad) (ต่อ)	พืช: โทลเฟนไพเรด (tolfenpyrad) สัตว์: ผลรวมของโทลเฟนไพ เรด, กรดพีที-ซีเอ (4-[4-[(4- คลอโร-3-เอทิล-1-เมทิล-ไพรา ซอล-5-อิล)คาร์บอนิลแอมิโน เมทิล]ฟีน็อกซี]เบนโซอิก และ กรดโอเอช-พีที-ซีเอ (4-[4-[[4- คลอโร-3(1-ไฮดรอกซีเอทิล) - 1-เมทิลไพราซอล-5-อิล)คาร์โบ นิลแอมิโนเมทิล] ฟีน็อกซี]เบนโซอิก รายงานผล เป็นโทลเฟนไพเรด (sum of tolfenpyrad, and free and conjugated PT- CA (4-[4-[(4-chloro-3- ethyl-1-methylpyrazol-5- yl)carbonylaminomethyl] phenoxy]benzoic acid and OH-PT-CA (4-[4-[[4-chloro- 3(1-hydroxyethyl) -1- methylpyrazol-5- yl]carbonylaminomethyl] phenoxy] benzoic acid), expressed as tolfenpyrad) (ต่อ)	กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วย นม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.4
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
27	ไตรไซคลาโซล (tricyclazole)	ไตรไซคลาโซล (tricyclazole)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.15
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.09
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไตรไซคลาโซล (tricyclazole) (ต่อ)	ไตรไซคลาโซล (tricyclazole) (ต่อ)	กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
28	ไตรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin)	พืช: ไตรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) สัตว์: ผลรวมของไตรฟล็อกซีส โตรบิน และ ซีจีเอ 321113 (CGA 321113) รายงานผลเป็น ไตรฟล็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) (sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble))	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.02
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.5
			กลุ่มผักบรีโภคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.3
			กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุก แน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	0.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) (ต่อ)		กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (subgroup of peas with pods)	1.5
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (subgroup of beans with pods)	0.5
			กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	0.7
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.05
			กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.5
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	1.5
			กากของกลุ่มผลไม้สกุลส้มที่ คั้นน้ำแล้ว, แห้ง (citrus pulp, dried)	1
			แก้วมังกร หรือพิทahaya (dragon fruit or pitaya)	0.6
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	5
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) (ต่อ)	พืช: ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) สัตว์: ผลรวมของไทรฟล็อกซีส โตรบิน และ ซีจีเอ 321113 (CGA 321113) รายงานผลเป็น ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) (sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)) (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.04
			ข้าวสาลี (wheat)	0.2
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.5
			แครอท (carrot)	0.1
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.7
			ถั่วเมล็ดกลมแห้ง ในสกุล <i>Pisum</i> L. ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (Peas (dry) (<i>Pisum</i> spp), several species and cultivars)	0.01
			ถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. ชนิดและ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (beans (<i>Phaseolus</i> spp.) (dry), several species and cultivars)	0.01
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
			ใบหอมแขก (curry leaves)	3
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	15
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	15
			พริกไทย (pepper)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไทรฟล็อกซิสโตรบิน (trifloxystrobin) (ต่อ)	พืช: ไทรฟล็อกซิสโตรบิน (trifloxystrobin) สัตว์: ผลรวมของไทรฟล็อกซิส โตรบิน และ ซีจีเอ 321113 (CGA 321113) รายงานผลเป็น ไทรฟล็อกซิสโตรบิน (ละลายในไขมัน) (sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)) (ต่อ)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.5
		พริกหวาน (รวมทั้งพียูนิโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.3	
		มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.7	
		มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.7	
		มะม่วง (mango)	0.9	
		มะละกอ (papaya)	0.6	
		มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02	
		มันสำปะหลัง (cassava)	1	
		เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.015	
		เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.02	
		เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.4	
		รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	7	

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) (ต่อ)	พืช: ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) สัตว์: ผลรวมของไทรฟล็อกซีส โตรบิน และ ซีจีเอ 321113 (CGA 321113) รายงานผลเป็น ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) (sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)) (ต่อ)	รำข้าวสาลีที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (wheat bran, unprocessed)	0.5
			ลำไย (longan)	1.5
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	1
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.05
			หอมแดง (shallot)	0.02
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.02
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	3
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.04
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (Group of avian fats)	0.04
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วย นม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.07
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.04

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) (ต่อ)	พืช: ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (trifloxystrobin) สัตว์: ผลรวมของไทรฟล็อกซีส โตรบิน และ ซีจีเอ 321113 (CGA 321113) รายงานผลเป็น ไทรฟล็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) (sum of trifloxystrobin and CGA 321113, expressed as trifloxystrobin (fat soluble)) (ต่อ)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.09
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.04 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.07 (fat)
29	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	ไตรอะโซฟอส (triazophos)	กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือ เบอร์รี่ ยกเว้นกระวาน ทั้งฝักและเมล็ด (subgroup of spices, fruit or berry, except cardamom, pods and seeds)	0.07
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ราก หรือเหง้า ยกเว้นเหง้าขิง (subgroup of spices, root or rhizome, except ginger, rhizome)	0.1
			กระเทียม (garlic)	0.03
			กระวาน ทั้งฝักและเมล็ด (cardamom, pods and seeds)	4

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไตรอะโซฟอส (triazophos) (ต่อ)	ไตรอะโซฟอส (triazophos) (ต่อ)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	2
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.6
			ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.02
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.05
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.4
			ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำ ในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.3
			น้ำมันเมล็ดฝ้าย (ดิบ) (cotton seed oil, crude)	1
			พุทรา (jujube, Indian)	0.02
			มันเทศ (sweet potato)	0.01
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.02
			เมล็ดโกโก้หรือเมล็ดคาเคา ชนิดย่อย ต่าง ๆ (cocoa bean or cacao bean, sub-species)	0.02
			เมล็ดงา (sesame seed)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไตรอะโซฟอส (triazophos) (ต่อ)	ไตรอะโซฟอส (triazophos) (ต่อ)	เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.01
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.2
			หม่อน (ผล) (mulberries)	0.01
			หอมแดง (shallot)	0.05
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
			เหง้าขิง (ginger, rhizome)	0.07
			เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (Mushrooms, cultivated cultivars)	0.01
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			เนื้อโค กระบือ (cattle, meat)	0.01
30	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	ไทอะโคลพริด (thiacloprid)	กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล ยกเว้นแพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือ ไซนัสแพร์, และสาลี่หิมะ (group of pome fruits, except pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.7

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid) (ต่อ)	ไทอะโคลพริด (thiacloprid) (ต่อ)	กีวีฟรุต และลูกผสม (kiwifruit and hybrids)	0.2
			ข้าว (rice)	0.02
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.3
			แตงโม (watermelon)	0.2
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	1
			พริกหวาน (รวมทั้งพียูนิโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	1
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.2
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.5
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.7
			มันเทศ (sweet potato)	0.02
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไทอะโคลพริด (thiacloprid) (ต่อ)	ไทอะโคลพริด (thiacloprid) (ต่อ)	เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.2
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.3
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.5
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
31	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam)	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.04
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.5
			กลุ่มผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง ยกเว้นเก๋ากี้ (group of fruiting vegetables, other than cucurbits, except goji berry)	0.7
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5
			กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและ เมล็ดที่อวบน้ำ) (group of legume vegetables, except beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.01
			กลุ่มผักใบ (group of leafy vegetables)	3
			กลุ่มผักรากและผักหัว (group of root and tuber vegetables)	0.3
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam) (ต่อ)	ไทอะมีโทแซม (thiamethoxam) (ต่อ)	กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผล พืชน้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits)	0.02
			กลุ่มย่อยผักก้านและผักต้น - ต้นและก้านใบ (subgroup of stems and petioles)	0.8
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.02
			เก๋ากี้ (goji berry)	1.5
			เก๋ากี้แห้ง (goji berry, dried)	5
			แก้วมังกร หรือพิทahaya (dragon fruit or pitaya)	0.2
			ข้าว (rice)	50
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	3
			ข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (popcorn)	0.01
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไทอะมีโทแแซม (thiamethoxam) (ต่อ)	ไทอะมีโทแแซม (thiamethoxam) (ต่อ)	ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ด ที่อวบขึ้น) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) immature pods and succulent seeds)	0.3
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้ง ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	3
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	7
			พลับญี่ปุ่น กากิฟรุต และพลับจีน (persimmon, Japanese; kaki fruit; and persimmon, Chinese)	0.6
			มะม่วง (mango)	0.2
			มะละกอ (papaya)	0.01
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.02
			เมล็ดยี่หระ (cumin, seed)	1
			รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	30
			สะระแหน่ หรือมินต์ ชนิดต่าง ๆ และลูกผสม (mint, species and hybrids)	1.5
			สับปะรด (pineapple)	0.01
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.05
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.02
			อะโวคาโด (avocado)	0.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไทอะมีโทแแซม (thiamethoxam) (ต่อ)	ไทอะมีโทแแซม (thiamethoxam) (ต่อ)	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.15
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.03
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.07
32.	โนวาลูรอน (novaluron)	โนวาลูรอน (ละลายในไขมัน)	กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (group of pome fruits)	3
		[novaluron (fat soluble)]	กลุ่มผักบรีโคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	0.7

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โนวาลูรอน (novaluron) (ต่อ)	โนวาลูรอน (ละลายในไขมัน) [novaluron (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มผักบรีโคผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.2
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.1
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	4
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.15
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	5
			ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.01
			บลูเบอร์รี่ (blueberries)	7
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.7
			มะพร้าวแก่ (coconut)	0.08
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	0.5
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.7

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โนวาลูรอน (novaluron) (ต่อ)	โนวาลูรอน (ละลายในไขมัน) [novaluron (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มนม (group of milks)	0.4
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.5 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	10 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	7
33	บูโพรเฟซีน (buprofezin)	บูโพรเฟซีน (buprofezin)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	1
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.7
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือกระเจี๊ยบ มอญ, และพริกเผ็ด (รวมทั้ง พริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่ม พันธุ์ปลูก ที่เผ็ดชนิดต่าง ๆ) (subgroup of peppers, except okra or lady's finger; and peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	2
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	บูโพรเฟซีน (buprofezin) (ต่อ)	บูโพรเฟซีน (buprofezin) (ต่อ)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.5
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.02
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			น้อยหน่า (sugar apple)	0.3
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้ง ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	3
			ผักชีฝรั่ง (cilantro)	10
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดชนิดต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	10
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	1
			มะม่วง (mango)	0.1
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
			เมล็ดงา (sesame seed)	0.01
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.35
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	3

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	บูโพรเฟซีน (buprofezin) (ต่อ)	บูโพรเฟซีน (buprofezin) (ต่อ)	หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.02
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (Group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
			ไขมันนม (milk fats)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
34	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin)	ไซฟลูทริน (ผลรวมของไอโซ เมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)]	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.3
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแดง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.2
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแดง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.2
			กระเทียม (garlic)	0.05
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลุกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	2
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลุกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.04
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลุกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลุกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลุกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin) (ต่อ)	ไซฟลูทริน (ผลรวมของไอโซ เมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.05
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.15
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.3
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.03
			น้ำมันเมล็ดฝ้าย (ดิบ) (cotton seed oil, crude)	1
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.2
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.7
			หอมแดง (shallot)	0.05
			หอมแบ่ง (หัว) (multiplier onion, bulb)	0.05
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
			แอปเปิล (apple)	0.1
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เบตา-ไซฟลูทริน หรือ ไซฟลูทริน (beta-cyfluthrin or cyfluthrin) (ต่อ)	ไซฟลูทริน (ผลรวมของไอโซ เมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
35	พิริมิฟอส-เมทิล (pirimiphos- methyl)	พิริมิฟอส-เมทิล (ละลายในไขมัน) [pirimiphos-methyl (fat soluble)]	กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือ เบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.5
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	3
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	2
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	7
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	พirimิฟอส-เมทิล (pirimiphos- methyl) (ต่อ)	พirimิฟอส-เมทิล (ละลายในไขมัน) [pirimiphos-methyl (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	1
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	1
			นุ่น (kapok)	0.1
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.01
			มันเทศ (sweet potato)	0.05
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.05
			เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (cashew nut)	0.01
			เมล็ดโกโก้หรือเมล็ดคาเคา ชนิดย่อย ต่าง ๆ (cocoa bean or cacao bean, sub-species)	0.05
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	พirimิฟอส-เมทิล (pirimiphos- methyl) (ต่อ)	พirimิฟอส-เมทิล (ละลายในไขมัน) [pirimiphos-methyl (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
36	เพอร์เมทริน (permethrin)	เพอร์เมทริน ผลรวมของซิส- และทรานส์-ไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน) [permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)]	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.5
			กลุ่มพืชเครื่องเทศ (group of spices)	0.05
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าวโพดหวาน และข้าวโพด ฝักอ่อน (group of cereal grains, except sweet corn and baby corn)	2
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและ หมัก (Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented)	20
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดแห้ง (subgroup of dry beans)	0.1
			กลุ่มย่อยผักบรืโคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแดง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	1
			กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	0.5
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.5

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เพอร์เมทริน (permethrin) (ต่อ)	เพอร์เมทริน ผลรวมของซิส- และทรานส์-ไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน) [permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	1
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	5
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.1
			เคล (kale)	5
			แครอท (carrot)	0.1
			ซั่มเมอร์สควอช พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ผล อ่อน) (squash, summer; several cultivars (immature))	0.5
			เซเลอรี และจีนฉ่าย (celery and Chinese celery)	2
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (C or onion, green; various cultivars)	0.5
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เพอร์เมทริน (permethrin) (ต่อ)	เพอร์เมทริน ผลรวมของซิส- และทรานส์-ไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน) [permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	ถั่วแขก (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (pods and succulent seeds))	1
			ถั่วแขก (เมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (succulent seeds))	1
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	1
			ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) without pods (succulent seeds))	0.1
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
			บร็อกโคลี (broccoli)	2
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	2
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดปายซาย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	5
			ผักปวยเล้ง (spinach)	2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	1
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เพอร์เมทริน (permethrin) (ต่อ)	เพอร์เมทริน ผลรวมของซิส- และทรานส์-ไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน) [permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	1
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.1
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	1
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	1
			เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (Mushrooms, cultivated cultivars)	0.1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เพอร์เมทริน (permethrin) (ต่อ)	เพอร์เมทริน ผลรวมของซิส- และทรานส์-ไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน) [permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)
37.	โพรคลอราซ (prochloraz)	ผลรวมของโพรคลอราซและ เมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 2,4,6-ไทรคลอโรฟีนอล ส่วน หนึ่ง รายงานผลเป็นโพรคลอ ราซ (ละลายในไขมัน) [sum of prochloraz and its metabolites containing the 2,4,6- trichlorophenol moiety, expressed as prochloraz (fat soluble)]	กลุ่มผลไม้เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนที่ เปลือกบริโภคไม่ได้ ยกเว้นมะม่วง (group of assorted tropical and sub-tropical fruits: inedible peel, except mango)	7
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นข้าว (group of cereal grains, except rice)	2
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.05
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.03
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โพรคลอราซ (prochloraz) (ต่อ)	ผลรวมของโพรคลอราซและ เมแทบอลิต์ที่ประกอบด้วย 2,4,6-ไทรคลอโรฟีนอล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นโพรคลอราซ (ละลายในไขมัน) [sum of prochloraz and its metabolites containing the 2,4,6- trichlorophenol moiety, expressed as prochloraz (fat soluble)] (ต่อ)	แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	2
			แตงโม (watermelon)	0.1
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกขี้หนูหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3
			มะม่วง (mango)	7
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.15
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.03
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.2
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	10
			กลุ่มนม (group of milks)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5 (fat)

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
38	โพรไทโอฟอส (prothiofos)	โพรไทโอฟอส (prothiofos)	คะน้า (broccoli, Chinese)	0.2
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
			ผักกาดเขียววางตุ้ง (flowering white cabbage)	0.01
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดชนิดต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.15
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.02
39	โพรพาร์โกต์ (propargite)	โพรพาร์โกต์ (ละลายในไขมัน) [propargite (fat soluble)]	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	3
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและ หมัก (Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented)	5
			กากของกลุ่มผลไม้สกุลส้มที่ คั้นน้ำแล้ว, แห้ง (citrus pulp, dried)	10

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โพรพาร์โกต์ (propargite) (ต่อ)	โพรพาร์โกต์ (ละลายในไขมัน) [propargite (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	2
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.03
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.03
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	12
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	7
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	7
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1F

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โพรพาร์โกต์ (propargite) (ต่อ)	โพรพาร์โกต์ (ละลายในไขมัน) [propargite (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1 (fat)
40	โพรพิโคนาโซล (propiconazole)	โพรพิโคนาโซล (ละลายในไขมัน) [propiconazole (fat soluble)]	กระเทียม (garlic)	0.2
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.1
			กุยช่าย (chives, Chinese)	0.5
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	4
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	4
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	30
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole) (ต่อ)	โพรพิโคนาโซล (ละลายในไขมัน) [propiconazole (fat soluble)] (ต่อ)	แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.01
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.03
			รำข้าวที่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, processed)	80
			อ้อย (sugar cane)	0.02
			อะโวคาโด (avocado)	0.02
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โพรพิโคนาโซล (propiconazole) (ต่อ)	โพรพิโคนาโซล (ละลายในไขมัน) [propiconazole (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
41	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	โพรฟีโนฟอส (profenofos)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ และไลม์ (รวมมะนาว แป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไซ) (group of citrus fruits, except pummelo and lime)	0.01
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกะหล่ำปลี พันธุ์และ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลี ใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage)	0.01
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (subgroup of leaves of Brassicaceae)	0.01
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือ เบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.07
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ราก หรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โพรฟีโนฟอส (profenofos) (ต่อ)	โพรฟีโนฟอส (profenofos) (ต่อ)	กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.01
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01
			ชมพู หรือชมพูแก่หม่อม, ชมพูน้ำดอกไม้, และชมพูมะเหมี่ยว (java apple, rose apple, and pomerac)	0.05
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.02
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.02
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อบน้ำ ในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.3
			ทุเรียน (durian)	10
			น้ำมันเมล็ดฝ้าย (ดิบ) (cotton seed oil, crude)	0.05
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โพรฟีโนฟอส (profenofos) (ต่อ)	โพรฟีโนฟอส (profenofos) (ต่อ)	พริกหวาน (รวมทั้งพื้เมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.01
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	10
			มะม่วง (mango)	0.2
			มังคุด (mangosteen)	10
			มันเทศ (sweet potato)	0.01
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.02
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	3
			ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	0.01
			ส้มโอ (pummelo)	2
			หอมแดง (shallot)	0.02
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.02
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โพรฟีโนฟอส (profenofos) (ต่อ)	โพรฟีโนฟอส (profenofos) (ต่อ)	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
42	ไพมีโทรีซีน (pymetrozine)	<u>พืชและสัตว์ (เว้นนม):</u> ไพมีโทรีซีน (pymetrozine) นม: ซีจีเอ313124 หรือ 4,5-ได ไฮโดร-6-ไฮดรอกซีเมทิล-4-[(3- ไพริดีนิล-เมทิลีน) แอมิโน]-1,2,4-ไตรอาซีน-3(2 เอช)-โอน (CGA313124 or 4,5- dihydro-6-hydroxymethyl- 4-[(3-pyridinyl- methylene)amino]-1,2,4- triazine-3(2H)-one)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.05
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไพเมโทซีน (pymetrozine) (ต่อ)	พืชและสัตว์ (เว้นนม): ไพเมโทซีน (pymetrozine) นม: ซีจีเอ313124 หรือ 4,5-ได ไฮโดร-6-ไฮดรอกซีเมทิล-4-[(3- ไพริดีนิล-เมทิลีน) แอมิโน]-1,2,4-ไตรอาซีน-3(2 เอช)-โอน (CGA313124 or 4,5- dihydro-6-hydroxymethyl- 4-[(3-pyridinyl- methylene)amino]-1,2,4- triazine-3(2H)-one) (ต่อ)	ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้ง ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	0.02
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกขี้หนูหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	14
			มันเทศ (sweet potato)	0.02
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.04
43	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin)	ไพราโคลสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [pyraclostrobin (fat soluble)]	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น ยกเว้นพิสทาชิโอเนต (group of tree nuts, except pistachio nut)	0.02
			กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (group of pome fruits)	0.7
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	2
			กลุ่มผักบรีโคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นแคนตาลูป และแตงโม (group of fruiting vegetables, cucurbits, except cantaloupe and watermelon)	0.5
			กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุก แน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	0.1

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) (ต่อ)	ไพราโคลสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [pyraclostrobin (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent peas without pods)	0.08
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (subgroup of peas with pods)	0.3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง ยกเว้นถั่วเลนทิล (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry peas, except lentil (dry))	0.3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ยกเว้นถั่วแขก (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (subgroup of beans with pods, except common bean (pods and succulent seeds))	0.3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.2
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้ง พ룬สด) (subgroup of plums (including fresh prunes))	0.8
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพีช (รวมทั้ง เนกทารีน และแอปริคอต) (subgroup of peaches (including nectarines and apricots))	0.3
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.5
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.3

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) (ต่อ)	ไพราโคลสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [pyraclostrobin (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มย่อยผักหัวแบบมันฝรั่งและผัก หัวแบบเผือก ยกเว้นเผือก และมันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (subgroup of tuberous and corm vegetables, except taro and potato)	0.02
			กระเทียม (garlic)	0.15
			กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	0.7
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.02
			กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.3
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.2
			กุยช่าย (chives, Chinese)	2
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.09
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.03
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1.5
			ข้าวโพดเมล็ดแข็ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) (ต่อ)	ไพราโคลสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [pyraclostrobin (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.04
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.1
			เคล (kale)	1
			แคนตาลูป (cantaloupe)	0.2
			เซเลอรี และจีน่าย (celery and Chinese celery)	1.5
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	1.5
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	1.5
			แตงโม (watermelon)	0.5
			ถั่วแขก (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (pods and succulent seeds))	0.6
			ถั่วแขก (เมล็ดที่อวบน้ำ) (common bean (succulent seeds))	0.3
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
			ผักปวยเล้ง (spinach)	0.6
			เผือก (taro)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) (ต่อ)	ไพราโคลสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [pyraclostrobin (fat soluble)] (ต่อ)	มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.3
			มะม่วง (mango)	0.6
			มะละกอ (papaya)	0.15
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
			ลำไย (longan)	5
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.1
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	1.5
			สับปะรด (pineapple)	0.3
			เสาวรส พันธุ์ปลูก (passion fruit, cultivar)	0.2
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.01
			หอมแดง (shallot)	0.3
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1.5
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
			อ้อย (sugar cane)	0.08

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไพราโคลสโตรบิน (pyraclostrobin) (ต่อ)	ไพราโคลสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [pyraclostrobin (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.5
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.03
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5 (fat)
44.	ไพริดาเบน (pyridaben)	พืช: ไพริดาเบน (pyridaben) สัตว์: ไพริดาเบน และเมแทบอ ไลต์ [2-เทอร์เทียรี-บิวทิล-5-(4- (1-คาร์บ็อกซี-1-เมทิลเอทิล)-เบน ซิลไทโอ)-4-คลอโร-ไพริดาซีน-3(2- เอทไอน์) และ [2-เทอร์เทียรี-	กลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids)) ทุเรียน (durian)	1 1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
		บิวทิล-5-[4-(1,1- ไดเมทิล-2-ไฮดรอกซีเอทิล) เบนซิล-ไทโอ-4-คลอโรไพริดา ซีน-3(2เอช)โอน] รายงานผลเป็น ไพริดาเบน (pyridaben and its metabolites [2-tert-butyl-5- (4-(1-carboxy-1-methylethyl) benzylthio)-4- chloropyridazin-3(2H)one] and [2-tert-butyl-5-[4-(1,1- dimethyl-2-hydroxyethyl) benzylthio)-4- chloropyridazin-3(2H)one], expressed as pyridaben)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	2
			มะม่วง (mango)	0.7
			มะละกอ (papaya)	0.1
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
			ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข) (lime)	1
			หม่อน (ผล) (mulberries)	0.01
			เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (Mushrooms, cultivated cultivars)	0.01
45	ฟลอนิคามิด (flonicamid)	<u>พืช</u> : ฟลอนิคามิด (flonicamid) <u>สัตว์</u> : ผลรวมของฟลอนิคามิด และเมแทบอไลต์ที่เอพเอ็นเอ- เอเอ็ม รายงานผลเป็นฟลอนิ คามิด (sum of floicamid and the metabolite TFNA-AM, expressed as flonicamid)	กลุ่มผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	0.4
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.2
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	2
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent peas without pods)	0.4

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟลอนิคามิด (flonicamid) (ต่อ)	พืช: ฟลอนิคามิด (flonicamid)	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (subgroup of peas with pods)	0.8
		สัตว์: ผลรวมของฟลอนิคามิด และเมแทบอไลต์ที่เอพเอ็นเอ- เอเอ็ม รายงานผลเป็นฟลอนิ คามิด (sum of floicamid and the metabolite TFNA-AM, expressed as flonicamid)) (ต่อ)	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)	1
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent beans without pods)	0.3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (subgroup of beans with pods)	0.7
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.15
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอน และไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (subgroup of lemons and limes (including citron))	1.5
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและ เกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้าย เซดด็อกและผลไม้ใกล้เคียง เกรปฟรุตประเภทอื่น) (subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.3
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยักเว้นไบแรติซ (รวมทั้งยอดแรติซ) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (subgroup of leaves of Brassicaceae, except radish leaves (including radish tops), several varieties)	15

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟลोनิคามิด (flonicamid) (ต่อ)	พืช: ฟลोनิคามิด (flonicamid) สัตว์: ผลรวมของฟลोनิคามิด และเมแทบอไลต์ที่เอพเอ็นเอ- เอเอ็ม รายงานผลเป็นฟลони คามิด (sum of floicamid and the metabolite TFNA-AM, expressed as flonicamid) (ต่อ)	กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ลอก ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ลอก) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.4
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกลอก (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกลอก) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.4
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.5
			เซเลอรี และจีนฉ่าย (celery and Chinese celery)	1.5
			กะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้งใบ ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	6
			ใบแรดิช (รวมทั้งยอดแรดิช) (radish leaves (including radish tops))	20
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	1.5
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	8
			มะม่วง (mango)	3
			สะระแหน่ หรือมินต์ ชนิดต่าง ๆ และลูกผสม (mint, species and hybrids)	6

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟลอนิคามิด (flonicamid) (ต่อ)	พืช: ฟลอนิคามิด (flonicamid) สัตว์: ผลรวมของฟลอนิคามิด และเมแทบอไลต์ที่เอฟเอ็นเอ- เอเอ็ม รายงานผลเป็นฟลอนิ- คามิด (sum of floicamid and the metabolite TFNA-AM, expressed as flonicamid) (ต่อ)	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.15
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2
			กลุ่มนม (group of milks)	0.15
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.15
46	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide)	ฟลูเบนไดแอไมด์ (ละลายในไขมัน) [flubendiamide (fat soluble)]	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	1
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide) (ต่อ)	ฟลูเบนไดแอไมด์ (ละลายในไขมัน) [flubendiamide (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.2
			กลุ่มผักแบบฝักถั่ว (group of legume vegetables)	2
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	4
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือ กระเจี๊ยบมอญ (subgroup of peppers, except okra or lady's finger)	0.7
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.7
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	2
			กระเทียม (garlic)	0.01
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.5
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1.5
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide) (ต่อ)	ฟลูเบนไดแอไมด์ (ละลายในไขมัน) [flubendiamide (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
			เซเลอรี และจีนฉ่าย (celery and Chinese celery)	5
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.01
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.01
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	5
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	7
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	2
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	1
			หอมแดง (shallot)	0.01
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟลูเบนไดแอไมด์ (flubendiamide) (ต่อ)	ฟลูเบนไดแอไมด์ (ละลายในไขมัน) [flubendiamide (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	2 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	5
47	ฟลูโอพิกโคไลด์ (fluopicolide)	ฟลูโอพิกโคไลด์ (ละลายในไขมัน) [fluopicolide (fat soluble)]	กลุ่มผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	1
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5
			กลุ่มผักใบ ยกเว้นคะน้า, เคล, ผักกาดหอม, เอนดิฟ, ผักกาดเขียวหรือชุนฉ่าย, และวิทลูฟชีโครี (พืชงอก) พันธุ์ปลูก สีเขียว สีแดง และสีขาว (group of leafy vegetables; except broccoli, Chinese; kale; lettuce, leaf; endive; mustard greens; and witloof chicory (sprouts) green, red and white cultivars)	30

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟลูโอพิโคลด์ (fluopicolide) (ต่อ)	ฟลูโอพิโคลด์ (ละลายในไขมัน) [fluopicolide (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุก แน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	2
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	7
			คะน้า (broccoli, Chinese)	2
			เคล (kale)	2
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	10
			ผักกาดเขียว หรือชุนฉ่าย (mustard greens)	5
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	5
			ผักกาดฮ่องเต้ (Chinese cabbage (type Pak- choi))	5
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	7
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.04
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	10
			วิทลูฟโครี (พืชงอก) (witloof chicory (sprouts))	10

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟลูโอพิกโคไลด์ (fluopicolide) (ต่อ)	ฟลูโอพิกโคไลด์ (ละลายในไขมัน) [fluopicolide (fat soluble)] (ต่อ)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
			เอนดิฟ (endive)	10
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01 (fat)
48	ฟลูโอไพแรม (fluopyram)	พืช: ฟลูโอไพแรม (fluopyram) สัตว์: ผลรวมของฟลูโอไพแรม และ 2 (ไตรฟลูออโรเมทิล)เบน ซาไมด์ รายงานผลเป็น ฟลูโอไพแรม (sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl)benzami de, expressed as fluopyram)	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas) กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.7 0.15

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram) (ต่อ)	พืช: ฟลูโอไพแรม (fluopyram) สัตว์: ผลรวมของฟลูโอไพแรม และ 2 (ไตรฟลูออโรเมทิล)เบน ซาไมด์ รายงานผลเป็น ฟลูโอไพแรม (sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl)benzami de, expressed as fluopyram) (ต่อ)	กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด (subgroup of maize cereals)	0.02
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเลมอน และไลม์ (รวมทั้งซิตรอน) (subgroup of lemons and limes (including citron))	1
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกส้มโอและ เกรปฟรุต (รวมทั้งลูกผสมที่คล้าย แซดด็อกและผลไม้ใกล้เคียง เกรปฟรุตประเภทอื่น) (subgroup of pummelo and grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others grapefruit))	0.4
			กลุ่มย่อยผักบรีโคโนคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแดง - จำพวกพริก ยกเว้นมาร์ทีเนีย, กระเจี๊ยบเขียวหรือ กระเจี๊ยบมอญ, และกระเจี๊ยบแดง (subgroup of peppers, except martynia, okra or lady's finger, and roselle)	3
			กลุ่มย่อยผักบรีโคโนคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแดง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.5
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.6
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.6

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram) (ต่อ)	พืช: ฟลูโอไพแรม (fluopyram) สัตว์: ผลรวมของฟลูโอไพแรม และ 2 (ไตรฟลูออโรเมทิล)เบน ซาไมด์ รายงานผลเป็น ฟลูโอไพแรม (sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl)benzami de, expressed as fluopyram) (ต่อ)	กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	3
			กระเทียม (garlic)	0.07
			กระเทียมต้น หรือลึก (leek)	0.15
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.8
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.09
			กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.3
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีโยนและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.15
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	1.5
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.5
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	4
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram) (ต่อ)	พืช: ฟลูโอไพแรม (fluopyram) สัตว์: ผลรวมของฟลูโอไพแรม และ 2 (ไตรฟลูออโรเมทิล)เบน ซาไมด์ รายงานผลเป็น ฟลูโอไพแรม (sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl)benzami de, expressed as fluopyram) (ต่อ)	ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	2
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	15
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.5
			ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) without pods (succulent seeds))	0.2
			ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (beans without pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (succulent seeds))	0.2
			ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ด ที่อวบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.3
			บร็อกโคลี (broccoli)	0.3
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	15

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram) (ต่อ)	พืช: ฟลูโอไพแรม (fluopyram) สัตว์: ผลรวมของฟลูโอไพแรม และ 2 (ไตรฟลูออโรเมทิล)เบน ซาไมด์ รายงานผลเป็น ฟลูโอไพแรม (sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl)benzami de, expressed as fluopyram) (ต่อ)	ผักกาดหอม (lettuce, leaf) พริกแห้ง (peppers, chili, dried) มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato)) มะม่วง (mango) เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars) เมล็ดถั่วลิสง (peanut) ลำไย (longan) ลิ้นจี่ (litchi) ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas)) สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry) หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus) หอมแดง (shallot) หอมหัวใหญ่ (onion, bulb) องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes)) กลุ่มไข่ (group of eggs)	6 30 0.5 1 0.015 0.2 2 2 5 0.4 0.01 0.07 0.07 2 2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟลูโอไพแรม (fluopyram) (ต่อ)	พืช: ฟลูโอไพแรม (fluopyram) สัตว์: ผลรวมของฟลูโอไพแรม และ 2 (ไตรฟลูออโรเมทิล)เบน ซาไมด์ รายงานผลเป็น ฟลูโอไพแรม (sum of fluopyram and 2(trifluoromethyl)benzami de, expressed as fluopyram) (ต่อ)	กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	1
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วย นม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	1.5
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	4
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	8
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	1.5
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1.5
49	ฟอลเพ็ต (folpet)	ฟอลเพ็ต (folpet)	เงาะ (rambutan)	0.03
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	1
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	7

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟอลเพ็ต (folpet) (ต่อ)	ฟอลเพ็ต (folpet) (ต่อ)	มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	3
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	1.5
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	12
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	5
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2
			แอปเปิล (apple)	2
50	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl- aluminium)	พืช: ผลรวมของฟอสอีทิล, กรด ฟอสโฟนิค และเกลือของสารทั้ง สองชนิด รายงานผลเป็นกรด ฟอสโฟนิค (sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as phosphonic acid) สัตว์: กรดฟอสโฟนิค (phosphonic acid)	กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุก แน่น (subgroup of flowerhead brassicas)	0.2
			กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว (subgroup of head brassicas)	0.2
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	20

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม (fosetyl- aluminium) (ต่อ)	<u>พืช</u> : ผลรวมของฟอสอีทิล, กรด ฟอสโฟนิค และเกลือของสารทั้ง สองชนิด รายงานผลเป็นกรด ฟอสโฟนิค (sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as phosphonic acid) <u>สัตว์</u> : กรดฟอสโฟนิค (phosphonic acid) (ต่อ)	กลุ่มย่อยส้มเป็ลือกลอน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเป็ลือกลอน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	50
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	40
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	40
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	40
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.2
			เคล (kale)	0.2
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	60
			ทุเรียน (durian)	5
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	8
			สับปะรด (pineapple)	15
			อะโวคาโด (avocado)	20
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟอสฟอรัส-อะลูมิเนียม (fosetyl- aluminium) (ต่อ)	พืช: ผลรวมของฟอสฟอรัส, กรด ฟอสฟอริก และเกลือของสารทั้ง สองชนิด รายงานผลเป็นกรด ฟอสฟอริก (sum of fosetyl, phosphonic acid and their salts, expressed as phosphonic acid) สัตว์: กรดฟอสฟอริก (phosphonic acid) (ต่อ)	กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วย นม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.3
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.5
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.15
51	ฟาโมซาโดน (famoxadone)	ฟาโมซาโดน (ละลายในไขมัน) [famoxadone (fat soluble)]	กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง ยกเว้นแตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) และซัมเมอร์สควอช (group of fruiting vegetables, cucurbits, except cucumber (including English and forcing cucumber cultivars), and summer squashes)	0.6

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟาโมซาโดน (famoxadone) (ต่อ)	ฟาโมซาโดน (ละลายในไขมัน) [famoxadone (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มย่อยหอมหัว (subgroup of bulb onions)	0.4
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.7
			ซัมเมอร์สควอช พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ผล อ่อน) (squash, summer; several cultivars (immature))	0.2
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.2
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	5
			พริกหวาน (รวมทั้งพิกเมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	5
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	50
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	2
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟาโมซาโดน (famoxadone) (ต่อ)	ฟาโมซาโดน (ละลายในไขมัน) [famoxadone (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.5
			กลุ่มนม (group of milks)	0.03 F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5 (fat)
52	ฟิโพรนิล (fipronil)	ผลรวมของฟิโพรนิล และ ฟิโพรนิล-ซัลโฟน (เอ็ม บี46136) รายงานผลเป็น ฟิโพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)]	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.005
			กลุ่มผักใบ ยกเว้นคะน้า (group of leafy vegetables, except broccoli, Chinese)	0.01
			กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันฝรั่งชนิดต่าง ๆ, และ चुการบีทหรือผักกาดฝรั่ง (group of root and tuber vegetables, except potato, and sugar beet)	0.005

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟิโพรนิล (fipronil) (ต่อ)	ผลรวมของฟิโพรนิล และ ฟิโพรนิล-ซัลโฟน (เอ็ม บี46136) รายงานผลเป็นฟิ โพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.02
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ยกเว้นถั่วฝักยาว (ฝัก) (subgroup of beans with pods, except yard-long bean (pods))	0.01
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (subgroup of dry beans, except soya bean (dry))	0.01
			กระเจียบเขียว หรือกระเจียบมอญ (okra or lady's finger)	0.02
			กระเทียม (garlic)	0.02
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.005
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟิโพรนิล (fipronil) (ต่อ)	ผลรวมของฟิโพรนิล และ ฟิโพรนิล-ซัลโฟน (เอ็ม บี46136) รายงานผลเป็นฟิ โพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)] (ต่อ)	คะน้า (broccoli, Chinese)	0.03
			เงาะ (rambutan)	0.02
			ชูการ์บีท หรือผักกาดฝรั่ง (sugar beet)	0.01
			เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	0.02
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.02
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.01
			แตงโม (watermelon)	0.02
			ถัวยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.04
			ถัวยาว (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.02
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			ทุเรียน (durian)	0.02
			กะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้งใบ ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	0.8
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.005
			ฝรั่ง (guava)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟิโพรนิล (fipronil) (ต่อ)	ผลรวมของฟิโพรนิล และ ฟิโพรนิล-ซัลโฟน (เอ็ม บี46136) รายงานผลเป็นฟิ โพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)] (ต่อ)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.4
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.01
			มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.01
			มะระ หรือมะระขี้นก (bitter melon or bitter cucumber)	0.01
			มังคุด (mangosteen)	0.02
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.005
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.005
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			แมคคาเดเมีย Nut (macadamia nut)	0.005
			รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	2
			ลำไย (longan)	0.02
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.02
			สละ และระกำ (salak and salacca)	0.005

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟิโพรนิล (fipronil) (ต่อ)	ผลรวมของฟิโพรนิล และ ฟิโพรนิล-ซัลโฟน (เอ็ม บี46136) รายงานผลเป็นฟิ โพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)] (ต่อ)	หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.02
			หม่อน (ผล) (mulberries)	0.005
			หอมแดง (shallot)	0.02
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.03
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.2
			อ้อย (sugar cane)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.005
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.07
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.005
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ฟิโพรนิล (fipronil) (ต่อ)	ผลรวมของฟิโพรนิล และ ฟิโพรนิล-ซัลโฟน (เอ็ม บี46136) รายงานผลเป็นฟิ โพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil-sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.007
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.005
			ไขมันนม (milk fats)	0.01
53	เฟนโทเอต (phenthoate)	เฟนโทเอต (ละลายในไขมัน) [phenthoate (fat soluble)]	กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	7
			กระเจียบเขียว หรือกระเจียบมอญ (okra or lady's finger)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
			มันเทศ (sweet potato)	0.02
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไซ้) (lime)	5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
54	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin)	เฟนโพรพาทริน (ละลายในไขมัน) [fenpropathrin (fat soluble)]	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.15
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	2
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและ หมัก (Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented)	3
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้ง พรุณสด) (subgroup of plums (including fresh prunes))	0.6
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือ กระเจี๊ยบมอญ (subgroup of peppers, except okra or lady's finger)	1
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
			พรุณ, แห้ง (prunes, dried)	1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	1
			มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.07
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เฟนโพรพาทริน (fenpropathrin) (ต่อ)	เฟนโพรพาทริน (ละลายในไขมัน) [fenpropathrin (fat soluble)] (ต่อ)	เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	1
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วย นม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.03
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
55	เฟนวาเลอเรต (fenvalerate)	ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ ของเฟนวาเลอเรต (ละลายในไขมัน) [sum of fenvalerate isomers] (fat soluble)]	กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกะหล่ำปลี พันธุ์และ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลี ใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage)	2
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	2
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือ เบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	0.03
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ราก หรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.05
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	3
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เฟนวาเลอเรต (fenvalerate) (ต่อ)	ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ ของเฟนวาเลอเรต (ละลายในไขมัน) [sum of fenvalerate isomers] (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
			คะน้า (broccoli, Chinese)	3
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.5
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.1
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.5
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดป่ายขาย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	3
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.02
			มะม่วง (mango)	1.5
			มันเทศ (sweet potato)	0.05
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.05
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เฟนวาลีเรต (fenvalerate) (ต่อ)	ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ ของเฟนวาลีเรต (ละลายในไขมัน) [sum of fenvalerate isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	ลำไย (longan)	0.2
			ลitchi (litchi)	0.2
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1 F
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)
56	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นกลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าว กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด และกลุ่มย่อยธัญพืชจำพวก ข้าวโพดหวาน (group of cereal grains, except subgroup of rice cereals, subgroup of maize cereals and subgroup of sweet corns)	6
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและ หมัก (Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented)	0.1
			กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด (subgroup of maize cereals)	0.2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) (ต่อ)	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) (ต่อ)	กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือ เบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	7
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ราก หรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.1
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	4
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	1
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	6
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.5
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.5
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.05
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำ ในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) (ต่อ)	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion) (ต่อ)	เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			รำข้าวที่ไม่ผ่านกรรมวิธี (rice bran, unprocessed)	40
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
57	โฟซาโลน (phosalone)	โฟซาโลน (ละลายในไขมัน) [phosalone (fat soluble)]	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.01
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.01
			กลุ่มย่อยผักบรีโคคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โฟซาลอน (phosalone) (ต่อ)	โฟซาลอน (ละลายในไขมัน) [phosalone (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (subgroup of leaves of Brassicaceae)	0.01
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือ เบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	2
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	2
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ราก หรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	3
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.01
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	0.01
			ถัวยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.01
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.01
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.02
			ถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่อวบน้ำ ในฝัก) หรือเอดามาเมะ (soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.01
			ทุเรียน (durian)	1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โฟซาโลน (phosalone) (ต่อ)	โฟซาโลน (ละลายในไขมัน) [phosalone (fat soluble)] (ต่อ)	ใบหม่อน (mulberry leaves)	0.01
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.01
			พริกหวาน (รวมทั้งพียเมนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.01
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.01
			มังคุด (mangosteen)	1
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.02
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.01
			หอมแดง (shallot)	0.01
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.01
58	มาลาไทออน (malathion)	มาลาไทออน (ละลายในไขมัน) [malathion (fat soluble)]	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ (group of citrus fruits, except pummelo)	7
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม้อกลมแห้ง (subgroup of dry beans)	2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	มาลาไธออน (malathion) (ต่อ)	มาลาไธออน (ละลายในไขมัน) [malathion (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแต่ง - จำพวกพริก ยกเว้นพริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (subgroup of peppers, except peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือ เบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	2
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ราก หรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.5
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.5
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	8
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	มาลาไธออน (malathion) (ต่อ)	มาลาไธออน (ละลายในไขมัน) [malathion (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวเปลือก (rice, paddy)	8
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
			ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	3
			ข้าวสาลี (wheat)	10
			คะน้า (broccoli, Chinese)	3
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	5
			ต้นหอมหัวใหญ่ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (spring onion or onion, green; various cultivars)	5
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.2
			ถัวยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	1

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	มาลาไทออน (malathion) (ต่อ)	มาลาไทออน (ละลายในไขมัน) [malathion (fat soluble)] (ต่อ)	ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ด ที่อวบขึ้นน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	1
			น้ำมะเขือเทศ (tomato juice)	0.01
			บร็อกโคลี (broccoli)	5
			แป้งสาลี (wheat flour)	0.2
			ผักกาดขาวปลีห่อ ชนิดปายซาย (Chinese cabbage (type Pe-tsai))	8
			ผักกาดเขียว หรือขุนฉ่าย (mustard greens)	2
			ผักปวยเล้ง (spinach)	3
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.1
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.5
			มันเทศ (sweet potato)	8
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.02
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.5
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	1

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	มาลาไทออน (malathion) (ต่อ)	มาลาไทออน (ละลายในไขมัน) [malathion (fat soluble)] (ต่อ)	ส้มโอ (pummelo)	0.2
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	1
			หอมแดง (shallot)	1
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	5
			อ้อย (sugar cane)	0.02
			แอปเปิล (apple)	0.5
59	เมทริบูซิน (metribuzin)	เมทริบูซิน (metribuzin)	ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.1
			อ้อย (sugar cane)	0.1
60	เมทาแล็กซิล หรือ เมทาแล็กซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M)	พืช: เมทาแล็กซิล (ผลรวมของทุก เอแนนทิโอเมอร์) (metalaxyl (sum of enantiomers)) สัตว์: ผลรวมของเมทาแล็กซิล (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) และเม แทบอไลต์ (ทั้งคอนจูเกตและ อิสระ) ของเอ็ม3 (เอ็น-(2,6-ได เมทิลพีนิล)-เอ็น-ไฮดรอกซีแ ซีทิล)แอลานีน เมทิลเอสเทอร์ และ เอ็ม8 (เอ็น-(2-ไฮดรอกซี เมทิล-6-เมทิลพีนิล)-เอ็น-เมทิล ซีแอซีทิล)แอลานีน เมทิล-เอส เทอร์ (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) รายงานผลเป็นเมทาแล็กซิล (sum of metalaxyl (sum of	กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล ยกเว้นแพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือ ไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (group of pome fruits, except pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	1
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มโอ (group of citrus fruits, except pummelo)	5
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.5

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
		enantiomers) and metabolites (free and conjugated) M3 [N- (2,6-dimethylphenyl)-N- (hydroxyacetyl)alanine methyl ester] and M8 [N- (2-hydroxymethyl-6-methylphenyl)-N- (methoxyacetyl)alanine methyl ester] (sum of enantiomers), expressed as metalaxyl)	กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นกลุ่มย่อยธัญพืชจำพวก ข้าวโพด และกลุ่มย่อยธัญพืช จำพวกข้าวโพดหวาน (group of cereal grains, except subgroup of maize cereals and subgroup of sweet corns)	0.05
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก (subgroup of succulent peas without pods)	0.05
			กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด (subgroup of maize cereals)	0.05
			กลุ่มย่อยผักบร็อกโคลีผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	1
			กลุ่มย่อยผักบร็อกโคลีผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกมะเขือเทศ (subgroup of tomatoes)	0.3
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	2
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	5
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.5
			กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เมทาแล็กซิล หรือ เมทาแล็กซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M) (ต่อ)	พืช: เมทาแล็กซิล (ผลรวมของทุก เอแนนทิโอเมอร์) (metalaxyl (sum of enantiomers)) สัตว์: ผลรวมของเมทาแล็กซิล (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) และเม แทบอไลต์ (ทั้งคอนจูเกตและ อิสระ) ของเอ็ม3 (เอ็ม-(2,6-ได เมทิลฟีนิล)-เอ็น-(ไฮดรอกซีแ ซีทิล)แอลานีน เมทิลเอสเทอร์ และ เอ็ม8 (เอ็ม-(2-ไฮดรอกซี เมทิล-6-เมทิลฟีนิล)-เอ็น-(เมท็อก ซีแอสีทิล)แอลานีน เมทิล-เอส เทอร์ (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) รายงานผลเป็นเมทาแล็กซิล (sum of metalaxyl (sum of enantiomers) and metabolites (free and conjugated) M3 [N- (2,6- dimethylphenyl)-N- (hydroxyacetyl)alanine methyl ester] and M8 [N- (2-hydroxymethyl-6- methylphenyl)-N- (methoxyacetyl)alanine methyl ester] (sum of enantiomers), expressed as metalaxyl) (ต่อ)	กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีโยนและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.5
			เกอร์กิน พันธุ์ปลูกที่ใช้ทำแตงกวาดอง (gherkin; pickling cucumber cultivars)	0.5
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
			คะน้า (broccoli, Chinese)	2
			แครอท (carrot)	0.05
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.5
			แตงโม (watermelon)	0.2
			ทุเรียน (durian)	0.5
			บร็อกโคลี (broccoli)	0.5

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เมทาแล็กซิล หรือ เมทาแล็กซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M) (ต่อ)	พืช: เมทาแล็กซิล (ผลรวมของทุก เอแนนทิโอเมอร์) (metalaxyl (sum of enantiomers)) สัตว์: ผลรวมของเมทาแล็กซิล (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) และเม แทบอไลต์ (ทั้งคอนจูเกตและ อิสระ) ของเอ็ม3 (เอ็น-(2,6-ได เมทิลฟีนิล)-เอ็น-(ไฮดรอกซีแ ซีทิล)แอลานีน เมทิลเอสเทอร์ และ เอ็ม8 (เอ็น-(2-ไฮดรอกซี เมทิล-6-เมทิลฟีนิล)-เอ็น-(เมท็อก ซีแอสีทิล)แอลานีน เมทิล-เอส เทอร์ (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) รายงานผลเป็นเมทาแล็กซิล (sum of metalaxyl (sum of enantiomers) and metabolites (free and conjugated) M3 [N- (2,6- dimethylphenyl)-N- (hydroxyacetyl)alanine methyl ester] and M8 [N- (2-hydroxymethyl-6- methylphenyl)-N- (methoxyacetyl)alanine methyl ester] (sum of enantiomers), expressed as metalaxyl) (ต่อ)	ผักปวยเล้ง (spinach) บวบเหลี่ยม (loofah, angled) ใบพู่ (betel leaves) ผักกาดแก้ว (lettuce, head) ผักกาดหอม (lettuce, leaf) ผักบุ้ง และผักบุ้งจีน (water spinach and water convolvulus) เผือก (taro) พริกไทย (pepper) พริกแห้ง (peppers, chili, dried) แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไซนัสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear) ฟัก (ผลแก่) (wax gourd (mature fruit)) ฟักทอง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (pumpkins, several cultivars) มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato) เมล็ดโกโก้หรือเมล็ดคาเคา ชนิดย่อย ต่าง ๆ (cocoa bean or cacao bean, sub-species)	2 0.2 0.05 2 1 2 0.5 2 10 0.02 0.2 0.2 0.02 0.2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เมทาแล็กซิล หรือ เมทาแล็กซิล-เอ็ม (metalaxyl or metalaxyl-M) (ต่อ)	พืช: เมทาแล็กซิล (ผลรวมของทุก เอแนนทิโอเมอร์) (metalaxyl (sum of enantiomers)) สัตว์: ผลรวมของเมทาแล็กซิล (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) และเม แทบอไลต์ (ทั้งคอนจูเกตและ อิสระ) ของเอ็ม3 (เอ็น-(2,6-ได เมทิลฟีนิล)-เอ็น-(ไฮดรอกซีแ ซีทิล)แอลานีน เมทิลเอสเทอร์ และ เอ็ม8 (เอ็น-(2-ไฮดรอกซี เมทิล-6-เมทิลฟีนิล)-เอ็น-(เมท็อก ซีแอสีทิล)แอลานีน เมทิล-เอส เทอร์ (รวมทุกเอแนนทิโอเมอร์) รายงานผลเป็นเมทาแล็กซิล (sum of metalaxyl (sum of enantiomers) and metabolites (free and conjugated) M3 [N- (2,6- dimethylphenyl)-N- (hydroxyacetyl)alanine methyl ester] and M8 [N- (2-hydroxymethyl-6- methylphenyl)-N- (methoxyacetyl)alanine methyl ester] (sum of enantiomers), expressed as metalaxyl) (ต่อ)	เมล็ดข้าวโพดหวาน (sweet corn (whole kernels without cob or husk))	0.05
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.05
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.2
			ส้มโอ (pummelo)	0.8
			สับปะรด (pineapple)	0.1
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.05
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	2
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	1.5
			อะโวคาโด (avocado)	0.2
			แอปเปิล (apple)	0.02
61	เมทิดาไทออน (methidathion)	เมทิดาไทออน (methidathion)	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นส้มแมนดาริน ส้มเขียวหวาน และแพนเจอร์น (group of citrus fruits, except mandarin and tangerine)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เมทิดาไทออน (methidathion) (ต่อ)	เมทิดาไทออน (methidathion) (ต่อ)	กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและหมัก (Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented)	0.5
			เงาะ (rambutan)	0.05
			ทุเรียน (durian)	0.05
			น้อยหน่า (sugar apple)	0.05
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.03
			ส้มแมนดาริน ส้มเขียวหวาน และแพนเจอริน (mandarin and tangerine)	0.1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่นบริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.1
			แอปเปิล (apple)	0.1
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.02

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เมทิดาไทออน (methidathion) (ต่อ)	เมทิดาไทออน (methidathion) (ต่อ)	กลุ่มนม (group of milks)	0.001
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.02
62	เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide)	เมทิลโบรไมด์ (methyl bromide)	ข้าวกล้อง ณ จุดจำหน่าย (rice, husked (at point of retail sale))	0.01
			ข้าวกล้อง ณ ด่านนำเข้าหรือ ณ จุดรวม หลังจากระบายแก๊สออกให้ข้าวกล้อง สัมผัสกับอากาศไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (rice, husked (at point of entry into a country or at point of fumigation after product has been freely exposed to air for a period of at least 24 hours))	1
			ข้าวขัดสี ณ จุดจำหน่าย (rice, polished (at point of retail sale))	0.01
			ข้าวขัดสี ณ ด่านนำเข้าหรือ ณ จุดรวม หลังจากระบายแก๊สออกให้ข้าวขัดสี สัมผัสกับอากาศไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง (rice, polished (at point of entry into a country or at point of fumigation after product has been freely exposed to air for a period of at least 24 hours))	1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
63	ลูเฟนูรอน (lufenuron)	ลูเฟนูรอน (ละลายในไขมัน) [lufenuron (fat soluble)]	กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	1
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			คะน้า (broccoli, Chinese)	5
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.09
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้ง ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	5
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกขี้หนูหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	1
			พริกหวาน (รวมทั้งพื้เมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimienta))	0.8
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.4
			มะเฟือง (carambola or star fruit)	0.2
			มันเทศ (sweet potato)	0.02

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron) (ต่อ)	ลูเฟนนูรอน (ละลายในไขมัน) [lufenuron (fat soluble)] (ต่อ)	มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.07
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.4
			ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไซ) (lime)	0.4
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	1
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (Group of avian fats)	0.04
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูกด้วย นม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	2
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02 (fat)
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.15

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ลูเฟนนูรอน (lufenuron) (ต่อ)	ลูเฟนนูรอน (ละลายในไขมัน) [lufenuron (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มนม (group of milks)	0.15
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	2 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	5
64.	แลมบ์ดา-ไซแอโลทริน หรือ ไซแอโลทริน (lambda- cyhalothrin or cyhalothrin)	ไซแอโลทริน (ผลรวมของทุก ไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)]	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้นถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) และ ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (group of pulses, except mung bean (dry) and soya bean (dry))	0.05
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01
			กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (group of pome fruits)	0.2
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นกลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (group of citrus fruits, except subgroup of mandarins)	0.2
			กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง ยกเว้นมะเขือเทศ (รวมมะเขือเทศเชอร์รี่), กระเจียบเขียว, พริกเผ็ด รวมทั้ง พริกชี้ฟ้าหรือพริกหนุ่มพันธุ์ลูกที่ เผ็ดฉุนต่าง ๆ, และพริกหวาน (group of fruiting vegetables, other than cucurbits, except tomato (including cherry tomato); okra; peppers,-	0.3

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	แลมบ์ดา-ไซแอโลทริน หรือ ไซแอโลทริน (lambda- cyhalothrin or cyhalothrin) (ต่อ)	ไซแอโลทริน (ผลรวมของทุก ไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	chili (including hot pepper and several pungent cultivars); and peppers, sweet) (ต่อ)	
			กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นมะระหรือมะระขี้นก (group of fruiting vegetables, cucurbits, except bitter melon or bitter cucumber)	0.05
			กลุ่มผักแบบฝักถั่ว ยกเว้นถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (group of legume vegetables, except soya bean (succulent seeds))	0.2
			กลุ่มผักแบบหัวหอม (group of bulb vegetables)	0.2
			กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันเทศ (group of root and tuber vegetables, except sweet potato)	0.01
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกะหล่ำปลี พันธุ์และ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลี ใบย่น และผักกาดขาวปลีห่อ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage)	0.3

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	แลมบ์ดา-ไซแอโลทริน หรือ ไซแอโลทริน (lambda- cyhalothrin or cyhalothrin) (ต่อ)	ไซแอโลทริน (ผลรวมของทุก ไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผล พืชน้ำมัน ยกเว้นเมล็ดงา, เมล็ดฝ้ายชนิดและ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ, นุ่น, และผลปาล์ม น้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits, except sesame seed; cotton seed, several species and cultivars; kapok; and palm fruit (African oil palm))	0.2
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	0.3
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.3
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.03
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.2
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.3
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	แลมบ์ดา-ไซแอโลทริน หรือ ไซแอโลทริน (lambda- cyhalothrin or cyhalothrin) (ต่อ)	ไซแอโลทริน (ผลรวมของทุก ไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.2
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
			ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.2
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.2
			เงาะ (rambutan)	0.5
			แตงโม (watermelon)	0.06
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดที่อวบน้ำ) (soya bean (succulent seeds))	0.2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.2
			ทุเรียน (durian)	0.5
			นุ่น (kapok)	0.02
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้ง ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	0.7
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	แลมบ์ดา-ไซแอโลทริน หรือ ไซแอโลทริน (lambda- cyhalothrin or cyhalothrin) (ต่อ)	ไซแอโลทริน (ผลรวมของทุก ไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือพริก หนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.3
			พริกหวาน (รวมทั้งพื้เมียนโต) (peppers, sweet (including pimento or pimiento))	0.3
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	3
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.3
			มะม่วง (mango)	0.2
			มะระ หรือมะระขี้นก (bitter melon or bitter cucumber)	0.2
			มันเทศ (sweet potato)	0.02
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.01
			เมล็ดโกโก้หรือเมล็ดคาเคา ชนิดย่อย ต่าง ๆ (cocoa bean or cacao bean, sub-species)	0.02
			เมล็ดงา (sesame seed)	0.2
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.02
			เมล็ดยี่หระ (cumin, seed)	0.3
			ลำไย (longan)	0.2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	แลมบ์ดา-ไซแอโลทริน หรือ ไซแอโลทริน (lambda- cyhalothrin or cyhalothrin) (ต่อ)	ไซแอโลทริน (ผลรวมของทุก ไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)] (ต่อ)	ลิ้นจี่ (litchi)	0.5
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.02
			อ้อย (sugar cane)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.03
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.2
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.03 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
			ตับของโค กระบือ แพะ สุกร และแกะ (liver of cattle, goats, pigs and sheep)	0.05
65	สไปนีโทแรม (spinetoram)	สไปนีโทแรม (ละลายในไขมัน) [spinetoram (fat soluble)]	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม ยกเว้นกลุ่มย่อยส้มเปลือกอ่อน และ กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่อ่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (group of citrus fruits, except subgroup of mandarins and subgroup of oranges, sweet, sour)	3

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	สไปนีโทแรม (spinetoram) (ต่อ)	สไปนีโทแรม (ละลายในไขมัน) [spinetoram (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.3
			กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.4
			กลุ่มย่อยผักบริโภคผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกมะเขือ (subgroup of eggplants)	0.4
			กลุ่มย่อยผักบริโภคผลในกลุ่มแตง- แตงกวาและซั่มเมอร์สควอช (subgroup of fruiting vegetables, cucurbits - cucumbers and summer squashes)	0.04
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ล่อน ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ล่อน) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.07
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกล่อน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.15
			กระเทียม (garlic)	0.1
			กระเทียมต้น หรือสีก (leek)	0.05
			แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya)	0.5

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	สไปนีโทแรม (spinetoram) (ต่อ)	สไปนีโทแรม (ละลายในไขมัน) [spinetoram (fat soluble)] (ต่อ)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.02
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.1
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.04
			คะน้า (broccoli, Chinese)	10
			เงาะ (rambutan)	0.3
			เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	6
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.8
			แตงโม (watermelon)	0.3
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.04
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.3

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	สไปนีโทแรม (spinetoram) (ต่อ)	สไปนีโทแรม (ละลายในไขมัน) [spinetoram (fat soluble)] (ต่อ)	ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ด ที่อวบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.05
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.04
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้ง ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	22
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	4
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.06
			มะม่วง (mango)	0.01
			มังคุด (mangosteen)	0.3
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.4
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.09
			สตรอว์เบอร์รี่ (strawberry)	0.15
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.3
			หอมแดง (shallot)	0.1

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	สไปนีโทแรม (spinetoram) (ต่อ)	สไปนีโทแรม (ละลายในไขมัน) [spinetoram (fat soluble)] (ต่อ)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.3
			อะโวคาโด (avocado)	0.3
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	สไปนีโทแรม (spinetoram) (ต่อ)	สไปนีโทแรม (ละลายในไขมัน) [spinetoram (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	0.15
66	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen)	ผลรวมของสไปโรมีซิเฟน และ 4-ไฮดรอกซี-3-(2,4,6-ไตรเมทิล ฟีนิล)-1-ออกซะสไปโร [4,4] นออน-3-เอ็น-2-โอน รายงานผล เป็นสไปโรมีซิเฟน (ละลายในไขมัน) [sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6- trimethyl phenyl)-1- oxaspiro[4.4]non-3-en-2- one, expressed as spiromesifen (fat soluble)]	กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง ยกเว้นเมลอน และแตงกวาหรือ แตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (group of fruiting vegetables, cucurbits, except melon and cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.09
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม้กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.03
			กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือ กระเจี๊ยบมอญ (subgroup of peppers, except okra or lady's finger)	0.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) (ต่อ)	ผลรวมของสไปโรมีซิเฟน และ 4-ไฮดรอกซี-3-(2,4,6-ไตรเมทิล ฟีนิล)-1-ออกซะสไปโร [4,4] นอน-3-เอ็น-2-โอน รายงานผล เป็นสไปโรมีซิเฟน (ละลายในไขมัน) [sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6- trimethyl phenyl)-1- oxaspiro[4.4]non-3-en-2- one, expressed as spiromesifen (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มย่อยส้มเปลือกไม่ลอก ทั้งเปรี้ยวและหวาน (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกไม่ลอก) (subgroup of oranges, sweet, sour (including orange-like hybrids))	0.15
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกลอก (รวมทั้ง ลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกลอก) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.2
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.5
			กระเทียม (garlic)	0.09
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
			ซอสมะเขือเทศเข้มข้น (tomato paste)	2
			เซเลอรี และจีนฉ่าย (celery and Chinese celery)	0.02
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.15

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) (ต่อ)	ผลรวมของสไปโรมีซิเฟน และ 4-ไฮดร็อกซี-3-(2,4,6-ไตรเมทิล ฟีนิล)-1-ออกซะสไปโร [4,4] นออน-3-เอ็น-2-โอน รายงานผล เป็นสไปโรมีซิเฟน (ละลายในไขมัน) [sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6- trimethyl phenyl)-1- oxaspiro[4.4]non-3-en-2- one, expressed as spiromesifen (fat soluble)] (ต่อ)	ถั่วเมล็ดไม่กลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (beans without pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (succulent seeds))	0.15
			ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่ อวบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.5
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้ง ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	0.6
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	5
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.7
			มะเขือเทศ, แห้ง (tomato, dried)	4
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.7
			มะม่วง (mango)	0.5
			มะละกอ (papaya)	0.7
			มันเทศ (sweet potato)	0.02
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) (ต่อ)	ผลรวมของสไปโรมีซิเฟน และ 4-ไฮดร็อกซี-3-(2,4,6-ไตรเมทิล ฟีนิล)-1-ออกซะสไปโร [4,4] นออน-3-เอ็น-2-โอน รายงานผล เป็นสไปโรมีซิเฟน (ละลายในไขมัน) [sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6- trimethyl phenyl)-1- oxaspiro[4.4]non-3-en-2- one, expressed as spiromesifen (fat soluble)] (ต่อ)	เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.3
			ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	2
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.5
			หอมแดง (shallot)	0.09
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.02
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.15
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.3
			กลุ่มนม (group of milks)	0.015
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	สไปโรมีซิเฟน (spiromesifen) (ต่อ)	ผลรวมของสไปโรมีซิเฟน และ 4-ไฮดร็อกซี-3-(2,4,6-ไตรเมทิล ฟีนิล)-1-ออกซะสไปโร [4,4] นอ-3-เอน-2-โอน รายงานผล เป็นสไปโรมีซิเฟน (ละลายในไขมัน) [sum of spiromesifen and 4-hydroxy-3-(2,4,6 trimethyl phenyl)-1-oxaspiro[4.4]non- 3-en-2-one, expressed as spiromesifen (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.15
67	อะซีทามิพริด (acetamiprid)	พืช: อะซีทามิพริด (acetamiprid) สัตว์: ผลรวมของอะซีทามิพริด และเดสมิทิล (ไอเอ็ม-2-1) เม แทบอไลต์ รายงานผลเป็นอะซี ทามิพริด (sum of acetamiprid and its desmethyl (IM-2-1) metabolite, expressed as acetamiprid)	กลุ่มผักบรีโศกผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	0.2
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นกลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอก กระจุกแน่น (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except subgroup of flowerhead brassicas)	0.7
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	0.7
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อะซีทามิพริด (acetamiprid) (ต่อ)	พืช: อะซีทามิพริด (acetamiprid) สัตว์: ผลรวมของอะซีทามิพริด และเดสมิทธิล (ไอเอ็ม-2-1) เม แทบอลไลต์ รายงานผลเป็นอะซี ทามิพริด (sum of acetamiprid and its desmethyl (IM-2-1) metabolite, expressed as acetamiprid) (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
			คะน้า (broccoli, Chinese)	1
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.03
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.03
			ทุเรียน (durian)	2
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	2
			มะม่วง (mango)	1
			มะละกอ (papaya)	0.5
			มังคุด (mangosteen)	2
			มันเทศ (sweet potato)	0.01
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.01
			สับปะรด (pineapple)	0.01
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.8
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อะซีทามิพริด (acetamiprid) (ต่อ)	พืช: อะซีทามิพริด (acetamiprid) สัตว์: ผลรวมของอะซีทามิพริด และเดสมิทธิล (ไอเอ็ม-2-1) เม แทบอไลต์ รายงานผลเป็นอะซี ทามิพริด (sum of acetamiprid and its desmethyl (IM-2-1) metabolite, expressed as acetamiprid) (ต่อ)	กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.3
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.2
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.5
68	อะซีโทคลอร์ (acetochlor)	ผลรวมของสารประกอบที่ละลาย ในด่าง 2-เอทิล-6-เมทิลแอนิลีน (อีเอ็มเอ) และ 2-(1-ไฮดรอกซี เอทิล)-6-เมทิลแอนิลีน (เอชอีเอ็ม เอ) รายงานผลเป็นอะซีโทคลอร์ [sum of compounds hydrolysable with base to 2- ethyl-6-methylaniline (EMA) and 2-(1-hydroxyethyl)-6- methylaniline (HEMA), expressed as acetochlor]	ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.04
			ข้าวโพดเมล็ดแข็ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อะซีโทคลอร์ (acetochlor) (ต่อ)	ผลรวมของสารประกอบที่ละลาย ในด่าง 2-เอทิล-6-เมทิลแอนิไลน์ (อีเอ็มเอ) และ 2-(1-ไฮดรอกซี เอทิล)-6-เมทิลแอนิไลน์ (เอชอีเอ็ม เอ) รายงานผลเป็นอะซีโทคลอร์ [sum of compounds hydrolysable with base to 2- ethyl-6-methylaniline (EMA) and 2-(1-hydroxyethyl)-6- methylaniline (HEMA), expressed as acetochlor] (ต่อ)	ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.04
			ถั่วเขียว (ฝักอ่อน) (mung bean (immature pods))	0.02
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.15
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.01
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	1.5
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.04
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			อ้อย (sugar cane)	0.01
69.	อะบาเม็กทีน (abamectin)	อะเวอร์เม็กทีน บี1เอ (ละลายในไขมัน) [avermectin B1a (fat soluble)]	กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.02
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.01
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดแห้งไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.01
			กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด หวาน (subgroup of sweet corns)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อะบาเม็กทีน (abamectin) (ต่อ)	อะเวอร์เม็กทีน บี1เอ (ละลายในไขมัน) [avermectin B1a (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นผักกาดเขียวขาวตั้ง และ คะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except flowering white cabbage; and broccoli, Chinese)	0.01
			กลุ่มย่อยพืชสมุนไพร (พืชไม่มีเนื้อ ไม้) ยกเว้นใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้งยี่หระและแมงกะแซง (subgroup of herbs (herbaceous plants), except basil leaves)	0.015
			กระเทียม (garlic)	0.01
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.01
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.01
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.03
			แตงโม (watermelon)	0.01
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.08

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อะบาเม็กทีน (abamectin) (ต่อ)	อะเวอร์เม็กทีน บี1เอ (ละลายในไขมัน) [avermectin B1a (fat soluble)] (ต่อ)	ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ด ที่อวบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.08
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.03
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้ง ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	0.03
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	0.15
			ผักกาดเขียวกวาดตั้ง (flowering white cabbage)	0.01
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกขี้หนูหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.03
			พริกหวาน (รวมทั้งพริกหยวก) (peppers, sweet (including pimiento or pimienta))	0.09
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.5
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.05
			มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.07
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อะบาเม็กทีน (abamectin) (ต่อ)	อะเวอร์แม็กทีน บี1เอ (ละลายในไขมัน) [avermectin B1a (fat soluble)] (ต่อ)	มะม่วง (mango)	0.01
			มะละกอ (papaya)	0.02
			มันเทศ (sweet potato)	0.01
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.01
			ลำไย (longan)	0.05
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.05
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.15
			สับปะรด (pineapple)	0.01
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.03
			หอมแดง (shallot)	0.05
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อะบาเม็กทีน (abamectin) (ต่อ)	อะเวอร์แม็กทีน บี1เอ (ละลายในไขมัน) [avermectin B1a (fat soluble)] (ต่อ)	องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.03
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.005
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
70	อะมิทราซ (amitraz)	ผลรวมของอะมิทราซ และ เอ็น-(2,4-ไดเมทิลฟีนิล)-เอ็น- ไพร์ม-เมทิลฟอร์มามิดีน คำนวณเป็น เอ็น-(2,4-ไดเมทิล ฟีนิล)-เอ็น-เมทิลฟอร์มามิดีน [sum of amitraz and N- (2,4-dimethylphenyl)-N'- methylformamidine, calculated as N-(2,4- dimethylphenyl)-N'- methylformamidine]	กลุ่มผลไม้ที่มีผลแบบแอปเปิล (group of pome fruits)	0.1
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	0.1
			กระเทียม (garlic)	0.05
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.5
			ทุเรียน (durian)	0.05
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	0.5
			พีช (peach)	0.1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.5
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.05
			เมล็ดงา (sesame seed)	0.05
			เมล็ดลหุ่ง (castor bean)	0.05
			ลำไย (longan)	2
			ลitchi (litchi)	2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อะมีทราซ (amitraz) (ต่อ)	ผลรวมของอะมีทราซ และ เอ็น-(2,4-ไดเมทิลฟีนิล)-เอ็น- ไพร์ม-เมทิลฟอร์มามิดีน คำนวณเป็น เอ็น-(2,4-ไดเมทิล ฟีนิล)-เอ็น-เมทิลฟอร์มามิดีน [sum of amitraz and N- (2,4-dimethylphenyl)-N'- methylformamidine, calculated as N-(2,4- dimethylphenyl)-N'- methylformamidine] (ต่อ)	หอมแดง (shallot)	0.05
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.05
			เห็ด ที่ได้จากการเพาะเห็ดพันธุ์ปลูก (Mushrooms, cultivated cultivars)	0.5
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.05
71	อะมีทรีน (ametryn)	อะมีทรีน (ametryn)	กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและ หมัก (Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			สับปะรด (pineapple)	0.05
			อ้อย (sugar cane)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
72	อะลาคลอร์ (alachlor)	ผลรวมของอะลาคลอร์ และ เมแทบอไลต์ที่สามารถแปลง คำนวณกลับให้อยู่ในรูปของ 2,6-ไดเอทิลแอนิซีน (ดีอีเอ) หรือ 2-เอทิล-6-(1-ไฮดร็อกซี เอทิล) แอนิซีน (1-เอชอีเอ) ขึ้นกับ การไฮโดรไลซิส คำนวณเป็น อะลาคลอร์ [sum of alachlor and its metabolites convertible to 2,6-diethylaniline (DEA) or 2-ethyl-6-(1- hydroxyethyl)aniline (1- HEEA) upon basic hydrolysis, calculated as alachlor]	ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.02
			ต้นหอมญี่ปุ่น และต้นหอมแบ่ง (onion, Welsh and multiplying onion)	0.02
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.01
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.02
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.02
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.02
			หอมแดง (shallot)	0.02
			อ้อย (sugar cane)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
73	อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb)	ผลรวมของอินดอกซาคาร์บ และอาร์-เอแนนทิโอเมอร์ (ละลายในไขมัน) [sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble)]	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.07
			กลุ่มผลไม้เปลือกแข็งที่มีเมล็ดแข็ง (group of stone fruits)	1
			กลุ่มผักบริเวณผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.5
			กลุ่มย่อยกะหล่ำต้น (subgroup of stem brassicas)	1
			กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว ยกเว้นกะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูก ต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลีหัว) (subgroup of head brassicas, except cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage)	1
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและ หมัก (Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented)	5
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ยกเว้นถั่วเหลืองฝักสด (เมล็ดที่ อวบน้ำในฝัก) หรือเอดามาเมะ (subgroup of beans with pods, except soya bean (succulent seeds in pods) or vegetable soybean (edamame))	0.9

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb) (ต่อ)	ผลรวมของอินด็อกซาคาร์บ และอาร์-เอแนนทิโอเมอร์ (ละลายในไขมัน) [sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble) (ต่อ)	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม้กลมแห้ง ยกเว้นถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง), ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง), และถั่วเหลือง (เมล็ด แห้ง) (subgroup of dry beans, except cowpea (dry), mung bean (dry), and soya bean (dry))	0.09
			กลุ่มย่อยผักบริเวณผลนอกเหนือจาก กลุ่มแตง - จำพวกพริก (subgroup of peppers)	0.3
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นผักกาดเขียวกวาดต้ง และ คะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except flowering white cabbage; and broccoli, Chinese)	2
			กระเทียม (garlic)	0.02
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.2
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	2
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	3

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) (ต่อ)	ผลรวมของอินดอกซาคาร์บ และอาร์-เอแนนทิโอเมอร์ (ละลายในไขมัน) [sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble) (ต่อ)	ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.09
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	3
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.02
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.2
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	0.02
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.2
			ถั่วพุ่ม (เมล็ดแห้ง) (cowpea (dry))	0.1
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.2
			ถั่วลูกไก่ (เมล็ดแห้ง) (chick-pea (dry))	0.2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.5
			บร็อกโคลี (broccoli)	0.2
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	7
			ผักกาดเขียวทรงตัว (flowering white cabbage)	3
			ผักกาดหอม (lettuce, leaf)	1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อินด็อกซาคาร์บ (indoxacarb) (ต่อ)	ผลรวมของอินด็อกซาคาร์บ และอาร์-เอแนนทิโอเมอร์ (ละลายในไขมัน) [sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble) (ต่อ)	พ룬, แห้ง (prunes, dried)	3
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	0.2
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.5
			มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.08
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.5
			มันเทศ (sweet potato)	0.05
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.02
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.02
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	1
			ลูกเกด (grape, dried (currants, raisins and sultanas))	5
			สะระแหน่ หรือมินต์ ชนิดต่าง ๆ และลูกผสม (mint, species and hybrids)	15
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.02
			หอมแดง (shallot)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) (ต่อ)	ผลรวมของอินดอกซาคาร์บ และอาร์-เอแนนทิโอเมอร์ (ละลายในไขมัน) [sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble) (ต่อ)	หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.02
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	1
			อ้อย (sugar cane)	0.02
			แอปเปิล (apple)	0.5
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05
			กลุ่มนม (group of milks)	0.2
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01 (fat)

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) (ต่อ)	ผลรวมของอินดอกซาคาร์บ และอาร์-เอแนนทิโอเมอร์ (ละลายในไขมัน) [sum of indoxacarb and its R enantiomer (fat soluble) (ต่อ)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	2 (fat)
			ไขมันนม (milk fats)	6
74	อิมซาพิก (imazapic)	อิมซาพิก (imazapic)	ข้าว (rice)	0.05
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
			ข้าวสาลี (wheat)	0.05
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.5
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.5
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.05
			เรปซีด (rape seed)	0.05
			อ้อย (sugar cane)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.1

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อิมซาพิก (imazapic)	อิมซาพิก (imazapic)	กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1
75	อิมซาเซทาเพอร์ (imazethapyr)	ผลรวมของอิมซาเซทาเพอร์ และกรด 5-ไฮดรอกซีเอทิล-2- (4-ไอโซโพรพิล-4-เมทิล-5- ออกโซ-2-อิมิดาโซลิน-2-อิล)นิ โคตินิก รายงานผลเป็นอิมซาเซ ทาเพอร์ [sum of imazethapyr, 5- hydroxyethyl-2-(4- isopropyl-4-methyl-5-oxo- 2-imidazolin-2-yl)nicotinic acid, expressed as imazethapyr]	ข้าว (rice)	0.1
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.1
			ถั่วเลนทิล (เมล็ดแห้ง) (lentil (dry))	0.1
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.03
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.1
			เรปซีด (rape seed)	0.1
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อิมาเซทาเพอร์ (imazethapyr) (ต่อ)	ผลรวมของอิมาเซทาเพอร์ และกรด 5-ไฮดร็อกซีเอทิล-2- (4-ไอโซโพรพิล-4-เมทิล-5- ออกโซ-2-อิมิดาโซลิน-2-อิล)นิ โคตินิค รายงานผลเป็นอิมาเซ ทาเพอร์ [sum of imazethapyr, 5- hydroxyethyl-2-(4- isopropyl-4-methyl-5-oxo- 2-imidazolin-2-yl)nicotinic acid, expressed as imazethapyr] (ต่อ)	กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.01
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
76	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและ เมแทบอลไลต์ที่ประกอบด้วย 6- คลอโรไพริดีนิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid)	กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง ยกเว้นกลุ่มย่อยของถั่วเมล็ดกลม แห้ง; ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง); และ ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (group of pulses, except subgroup of dry peas; mung bean (dry); and soya bean (dry))	2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและ เมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6- คลอโรไพริดีนิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น ยกเว้นแมคคาเดเมีย (group of tree nuts, except macadamia nut)	0.01
			กลุ่มผลไม้สกุลส้ม (group of citrus fruits)	1
			กลุ่มผักรากและผักหัว ยกเว้นมันสำปะหลัง, มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ, และมันเทศ (group of root and tuber vegetables, except cassava, potato, and sweet potato)	0.5
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช ยกเว้นกลุ่มย่อยธัญพืชจำพวก ข้าวโพดหวาน, ข้าวโพดเมล็ดแห้ง, ข้าว, และข้าวฟ่าง (group of cereal grains, except subgroup of sweet corns; maize; rice; and sorghum)	0.05
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)	2
			กลุ่มย่อยธัญพืชจำพวกข้าวโพด หวาน (subgroup of sweet corns)	0.02
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพลัม (รวมทั้ง พรุณสด) (subgroup of plums (including fresh prunes))	1.5
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพีช (รวมทั้ง เนกทารีน และแอปริคอต) (subgroup of peaches (including nectarines and apricots))	1.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและ เมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6- คลอโรไพริดีนิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	กลุ่มย่อยผักบรีโคมผลนอกเหนือจาก กลุ่มแดง - จำพวกพริก ยกเว้นกระเจี๊ยบเขียวหรือ กระเจี๊ยบมอญ (subgroup of peppers, except okra or lady's finger)	1
			กระเจี๊ยบเขียว หรือกระเจี๊ยบมอญ (okra or lady's finger)	0.1
			กระเทียม (garlic)	0.15
			กระเทียมต้น หรือลี้ก (leek)	0.05
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.05
			กะหล่ำดอกพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ทั้งสีขาวและสีเขียว) (cauliflower, several cultivars (white and green))	0.5
			กะหล่ำดาว (Brussels sprout)	0.5
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีใบย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.5
			ข้าว (rice)	0.05
			ข้าวโพดเมล็ดแข็ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและ เมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6- คลอโรไพริดีนิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	ข้าวฟ่าง (เมล็ด) พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (sorghum grain, several cultivars)	0.05
			คะน้า (broccoli, Chinese)	5
			เคล (kale)	5
			เงาะ (rambutan)	3
			ซั่มเมอร์สควอช พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (ผล อ่อน) (squash, summer; several cultivars (immature))	1
			เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	6
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	2
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	1
			แตงโม (watermelon)	0.2
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	3
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.5
			ถั่วเมล็ดกลมที่ไม่มีฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (เมล็ดที่อวบน้ำ) (peas (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) without pods (succulent seeds))	2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและ เมแทบอลไลต์ที่ประกอบด้วย 6- คลอโรไพริดีนิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	ถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Lathyrus</i> L. หรือสกุล <i>Pisum</i> L. (ฝักและเมล็ดที่อวบน้ำ) (peas with pods (<i>Lathyrus</i> spp. or <i>Pisum</i> spp.) (pods and succulent seeds))	5
			ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ดที่ อวบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	2
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	2
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	3
			ทับทิม (pomegranate)	1
			ทุเรียน (durian)	3
			บร็อกโคลี (broccoli)	0.5
			บวบเหลี่ยม (loofah, angled)	0.5
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้ง ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	20
			ใบยี่หระ (cumin leaves)	20
			ผักกาดแก้ว (lettuce, head)	2
			ฝรั่ง (guava)	2
			พริกไทย (pepper)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและ เมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6- คลอโรไพริดีนิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	10
			พ룬, แห้ง (prunes, dried)	5
			แพร์, สาลี่หรือสาลี่จีน หรือไชนีสแพร์, และสาลี่หิมะ (pear; pear, oriental or Chinese pear; and snow pear)	1
			ฟัก (ผลแก่) (wax gourd (mature fruit))	0.1
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	0.5
			มะเขือเปราะ (Thai eggplant)	0.3
			มะเขือม่วง หรือมะเขือยาว พันธุ์ปลูกต่างๆ (eggplant or aubergine, various cultivars)	0.2
			มะม่วง (mango)	0.4
			มะระ หรือมะระขี้นก (bitter melon or bitter cucumber)	0.5
			มะละกอ (papaya)	0.7
			มังคุด (mangosteen)	0.4
			มันเทศ (sweet potato)	0.4
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.4
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.4

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและ เมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6- คลอโรไพริดีนิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	1
			เมล็ดโกโก้หรือเมล็ดคาเคา ชนิดย่อย ต่าง ๆ (cocoa bean or cacao bean, sub-species)	0.05
			เมล็ดงา (sesame seed)	0.05
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	1
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	0.2
			แมคคาเดเมีย Nut (macadamia nut)	0.05
			ลางสาด และลองกอง (langsats and duka)	0.7
			ลำไย (longan)	0.8
			ลิ้นจี่ (litchi)	3
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	0.5
			สับปะรด (pineapple)	0.15
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.7
			หอมแดง (shallot)	2
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.1

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อิมิดาโคลพริด (imidacloprid) (ต่อ)	ผลรวมของอิมิดาโคลพริดและ เมแทบอไลต์ที่ประกอบด้วย 6- คลอโรไพริดีนิล ส่วนหนึ่ง รายงานผลเป็นอิมิดาโคลพริด (sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid) (ต่อ)	องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	1
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.3
			กลุ่มนม (group of milks)	0.1
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1
77	อีทีฟอน (ethephon)	พืชและจากสัตว์: อีทีฟอน (ethephon) เมล็ดธัญพืช: อีทีฟอน และ คอนจูเกต รายงานผลเป็นอีที ฟอน (ethephon and its conjugates, expressed as ethephon)	กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเชอร์รี่ (subgroup of cherries)	5
			กล้วย และลูกผสม (banana and hybrids)	0.5
			ทุเรียน (durian)	1
			มะม่วง (mango)	2
			สับปะรด (pineapple)	1.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อีทีฟอน (ethephon) (ต่อ)	<u>พืชและจากสัตว์:</u> อีทีฟอน (ethephon) <u>เมล็ดธัญพืช:</u> อีทีฟอน และ คอนจูเกต รายงานผลเป็นอีที ฟอน) (ethephon and its conjugates, expressed as ethephon) (ต่อ)	องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.8
			แอปเปิล (apple)	0.8
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.04
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.08
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.4
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
78	อีไธออน (ethion)	อีไธออน (ละลายในไขมัน) [ethion (fat soluble)]	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมพร้อมฝัก (subgroup of peas with pods)	0.3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก (subgroup of beans with pods)	0.3
			กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดไม่กลมแห้ง (subgroup of dry beans)	0.1
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, ผลหรือเบอร์รี่ (subgroup of spices, fruit or berry)	5
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, เมล็ด (subgroup of spices, seeds)	3
			กลุ่มย่อยพืชเครื่องเทศ, รากหรือเหง้า (subgroup of spices, root or rhizome)	0.3
			กลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (รวมทั้งลูกผสมที่คล้ายส้มเปลือกกล่อน) (subgroup of mandarins (including mandarin-like hybrids))	0.3
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.3
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.3

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อีไธออน (ethion) (ต่อ)	อีไธออน (ละลายในไขมัน) [ethion (fat soluble)] (ต่อ)	พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกขี้หนูหรือพริกหนุ่ม พันธ์ปลูกที่เผ็ดชนิดต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	20
			มันเทศ (sweet potato)	0.1
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.1
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.02
			ไลม์ (รวมมะนาวแป้น, มะนาวหนัง, มะนาวไข่) (lime)	1
			ส้มโอ (pummelo)	1
79	อีมาเม็กทีนเบนโซเอต (emamectin benzoate)	อีมาเม็กทีน บี1เอ เบนโซเอต (emamectin B1a benzoate)	กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น ยกเว้นมะพร้าวแก่ (group of tree nuts, except coconut)	0.01
			กลุ่มผักบริโภคผลนอกเหนือจากกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, other than cucurbits)	0.02
			กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง ยกเว้นมะระหรือมะระขี้นก, และแตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้งแตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (group of fruiting vegetables, cucurbits, except bitter melon or bitter cucumber; and cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อิมามะกิทินเบนโซเอต (emamectin benzoate) (ต่อ)	อิมามะกิทิน บี1เอ เบนโซเอต (emamectin B1a benzoate) (ต่อ)	กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	0.02
			กลุ่มย่อยชาดำ ชาเขียว, แห้งและ หมัก (Subgroup of Tea, Black, Green, dried and fermented)	0.1
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	0.2
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.02
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.02
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
			คะน้า (broccoli, Chinese)	0.3
			เงาะ (rambutan)	0.1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อีมาเม็กตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) (ต่อ)	อีมาเม็กติน บี1เอ เบนโซเอต (emamectin B1a benzoate) (ต่อ)	ชมพู่หรือชมพู่แก้วแก้ว, ชมพู่ น้ำดอกไม้มะ, และชมพู่มะเหมี่ยว (java apple, rose apple, and pomerac)	0.1
			เซเลอรี และขึ้นฉ่าย (celery and Chinese celery)	0.5
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.02
			ถั่วฝักยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.015
			ถั่วเมล็ดไม้มกมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ด ที่อบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	0.015
			ถั่วลันเตา (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.015
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้ง ยี่หระและแมงกะแซง (basil leaves)	0.6
			ใบกะเพรา โหระพา แมงลัก รวมทั้ง ยี่หระและแมงกะแซง, แห้ง (basil leaves, dried)	4
			ผลปาล์มน้ำมัน (palm fruit (African oil palm))	0.01
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	0.2

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อีมาเม็กทินเบนโซเอต (emamectin benzoate) (ต่อ)	อีมาเม็กทิน บี1เอ เบนโซเอต (emamectin B1a benzoate) (ต่อ)	มะพร้าวแก่ (coconut)	0.02
			มะม่วง (mango)	0.02
			มะระ หรือมะระขี้นก (bitter melon or bitter cucumber)	0.02
			มันเทศ (sweet potato)	0.1
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.1
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.01
			เมล็ดทานตะวัน (sunflower seed)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
			ลำไย (longan)	0.1
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.1
			องุ่น พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมองุ่น บริโภคสดและองุ่นทำไวน์) (grapes, several cultivars (including table-grapes and wine-grapes))	0.03
			อ้อย (sugar cane)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	อีมาเม็กตินเบนโซเอต (emamectin benzoate) (ต่อ)	อีมาเม็กติน บี1เอ เบนโซเอต (emamectin B1a benzoate) (ต่อ)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.1
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01
80	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	เอ็มซีพีเอ (MCPA)	กลุ่มย่อยถั่วเมล็ดกลมแห้ง (subgroup of dry peas)	0.01
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.05
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.05
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	0.1
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.01
			ข้าวสาลี (wheat)	0.2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	เอ็มซีพีเอ (MCPA) (ต่อ)	เอ็มซีพีเอ (MCPA) (ต่อ)	กลุ่มไขมันสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เว้น ไขมันจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (ยกเว้นไขมันนม) (mammalian fats, except fat from marine mammals (except milk fats))	0.2
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	3
			กลุ่มนม (group of milks)	0.04
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.1
81.	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin)	แอซ็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [azoxystrobin (fat soluble)]	กลุ่มผักแบบฝักถั่ว (group of legume vegetables)	3
			กลุ่มผักแบบหัวหอม (group of bulb vegetables)	10
			กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables))	5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin) (ต่อ)	แอซ็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [azoxystrobin (fat soluble)] (ต่อ)	แก้วมังกร หรือพิทายา (dragon fruit or pitaya)	0.3
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.2
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.2
			ข้าวเปลือก (rice, paddy)	5
			ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.01
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.02
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.01
			คะน้า (broccoli, Chinese)	1.5
			ชมพู หรือชมพูแถมหม่ม, ชมพูน้ำดอกไม้, และชมพูมะเหมี่ยว (java apple, rose apple, and pomerac)	0.2
			แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	1
			แตงโม (watermelon)	1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin) (ต่อ)	แอซ็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [azoxystrobin (fat soluble)] (ต่อ)	ฝรั่ง (guava)	0.2
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกขี้หนูหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	3
			พริกแห้ง (peppers, chili, dried)	30
			มะเฟือง (carambola or star fruit)	0.1
			มะม่วง (mango)	4
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	7
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.03
			เมลอนต่าง ๆ ยกเว้นแตงโม พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (melons, except watermelon (several varieties and cultivars))	1
			ลำไย (longan)	0.5
			ลิ้นจี่ (litchi)	0.5
			สตรอว์เบอร์รี (strawberry)	10
			หน่อไม้ฝรั่ง (asparagus)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.02

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	แอซ็อกซีสโตรบิน (azoxystrobin) (ต่อ)	แอซ็อกซีสโตรบิน (ละลายในไขมัน) [azoxystrobin (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.07
			กลุ่มนม (group of milks)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
			ไขมันนม (milk fats)	0.03
82	แอซีเฟต (acephate)	แอซีเฟต (acephate)	กลุ่มพืชเครื่องเทศ ยกเว้นพริกแห้ง (group of spices, except pepper, chili, dried)	0.2
			กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีไย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	2
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	1

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	แอสีเฟต (acephate) (ต่อ)	แอสีเฟต (acephate) (ต่อ)	ข้าวเปลือก (rice, paddy)	1
			ถั่วเขียว (เมล็ดแห้ง) (mung bean (dry))	0.3
			ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.3
			มะเขือเทศ (รวมทั้งมะเขือเทศเชอร์รี่) (tomato (including cherry tomato))	1
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.5
			เมล็ดกาแฟ พันธุ์ปลูกต่าง ๆ (coffee bean, several cultivars)	0.05
			เมล็ดโกโก้หรือเมล็ดคาเคา ชนิดย่อย ต่าง ๆ (cocoa bean or cacao bean, sub-species)	0.05
			เมล็ดถั่วลิสง (peanut)	0.2
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.5
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.01
			กลุ่มไขมันสัตว์ปีก (group of avian fats)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.01
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	แอสีเฟต (acephate) (ต่อ)	แอสีเฟต (acephate) (ต่อ)	กลุ่มนม (group of milks)	0.02
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.01
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05
83	แอทราซีน (atrazine)	แอทราซีน (ละลายในไขมัน) [atrazine (fat soluble)]	ข้าวโพดฝักอ่อนพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (baby corn, several cultivars)	0.05
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	0.05
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	0.05
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.05
			สับปะรด (pineapple)	0.05
			อ้อย (sugar cane)	0.05
84	โอเมโทเอต (omethoate)	โอเมโทเอต (omethoate)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	โอเมโทเอต (omethoate) (ต่อ)	โอเมโทเอต (omethoate) (ต่อ)	ถั่วเหลือง (เมล็ดแห้ง) (soya bean (dry))	0.01
			มันเทศ (sweet potato)	0.05
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01
			เมล็ดฝ้าย ชนิดและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (cotton seed, several species and cultivars)	0.01
85	ไอโพรไดโอน (iprodione)	ไอโพรไดโอน (iprodione)	กลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ (ยกเว้นผักใบ ของวงศ์กะหล่ำ) ยกเว้นบร็อกโคลี, และกะหล่ำปลี พันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้ง กะหล่ำปลีใบย่น และผักกาดขาว ปลีห่อ) (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables), except broccoli; and cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	0.8
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกเชอร์รี่ (subgroup of cherries)	0.3
			กลุ่มย่อยผลไม้จำพวกพีช (รวมทั้ง เนกทาริน และแอปริคอต) (subgroup of peaches (including nectarines and apricots))	0.05
			กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นคะน้า (subgroup of leaves of Brassicaceae, except broccoli, Chinese)	0.9

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไอโพรไดโอน (iprodione) (ต่อ)	ไอโพรไดโอน (iprodione) (ต่อ)	กะหล่ำปลีพันธุ์และพันธุ์ปลูกต่าง ๆ (รวมทั้งกะหล่ำปลีไย่นและ ผักกาดขาวปลี) (cabbages, head in several varieties and cultivars (includes Savoy cabbage and Chinese cabbage))	5
			ข้าวกล้อง (rice, husked)	10
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	10
			ข้าวโพดเมล็ดแห้ง พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดหวาน (maize, several cultivars, not including sweet corn)	10
			ข้าวโพดหวานฝักสด พันธุ์ปลูกต่าง ๆ แต่ไม่รวมข้าวโพดพันธุ์ที่ใช้ทำ ข้าวโพดคั่ว (sweet corn (corn-on-the-cob) (kernels plus cob with husk removed), several cultivars, not including popcorn)	10
			คะน้า (broccoli, Chinese)	30
			ต้นหอมแบ่ง (multiplying onion)	5
			แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	1
			ถั่วเมล็ดไม่กลมพร้อมฝัก ในสกุล <i>Phaseolus</i> L. (ฝักอ่อนและเมล็ด ที่อวบน้ำ) (beans with pods (<i>Phaseolus</i> spp.) (immature pods and succulent seeds))	1.5

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
	ไอโพรไดโอน (iprodione) (ต่อ)	ไอโพรไดโอน (iprodione) (ต่อ)	บร็อกโคลี (broccoli)	10
			พริกเผ็ด (รวมทั้งพริกชี้ฟ้าหรือ พริกหนุ่ม พันธุ์ปลูกที่เผ็ดฉุนต่าง ๆ) (peppers, chili (including hot pepper and several pungent cultivars))	5
			หอมแดง (shallot)	0.15
			หอมหัวใหญ่ (onion, bulb)	0.15
86	ไอโพรวาลิคาร์บ (iprovalicarb)	ไอโพรวาลิคาร์บ (iprovalicarb)	แตงกวาหรือแตงร้าน (รวมทั้ง แตงกวาอังกฤษและพันธุ์ปลูกต่าง ๆ ที่ปลูกในโรงเรือน) (cucumber (including English and forcing cucumber cultivars))	0.1
			มันฝรั่งชนิดต่าง ๆ (potato)	0.01
87	เฮ็กซะโคนาโซล (hexaconazole)	เฮ็กซะโคนาโซล (hexaconazole)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.01
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.01
			เงาะ (rambutan)	0.01
			แตงเทศ หรือแตงไทย (muskmelon)	0.01
			ถัวยาว (ฝัก) (yard-long bean (pods))	0.01
			ถัวยาว (ฝักอ่อน) (garden pea (immature pods))	0.01
			มะม่วง (mango)	0.01
			มันสำปะหลัง (cassava)	0.01

อันดับ	วัตถุดิบทราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด (มิลลิกรัมต่อ กิโลกรัม)
88	ไฮโดรเจนฟอสไฟด์ (ในรูปของอะลูมิเนียม ฟอสไฟด์, แมกนีเซียม ฟอสไฟด์ หรือฟอสฟีน) [hydrogen phosphide (in term of aluminuim phosphide, magnesium phosphide or phosphine)]	ฟอสไฟด์ทั้งหมด รายงานผล เป็นไฮโดรเจนฟอสไฟด์ (all phosphides, expressed as hydrogen phosphide)	ข้าวกล้อง (rice, husked)	0.1
			ข้าวขัดสี (rice, polished)	0.1

หมายเหตุ

- คำอธิบายชนิดของอาหาร* ในสดมภ์ที่ 4

1. ชนิดของอาหาร* ซึ่งเป็นพืช ให้เป็นไปตามการจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตรตาม มกษ. 9045 ฉบับแก้ไขล่าสุด
2. กระเทียม (garlic) คือ กระเทียมไทย กระเทียมจีน และตามมาตรฐานนี้ให้รวมถึงกระเทียมโทนด้วย
3. ข้าว (rice) ในที่นี้ครอบคลุมข้าวเปลือก (rice, paddy) ข้าวกล้อง (rice, husked) และข้าวขัดสี (rice, polished) ซึ่งสามารถใช้ MRL ที่กำหนดกับสินค้าเกษตรดังกล่าวได้
4. ข้าวเปลือก (rice, paddy) คือ เมล็ดของข้าวเจ้า (non-glutinous rice) และข้าวเหนียว (glutinous rice) ที่ยังมีเปลือกหุ้มอยู่
5. ข้าวกล้อง (rice, husked) คือ ข้าวเปลือกที่ผ่านการกระเทาะเปลือกออกแล้ว
6. ข้าวขัดสี (rice, polished) หมายถึง ข้าวเปลือกที่ผ่านการกระเทาะเปลือกและขัดสีเอาเยื่อหุ้มเมล็ดออก ซึ่งครอบคลุมทั้งข้าวเหนียวขาว (white glutinous rice) และข้าวขาว (white rice or milled rice) ที่เป็นข้าวเจ้า (non-glutinous rice)
7. ไขมัน (fat) คือ เนื้อเยื่อที่เลื่อมหรือตัดออกได้จากซากชำแหละของสัตว์ อาจรวมถึงไขมันในช่องท้อง (omental fat) หรือไขมันรอบไต (perirenal fat) แต่ไม่รวมไขมันแทรก (interstitial fat) ไขมันในมัดกล้ามเนื้อ (intramuscular fat) หรือไขมันนม (milk fat)
8. ไขมันนม (milk fat) ในที่นี้หมายถึงไขมันจากน้ำนมของโค กระบือ แพะ แกะ หรืออูฐ
9. ไข่ (eggs) ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะไข่ของสัตว์ปีก (avian)
10. เครื่องในที่กินได้ (edible offal) คือ ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ ที่นอกเหนือจากกล้ามเนื้อโครงร่าง (skeletal muscle) ไขมันและหนังที่ติดอยู่ ซึ่งพิจารณาว่าเหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์ ในมาตรฐานนี้ มีการใช้นี้กับสัตว์ใด ๆ จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และสัตว์ปีก
11. เคล (kale) ในที่นี้รวมทั้งบอร์โคล (Borecole) หรือคอลลาร์ด (Collards)
12. เนื้อ (meat) คือ ส่วนที่บริโภคได้ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใด ๆ ตามนิยามที่คณะกรรมการอาหารโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission; CAC) รับรองในการประชุมครั้งที่ 45 โดยในมาตรฐานนี้เพิ่มเติมให้ใช้คำว่าเนื้อกับส่วนที่บริโภคได้ของสัตว์ปีกด้วย
13. ผักวงศ์กะหล่ำ (brassica vegetables) ในที่นี้ครอบคลุมผักที่อยู่ใน 4 กลุ่มย่อย ซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มที่ต่างกัน ดังนี้
 - 1) กลุ่มย่อยกะหล่ำที่มีช่อดอกกระจุกแน่น (subgroup of flowerhead brassicas) กลุ่มย่อยกะหล่ำหัว (subgroup of head brassicas) และกลุ่มย่อยกะหล่ำต้น (subgroup of stem brassicas) ซึ่งจัดรวมอยู่ในกลุ่มผักวงศ์กะหล่ำ ยกเว้นผักใบของวงศ์

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

- กะหล่ำ (group of brassica vegetables (except brassica leafy vegetables)) ตัวอย่างผักในกลุ่มย่อยเหล่านี้ เช่น บร็อกโคลี กะหล่ำดอก กะหล่ำปลี ผักกาดขาวปลีห่อชนิดป่าย่าย กะหล่ำปลม ผักกาดเขียวปลี
- 2) กลุ่มย่อยผักใบของวงศ์กะหล่ำ (subgroup of leaves of Brassicaceae) เช่น คะน้า ผักกาดฮ่องเต้ ผักกาดเขียวกวาดต้ง เคล ผักกาดเขียวหรือขุน่าย ผักกวาดต้งญี่ปุ่น ใบแรดิช ใบกะหล่ำปลม ซึ่งจัดรวมอยู่ในกลุ่มผักใบ (group of leafy vegetables)
14. ส้มเขียวหวาน ในที่นี้อยู่ในกลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน สามารถใช้ค่า MRL ที่กำหนดสำหรับกลุ่มย่อยส้มเปลือกกล่อน (subgroup of mandarins) หรือส้มแมนดาริน (mandarin) หรือแทงเจอริน (tangerine) ได้
15. พริกแห้ง ในที่นีัหมายถึงพริกแห้งที่ทำจากพริกเผ็ด (peppers, chili)

- คำอธิบายคำย่อหรือสัญลักษณ์ที่ใช้กำกับค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด ในสคมภ์ที่ 5

1. ข้อความ “(fat)” ที่ระบุตามหลัง MRL ของเนื้อสัตว์ หมายถึง MRL ที่กำหนดสำหรับส่วนของไขมัน (on fat basis) ในเนื้อสัตว์นั้น
2. อักษร “F” ที่ระบุตามหลัง MRL ของนมและผลิตภัณฑ์นม หมายถึง สารพิษตกค้างที่ละลายได้ในไขมัน ทั้งนี้ ในการนำ MRL ของนมที่กำกับด้วยอักษร F มาใช้ให้พิจารณาจากปริมาณไขมันในนมและผลิตภัณฑ์นม ดังนี้
 - 1) กรณีมีปริมาณไขมันน้อยกว่า 2% ให้ใช้ค่าครึ่งหนึ่งของ MRL ของนมแทน
 - 2) กรณีมีปริมาณไขมันมากกว่าหรือเท่ากับ 2% ให้ใช้ค่า 25 เท่าของ MRL ของนมที่กำหนด เปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์นมหรือผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดที่แสดงค่าเป็นปริมาณสารพิษตกค้างต่อน้ำหนักของไขมันนม

แนบท้าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 5)

บัญชีหมายเลข 3

ดีฟอลต์ลิมิต (default limits)

แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

(1) ดีฟอลต์ลิมิตของสารพิษตกค้างในพืช

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีฟอลต์ลิมิต (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
1	คลอร์มีควอต (chlormequat)	คลอร์มีควอตแคทไอออน (chlormequat cation)	0.1
2	คาร์เบนดาซิม, เบโนมิล, หรือ ไทโอฟาเนต-เมทิล (carbendazim, benomyl, or thiophanate-methyl)	ผลรวมของคาร์เบนดาซิม, เบโนมิล และ ไทโอฟาเนต-เมทิล รายงานผลเป็นคาร์ เบนดาซิม (sum of carbendazim, benomyl, and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)	0.01
3	คาร์โบซัลแฟน (carbosulfan)	ผลรวมของคาร์โบซัลแฟน และคาร์โบฟู แรน รายงานเป็นคาร์โบซัลแฟน (sum of carbosulfan and carbofuran, expressed as carbosulfan)	0.005
4	ไซเปอร์เมทริน รวมแอลฟา และ ซีตา-ไซเปอร์เมทริน (cypermethrins including alpha- and zeta-cypermethrin)	ไซเปอร์เมทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cypermethrin (sum of isomers) (fat soluble)]	0.02
5	ไซฟลูทริน หรือ เบตา-ไซฟลูทริน (cyfluthrin or beta-cyfluthrin)	ไซฟลูทริน (ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ) (ละลายในไขมัน) [cyfluthrin (sum of isomers) (fat soluble)]	0.02
6	เดลตาเมทริน (deltamethrin)	ผลรวมของเดลตาเมทริน, และ อัลฟา-อาร์ (alpha-R) และ แทรนส์-เดลตาเมทริน (trans-deltamethrin) (ละลายในไขมัน) [sum of deltamethrin and its alpha-R- and trans- isomers (fat soluble)]	0.05

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีพอลต์ลิมิต (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
7	ไทรอะดิมินอล หรือ ไทรอะดิมิฟอน (triadimenol or triadimefon)	ผลรวมของไทรอะดิมิฟอนและไทรอะดิมินอล (ละลายในไขมัน) [sum of triadimefon and triadimenol (fat soluble)]	0.1
8	ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole)	ไทอะเบนดาโซล (thiabendazole)	0.1
9	ไบเฟนทรีน (bifenthrin)	ไบเฟนทรีน รวมทุกไอโซเมอร์ (ละลายในไขมัน) [Bifenthrin (sum of isomers) (fat soluble)]	0.05
10	เพอร์เมทรีน (permethrin)	เพอร์เมทรีน (ผลรวมของซิส- และทรานส์- ไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [permethrin (sum of cis- and trans- isomers) (fat soluble)]	0.1
11	ฟิโพรนิล (fipronil)	ผลรวมของฟิโพรนิล และฟิโพรนิล- ซัลโฟน (เอ็มบี46136) รายงานผลเป็น ฟิโพรนิล (ละลายในไขมัน) [sum of fipronil and fipronil- sulfone (MB46136), expressed as fipronil (fat soluble)]	0.005
12	เฟนโพรพาทรีน (fenpropathrin)	เฟนโพรพาทรีน (ละลายในไขมัน) [fenpropathrin (fat soluble)]	0.05
13	เฟนวาเลอเรต (fenvalerate)	ผลรวมของไอโซเมอร์ต่าง ๆ ของเฟนวาเลอเรต (ละลายในไขมัน) [sum of fenvalerate isomers) (fat soluble)]	0.02
14	ไซแฮโลทรีน (รวมแลมบ์ดา- ไซแฮโลทรีน) [cyhalothrin (includes lamda-cyhalothrin)]	ไซแฮโลทรีน (ผลรวมของทุกไอโซเมอร์) (ละลายในไขมัน) [cyhalothrin (sum of all isomers) (fat soluble)]	0.05
15	อีมาเมกตินเบนโซเอต (emamectin benzoate)	อีมาเมกติน บี1เอ เบนโซเอต (emamectin B1a benzoate)	0.005

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีฟอลต์ลิมิต (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
16	อะซีเฟต (acephate)	อะซีเฟต (acephate)	0.05
17	โอเมโทเอต (omethoate)	โอเมโทเอต (omethoate)	ตรวจไม่พบ การตกค้างของ โอเมโทเอต ในสินค้าที่ไม่ได้ กำหนด MRL ไว้

หมายเหตุ

- พืช* ให้เป็นไปตามการจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตรตาม มกษ. 9045 ฉบับแก้ไขล่าสุด

(2) ดีฟอลต์ลิมิตของสารพิษตกค้างในสัตว์

อันดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ดีฟอลต์ลิมิต (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
1	ฟีนาซากวิน (fenazaquin)	ผลรวมของฟีนาซากวิน และเมแทบอไลต์ กรด 2-ไฮดร็อกซี-ฟีนาซากวิน รายงาน ผลเป็นฟีนาซากวิน (ละลายในไขมัน) [sum of fenazaquin and the metabolite 2-hydroxy- fenazaquin acid, expressed as fenazaquin (fat soluble)]	0.02
2	เฟนเฮกซามิด (fenhexamid)	เฟนเฮกซามิด (ละลายในไขมัน) [fenhexamid (fat soluble)]	0.05
3	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	เฟนิโตรไทออน (fenitrothion)	0.05
4	อะมีโททราดิน (ametoctradin)	ผลรวมของอะมีโททราดิน, เอ็ม650 เอฟ01 และเอ็ม650เอฟ06 รายงานผล เป็นอะมีโททราดิน (sum of ametoctradin, M650F01 and M650F06, expressed as ametoctradin)	0.03

แนบท้าย ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ.
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง (ฉบับที่ 5)

บัญชีหมายเลข 4
ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
(Extraneous Maximum Residue Limits, EMRLs)

แนบท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่อง อาหารที่มีสารพิษตกค้าง

ลำดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด ที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
1.	คลอร์เดน (chlordane)	พืช: ผลรวมของซิส- และ แทรนส์-คลอร์เดน (ละลาย ในไขมัน) (sum of cis- and trans- chlordane (fat soluble)) สัตว์: ผลรวมของซิส- และแทรนส์-คลอร์เดน และออกซีคลอร์เดน (ละลายในไขมัน) (sum of cis- and trans- chlordane, and oxychlordane) (fat soluble))	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.02*
			ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (type of vegetables, except group of pulses)	0.02*
			ประเภทพืชสมุนไพรและพืชเครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.02*
			กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.02
			กลุ่มน้ำเลี้ยงของไม้ต้น (group of tree saps)	0.02*
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.02
			กลุ่มพืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาล หรือน้ำเชื่อม (group of grasses for sugar or syrup production)	0.02*
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.02

ลำดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด ที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
	คลอร์เดน (chlordane) (ต่อ)	พืช: ผลรวมของซิส- และ แทรนส์-คลอร์เดน (ละลาย ในไขมัน) (sum of cis- and trans- chlordane (fat soluble)) สัตว์: ผลรวมของซิส- และแทรนส์-คลอร์เดน และออกซีคลอร์เดน (ละลายในไขมัน) (sum of cis- and trans- chlordane, and oxychlordane) (fat soluble)) (ต่อ)	กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผล พืชน้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits)	0.02
			กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและ ขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.02*
			น้ำมันและไขมันพืช (plant fats and oils)	0.02
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.02
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.05 (fat)
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05 (fat)
			กลุ่มนม (group of milks)	0.002F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.05 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05 (fat)
			น้ำมันและไขมันสัตว์ (animal fats and oils)	0.05

ลำดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด ที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
	คลอร์เดน (chlordane) (ต่อ)	พืช: ผลรวมของซิส- และ แทรนส์-คลอร์เดน (ละลาย ในไขมัน) (sum of cis- and trans- chlordane (fat soluble)) สัตว์: ผลรวมของซิส- และแทรนส์-คลอร์เดน และออกซีคลอร์เดน (ละลายในไขมัน) (sum of cis- and trans- chlordane, and oxychlordane) (fat soluble) (ต่อ)	เนื้อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (meat of amphibians)	0.02 (fat)
			เนื้อของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น หลายชนิด (meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals)	0.05 (fat)
2.	ดีดีที (DDT)	ผลรวมของพารา พารา- ดีดีที, ออร์โท พารา-ดีดีที, พารา พารา- ดีดีอี และ พารา พารา-ทีดีอี (ดีดีดี) (ละลายในไขมัน) [sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) (fat soluble)]	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.01*
			ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มถั่วเมล็ดแห้งและแครอท (type of vegetables, except group of pulses and carrot)	0.01
			ประเภทพืชสมุนไพรและพืช เครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.01
			กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.01*
			กลุ่มน้ำเลี้ยงของไม้ต้น (group of tree saps)	0.01*
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01*

ลำดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด ที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
	ดีดีที (DDT) (ต่อ)	ผลรวมของพารา พารา- ดีดีที, ออร์โท พารา-ดีดีที, พารา พารา- ดีดีอี และ พารา พารา-ทีดีอี (ดีดีดี) (ละลายในไขมัน) [sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มพืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาล หรือน้ำเชื่อม (group of grasses for sugar or syrup production)	0.01*
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.1
			กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผล พืชน้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits)	0.01*
			กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและ ขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.01*
			แครอท (carrot)	0.2
			น้ำมันและไขมันพืช (plant fats and oils)	0.05
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.3 (fat)
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)
			กลุ่มนม (group of milks)	0.02F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.3 (fat)

ลำดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด ที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
	ดีดีที (DDT) (ต่อ)	ผลรวมของพารา พารา- ดีดีที, ออร์โท พารา-ดีดีที, พารา พารา- ดีดีอี และ พารา พารา-ทีดีอี (ดีดีดี) (ละลายในไขมัน) [sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	1 (fat)
			น้ำมันและไขมันสัตว์ (animal fats and oils)	1
			เนื้อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (meat of amphibians)	1 (fat)
			เนื้อของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น หลายชนิด (meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals)	1 (fat)
3.	ลินเดน (lindane)	ลินเดน (ละลายในไขมัน) [lindane (fat soluble)]	กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.01
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.001
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.005 (fat)
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.001
			กลุ่มนม (group of milks)	0.001
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.005 (fat)

ลำดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด ที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
	ลินเดน (lindane) (ต่อ)	ลินเดน (ละลายในไขมัน) [lindane (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.01 (fat)
			เนื้อของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น หลายชนิด (meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals)	0.01
4	เอนดริน (endrin)	ผลรวมของเอนดริน และ เดลตา-คีโต-เอนดริน (ละลายในไขมัน) [sum of endrin and delta-keto-endrin (fat soluble)]	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.01*
			ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง และกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (type of vegetables, except group of fruiting vegetables, cucurbits; and group of pulses)	0.01*
			ประเภทพืชสมุนไพรและพืช เครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.01*
			กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.01*
			กลุ่มน้ำเลี้ยงของไม้ต้น (group of tree saps)	0.01*
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.01*
			กลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแตง (group o fruiting vegetables, cucurbits)	0.05

ลำดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด ที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
	เอนดริน (endrin) (ต่อ)	ผลรวมของเอนดริน และ เดลตา-คีโต-เอนดริน (ละลายในไขมัน) [sum of endrin and delta-keto-endrin (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มพืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาล หรือน้ำเชื่อม (group of grasses for sugar or syrup production)	0.01*
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.01*
			กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผล พืชน้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits)	0.01*
			กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและ ขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.01*
			น้ำมันและไขมันพืช (plant fats and oils)	0.05
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.005
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.1 (fat)
			กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.05 (fat)
			กลุ่มนม (group of milks)	0.0008F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.1 (fat)

ลำดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด ที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
	เอนดริน (endrin) (ต่อ)	ผลรวมของเอนดริน และ เดลตา-คีโต-เอนดริน (ละลายในไขมัน) [sum of endrin and delta-keto-endrin (fat soluble)] (ต่อ)	กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.05 (fat)
			น้ำมันและไขมันสัตว์ (animal fats and oils)	0.05
			เนื้อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (meat of amphibians)	0.05 (fat)
			เนื้อของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น หลายชนิด (meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals)	0.05 (fat)
5	อัลดริน และ ดิลดริน (aldrin and dieldrin)	ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น และเอชอีโอดี (ละลายในไขมัน) (sum of HHDN and HEOD (fat soluble))	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.05
			ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มผักบริโภคผลในกลุ่มแต่ง กลุ่มผักรากและผักหัว และกลุ่มถั่ว เมล็ดแห้ง (type of vegetables; except group of fruiting vegetables, cucurbits; group of root and tuber vegetables; and group of pulses)	0.05
			ประเภทพืชสมุนไพรและพืช เครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.05
			กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.05

ลำดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด ที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
	อัลดริน และ ดิลดริน (aldrin and dieldrin) (ต่อ)	ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น และเอชอีโอดี (ละลายในไขมัน) (sum of HHDN and HEOD (fat soluble)) (ต่อ)	กลุ่มน้ำเลี้ยงของไม้ต้น (group of tree saps)	0.2
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.05
			กลุ่มผักบรีโคมผลในกลุ่มแตง (group of fruiting vegetables, cucurbits)	0.1
			กลุ่มผักรากและผักหัว (group of root and tuber vegetables)	0.1
			กลุ่มพืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาล หรือน้ำเชื่อม (group of grasses for sugar or syrup production)	0.05
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.02
			กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผล พืชน้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits)	0.05
			กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและ ขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.2
			น้ำมันและไขมันพืช (plant fats and oils)	0.2
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.1
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.2 (fat)

ลำดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด ที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
	อัลดริน และ ดิลดริน (aldrin and dieldrin) (ต่อ)	ผลรวมของเอชเอชดีเอ็น และเอชอีไอดี (ละลายในไขมัน) (sum of HHDN and HEOD (fat soluble)) (ต่อ)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
			กลุ่มนม (group of milks)	0.006F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.2 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
			น้ำมันและไขมันสัตว์ (animal fats and oils)	0.2
			เนื้อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (meat of amphibians)	0.2 (fat)
			เนื้อของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นหลายชนิด (meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals)	0.2 (fat)
6	เฮปทาคลอร์ (heptachlor)	ผลรวมของเฮปทาคลอร์ และเฮปทาคลอร์ อีพ็อกไซด์ (ละลายในไขมัน) (sum of heptachlor and heptachlor epoxide (fat soluble))	ประเภทผลไม้ (type of fruits)	0.01*
			ประเภทผัก ยกเว้นกลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (type of vegetables, except group of pulses)	0.05

ลำดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด ที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
	เฮปทาคลอร์ (heptachlor) (ต่อ)	ผลรวมของเฮปทาคลอร์ และเฮปทาคลอร์ อีพอกไซด์ (ละลายในไขมัน) (sum of heptachlor and heptachlor epoxide (fat soluble)) (ต่อ)	ประเภทพืชสมุนไพรและพืช เครื่องเทศ (type of herbs and spices)	0.05
			กลุ่มถั่วเมล็ดแห้ง (group of pulses)	0.02
			กลุ่มน้ำเลี้ยงของไม้ต้น (group of tree saps)	0.05
			กลุ่มผลเปลือกแข็งของไม้ต้น (group of tree nuts)	0.02
			กลุ่มพืชจำพวกหญ้าที่ใช้ผลิตน้ำตาล และน้ำเชื่อม (group of grasses for sugar or syrup production)	0.01*
			กลุ่มเมล็ดธัญพืช (group of cereal grains)	0.02
			กลุ่มเมล็ดพืชน้ำมันและผล พืชน้ำมัน (group of oilseeds and oilfruits)	0.02
			กลุ่มเมล็ดสำหรับทำเครื่องดื่มและ ขนมหวาน (group of seeds for beverage and sweets)	0.05
			น้ำมันและไขมันพืช (plant fats and oils)	0.02
			กลุ่มไข่ (group of eggs)	0.05
			กลุ่มเครื่องในสัตว์ปีก (group of avian, edible offal of)	0.2 (fat)

ลำดับ	วัตถุอันตราย ทางการเกษตร	ชนิดสารพิษตกค้าง	ชนิดของอาหาร*	ปริมาณสารพิษ ตกค้างสูงสุด ที่ปนเปื้อนจากสาเหตุ ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ (มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)
	เฮปทาคลอร์ (heptachlor) (ต่อ)	ผลรวมของเฮปทาคลอร์ และเฮปทาคลอร์ อีพอกไซด์ (ละลายในไขมัน) (sum of heptachlor and heptachlor epoxide (fat soluble)) (ต่อ)	กลุ่มเครื่องในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of edible offal (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
			กลุ่มนม (group of milks)	0.006F
			กลุ่มเนื้อสัตว์ปีก (group of avian meat)	0.2 (fat)
			กลุ่มเนื้อสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ที่นอกเหนือจากสัตว์ทะเลที่เลี้ยงลูก ด้วยนม (group of meat (from mammals other than marine mammals))	0.2 (fat)
			น้ำมันและไขมันสัตว์ (animal fats and oils)	0.2
			เนื้อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (meat of amphibians)	0.2 (fat)
			เนื้อของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และ สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น หลายชนิด (meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals)	0.2 (fat)

คำอธิบายชนิดของอาหาร* ในสดมภ์ที่ 4

- ชนิดของสินค้าเกษตรซึ่งเป็นพืช ให้เป็นไปตามการจัดหมวดหมู่สินค้าเกษตรตาม มกษ. 9045 ฉบับแก้ไขล่าสุด
- ไขมัน (fat) คือ เนื้อเยื่อที่เลื่อมหรือตัดออกได้จากซากชำแหละของสัตว์ อาจรวมถึงไขมันในช่องท้อง (omental fat) หรือไขมันรอบไต (perirenal fat) แต่ไม่รวมไขมันแทรก (interstitial fat) ไขมันในมัดกล้ามเนื้อ (intramuscular fat) หรือ ไขมันนม (milk fat)
- ไข่ (eggs) ในที่นี้ครอบคลุมเฉพาะไข่ของสัตว์ปีก (avian)
- เครื่องในที่กินได้ (edible offal) คือ ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ ที่นอกเหนือจากกล้ามเนื้อโครงร่าง (skeletal muscle) ไขมันและหนังที่ติดอยู่ ซึ่งพิจารณาว่าเหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์ ในมาตรฐานนี้ มีการใช้คำนี้กับสัตว์ใด ๆ จำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีก สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น หลายชนิด

เอกสารสำหรับเวียนขอข้อคิดเห็นเท่านั้น

5. เนื้อ (meat) คือ ส่วนที่บริโภคได้ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมใด ๆ ตามนิยามที่คณะกรรมการอาหารโคเด็กซ์ (Codex Alimentarius Commission; CAC) รับรองในการประชุมครั้งที่ 45 โดยในมาตรฐานนี้เพิ่มเติมให้ใช้คำว่าเนื้อกับส่วนที่บริโภคได้ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นหลายชนิด และสัตว์ปีกด้วย
6. เนื้อของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (meat of amphibians) ในมาตรฐานนี้ คือ ส่วนที่บริโภคได้ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำใด ๆ รวมถึงส่วนของเครื่องในที่กินได้ของสัตว์ดังกล่าว ซึ่งพิจารณาว่าเหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์ เช่น หนังกบ
7. เนื้อของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่น หลายชนิด (meat of aquatic animals, molluscs and various other invertebrate animals) ในมาตรฐานนี้ คือ ส่วนที่บริโภคได้ของสัตว์น้ำ สัตว์จำพวกหอย และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอื่นใด ๆ รวมถึงส่วนของเครื่องในที่กินได้ของสัตว์ดังกล่าว ซึ่งพิจารณาว่าเหมาะสำหรับการบริโภคของมนุษย์ เช่น กระเพาะปลา หนังกปลา

คำอธิบายคำย่อหรือสัญลักษณ์ที่ใช้กับค่าปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ปนเปื้อนจากสาเหตุที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ในสศมภที่ 5

1. ข้อความ “(fat)” ที่ระบุตามหลัง EMRL ของเนื้อสัตว์ หมายถึง EMRL ที่กำหนดสำหรับส่วนของไขมัน (on fat basis) ในเนื้อสัตว์นั้น
2. อักษร F ที่ระบุตามหลัง EMRL ของนมและผลิตภัณฑ์นม หมายถึง สารพิษตกค้างที่ละลายได้ในไขมัน ทั้งนี้ ในการนำ EMRL ของนมที่กำกับด้วยอักษร F มาใช้ให้พิจารณาจากปริมาณไขมันในนมและผลิตภัณฑ์นม ดังนี้
 - 1) กรณีมีปริมาณไขมันน้อยกว่า 2% ให้ใช้ค่าครึ่งหนึ่งของ EMRL ของนมแทน
 - 2) กรณีมีปริมาณไขมันมากกว่าหรือเท่ากับ 2% ให้ใช้ค่า 25 เท่าของ EMRL ของนมที่กำหนด เปรียบเทียบกับผลวิเคราะห์นมหรือผลิตภัณฑ์นมทั้งหมดที่แสดงค่าเป็นปริมาณสารพิษตกค้างต่อน้ำหนักของไขมันนม
3. เครื่องหมาย * ที่ระบุตามหลัง EMRL บางค่า หมายถึง คำนับกำหนดที่ระดับ Limit of Quantitative (LOQ)