

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
04 квітня 2025 року № 583

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 квітня 2025 року
за № 588/43994

Зміни
до Державних медико-санітарних нормативів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2016 року № 55,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за № 207/28337
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 травня 2020 року № 1276)

1. У таблиці 6:

1) заголовки граф 7–10 викласти у такій редакції:

«

Гранично- допустима концентрація/ орієнтовно безпечний рівень впливу в повітрі робочої зони, мг/м ³	Гранично- допустима концентрація/ орієнтовно безпечний рівень впливу в атмосферному повітрі, мг/м ³	Гранично- допустима концентрація/ орієнтовно допустимий рівень у воді водойм, мг/дм ³	Гранично- допустима концентрація/ орієнтовно допустима концентрація у ґрунті, мг/кг
7	8	9	10

»;

2) рядки 4–7 викласти у такій редакції:

<<

1	2	3		4		5			6	7				8
4	Авіктон Про, КС			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1), піраклостробіном та боскалідом		Контроль за протіоконазолом (2), піраклостробіном та боскалідом			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1), піраклостробіном та боскалідом					3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		протіоконазол, 125 г/л +	0,001 (1,2)	пшениця, ячмінь	0,1 (1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ заг.-сан.	/0,2 (1)	35*		не потр.*	3*	
		піраклостробін, 125 г/л +	0,03		0,2	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6					
		боскалід, 125 г/л	0,04		0,1	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4					
5	Азоксис-Стар, КС	азоксистробін, 250 г/л	0,03	соє (зерно)	0,2	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	35*		не потр.*	3*	
				соє (олія)	не потр.					-		-	-	
6	Айболит, КС			Контроль за епоксиконазолом, піраклостробіном та боскалідом									3 (високостійкий у воді та ґрунті)	
		епоксиконазол, 160 г/л +	0,004	соняшник (насіння)	0,05	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4	30*		не потр.*		3*
		піраклостробін, 100 г/л +	0,03		0,2	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6					
		боскалід, 90 г/л	0,04		1,0	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4					
		епоксиконазол, 160 г/л +	0,004	соняшник (олія)	не потр.	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.-сан.	/0,4	-		-		-
		піраклостробін, 100 г/л	0,03		не потр.	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6					

		+												
		боскалід, 90 г/л	0,04		2,0	/1,5	/0,01	0,03/ заг.- сан.	/0,4					
7	Актуптенд Мікс, ТН (Actuptend Mixx, FS)			Контроль за тіаметоксамом									3 (високостійки й у воді)	
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	пшениця, ячмінь	0,2	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1	не потр.*		не потр.*	не потр.*	
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,02	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2					
		дифенокназол, 25 г/л	0,002		0,05	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3					
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,04	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1	не потр.*		не потр.*	не потр.*	
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,4	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2					
		дифенокназол, 25 г/л	0,002		0,05	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3					
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	соя (олія)	не потр.	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1	-		-	-	
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		не потр.	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2					
		дифенокназол, 25 г/л	0,002		не потр.	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3					
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	картопля	0,08	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1	не потр.*		не потр.*	не потр.*	
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,02	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2					
		дифенокназол, 25 г/л	0,002		0,08	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3					

»;

3) рядки 10–12 викласти викласти у такій редакції:

<<

1	2	3		4						5			6
10	Амісект Дуо, ВГ			Контроль за ацетаміпридом та тіаклопридом									2 (високостійки й у воді)
		ацетаміприд, 250 г/кг +	0,01	ріпак (насіння)	0,05	/0,2	/0,003	0,02/ сан.- токс.	/0,1	30*	не потр.*	3*	
		тіаклоприд, 50 г/кг	0,006		0,05	/0,3	/0,002	0,005/ заг.- сан.	0,09/ водн.-мігр., фітотокс.				
		ацетаміприд, 250 г/кг +	0,01	ріпак (олія)	не потр.	/0,2	/0,003	0,02/ сан.- токс.	/0,1	-	-	-	
		тіаклоприд, 50 г/кг	0,006		не потр.	/0,3	/0,002	0,005/ заг.- сан.	0,09/ водн.-мігр., фітотокс.				
11	Амісон, КС			Контроль за азоксистробіном та ципроконазолом									2 (високостійки й у воді та ґрунті)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,3	50*	не потр.*	3*	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	0,01				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,3	-	-	-	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	0,01				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,3	30*	не потр.*	3*	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	0,01				
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,3	-	-	-	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	0,01				
12	Анорка, ВГ			Контроль за боскалідом та азоксистробіном									3

		боскалід, 350 г/кг +	0,04	соняшник (насіння)	1,0*	/1,5	/0,01	0,03/ заг.- сан.	/0,4	30*	не потр.*	3*	(небезпечний при потраплянні на шкіру, високостійкий у воді та ґрунті)
		азоксистробін, 250 г/кг	0,03		0,2	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,3				
		боскалід, 350 г/кг +	0,04	соняшник (олія)	2,0*	/1,5	/0,01	0,03/ заг.- сан.	/0,4	-	-	-	
		азоксистробін, 250 г/кг	0,03		не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,3				
		боскалід, 350 г/кг +	0,04	ріпак (насіння)	1,0*	/1,5	/0,01	0,03/ заг.- сан.	/0,4	30*	не потр.*	3*	
		азоксистробін, 250 г/кг	0,03		0,2	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,3				
		боскалід, 350 г/кг +	0,04	ріпак (олія)	не потр.*	/1,5	/0,01	0,03/ заг.- сан.	/0,4	-	-	-	
		азоксистробін, 250 г/кг	0,03		не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,3				

»;

4) рядки 15, 16 викласти у такій редакції:

«

15	Асгард, РК			Контроль за мепікват-хлоридом та метконазолом									2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		мепікват-хлорид, 290 г/л +	0,2	ріпак (насіння)	1,0	/0,35	/0,01	0,15/ заг.-сан.	/0,8	50*	не потр.*	3*	
		метконазол, 42 г/л	0,001		0,2	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				
		мепікват-хлорид, 290 г/л +	0,2	ріпак (олія)	не потр.	/0,35	/0,01	0,15/ заг.-сан.	/0,8	-	-	-	
		метконазол, 42 г/л	0,001		не потр.	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-токс.	0,1/ водн.-мігр.				
16	Атаракс, КЕ			Контроль за епоксиконазолом, тебуконазолом та пропіконазолом									3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		пропіконазол, 60 г/л +	0,04	пшениця	0,1	0,5 (с/г роботи),	/0,001	0,15/ орг.	/0,2	30*	не потр.*	3*	

					1,5 (умови виробниц тва)/								
		тебуконазол, 240 г/л +	0,03		0,2	/0,4	/0,02	0,025/ заг.- сан.	/1,0				
		епоксиконазол, 60 г/л	0,004		0,1	/0,01	/0,0005	0,004/ заг.- сан.	/0,4				

»;

5) рядок 23 викласти у такій редакції:

«

23	Блек, КС	хлорантраніліпрол, 200 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,01	/1,5	/0,015	0,001/ заг.- сан.	/0,1	30*	не потр.*	3*	3 (високостійки й у воді та ґрунті)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	

»;

6) рядки 26, 27 викласти у такій редакції:

«

26	Босфан Про, КС			Контроль за азоксистробіном та боскалідом									2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
		боскалід, 200 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	1,0*	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	30*	не потр.*	3*	
		азоксистробін, 300 г/л	0,03		0,2	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		боскалід, 200 г/л +	0,04	соняшник (олія)	2,0	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	-	-	-	
		азоксистробін, 300 г/л	0,03		не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
27	Бредлі, КС	боскалід, 500 г/л	0,04	соняшник (насіння)	1,0*	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	45*	не потр.*	3*	2 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
				соняшник (олія)	2,0*					-	-	-	
				ріпак (насіння)	1,0*					45*	не потр.*	3*	
				ріпак	не потр.					-	-	-	

				(олія)									
				соя (зерно)	3,0*						45*	не потр.*	3*
				соя (олія)	не потр.						-	-	-

»;

7) рядок 35 викласти у такій редакції:

«

35	Вартіс, КС			Контроль за боскалідом, протіюконазолом-дестію (1) та протіюконазолом (2)								3 (високостійкий у воді та ґрунті)	
		боскалід, 250 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	1,0*	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	40*	не потр.*		3*
		протіюконазол, 250 г/л	0,001 (1,2)		0,1 (1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		боскалід, 250 г/л +	0,04	соняшник (олія)	2,0*	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	-	-		-
		протіюконазол, 250 г/л	0,001 (1,2)		не потр.	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		боскалід, 250 г/л +	0,04	ріпак (насіння)	1,0*	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	50*	не потр.*		3*
		протіюконазол, 250 г/л	0,001 (1,2)		0,1 (1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				
		боскалід, 250 г/л +	0,04	ріпак (олія)	не потр.	/1,5	/0,01	0,03 заг.-сан.	/0,4	-	-		-
		протіюконазол, 250 г/л	0,001 (1,2)		не потр.	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)				

»;

8) рядок 39 викласти у такій редакції:

«

39	Вердан, РК	клопіралід, 300 г/л	0,15	ріпак (насіння)	0,2	2,0/	/0,01	0,04/ сан.- токс.	/0,1	не потр.*	не потр.*	3*	3 (високостійкий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.								

»;

9) рядок 42 викласти у такій редакції:

«

42	ВІД КЛІЩІВ, КС			Контроль за абамектином та гекситіазоксом								2
		абамектин, 36 г/л +	0,0002	соя (зерно)	0,01	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	30*	не потр.*	3*
		гекситіазокс, 204 г/л	0,04		0,05	/0,5	/0,05	0,001/ заг.- сан.	/0,1			
		абамектин, 36 г/л +	0,0002	соя (олія)	не потр.	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	-	-	-
		гекситіазокс, 204 г/л	0,04		не потр.	/0,5	/0,05	0,001/ заг.- сан.	/0,1			

»;

10) рядок 44 викласти у такій редакції:

«

44	Гербісалт, РК	гліфосату ізопропіламінна сіль, 41 %	0,01	соя (зерно)	0,3	1,0/	/0,01	0,02/ сан.-токс.	0,5/ трансл.	14 (десикація)*	не потр.*	3*	3 (високостійкий у воді)
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	2					14 (десикація)*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				осіння після- збиральна та весняна передпосівна обробка сільськогоспо- дарських угідь	не потр.					не потр.*	7*	3*	

»;

11) рядок 51 викласти у такій редакції:

«

51	Джоуст Про, КС			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1), протіоконазолом (2), азоксистробіном									2 (високостійкий у воді)
		протіоконазол, 150 г/л	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)	35*	не потр.*	3*	

		+											
		азоксистробін, 150 г/л	0,03		0,5*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)	50*	не потр.*	3*	
		азоксистробін, 150 г/л	0,03		0,2	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (олія)	не потр.	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)	-	-	-	
		азоксистробін, 150 г/л	0,03		не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				

»;

12) рядок 53 викласти у такій редакції:

«

53	Екстраклін К, РК	калійна сіль гліфосату, 663 г/л, у кислотному еквіваленті — 540 г/л	0,01	пари, землі, відведені під посіви сільськогоспо дарських культур	не потр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.- токс.	0,5/ трансл.	не потр.*	не потр.*	3*	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
----	------------------	--	------	---	----------	------	-------	----------------------	--------------	--------------	-----------	----	--

»;

13) рядок 55 викласти у такій редакції:

«

55	Ескаліп, КС			Контроль за спіродиклофеном								2	
		абамектин, 30 г/л +	0,0002	яблука ²	0,01	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	35*	7*		3*
		спіродиклофен, 200 г/л	0,001		0,1*	/0,2	/0,0007	0,002/ сан.- токс.	/0,4				
		абамектин, 30 г/л +	0,0002	яблучний сік	не потр.	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	-	-		-
		спіродиклофен, 200 г/л	0,001		0,05*	/0,2	/0,0007	0,002/ сан.- токс.	/0,4				
		абамектин,	0,0002	декоративні	не потр.	/0,04	/0,0002	0,0003/	/0,3	не	7*		7*

		30 г/л +		насадженья ²				заг.-сан.		потр.*			
		спіродиклофен, 200 г/л	0,001		не потр.	/0,2	/0,0007	0,002/ сан.- токс.	/0,4				

»;

14) рядок 57 викласти у такій редакції:

«

57	Імазахіл, МД			Контроль за імазамоксом та хізалофоп-п-етилом								2 (високостійкий у воді)	
		імазамокс, 40 г/л +	3,0	соняшник (насіння)	1,0	/1,0	/0,04	0,06/ заг.- сан.	/0,4	не потр.*	не потр.*		3*
		хізалофоп-п-етил, 40 г/л	0,01		0,1	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.- сан.	/0,8				
		імазамокс, 40 г/л +	3,0	соняшник олія)	не потр.	/1,0	/0,04	0,06/ заг.- сан.	/0,4	-	-		-
		хізалофоп-п-етил, 40 г/л	0,01		не потр.	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.- сан.	/0,8				
		імазамокс, 40 г/л +	3,0	соя (зерно)	0,5	/1,0	/0,04	0,06/ заг.- сан.	/0,4	не потр.*	не потр.*		3*
		хізалофоп-п-етил, 40 г/л	0,01		0,1	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.- сан.	/0,8				
		імазамокс, 40 г/л +	3,0	соя (олія)	не потр.	/1,0	/0,04	0,06/ заг.- сан.	/0,4	-	-		-
		хізалофоп-п-етил, 40 г/л	0,01		не потр.	/0,2	/0,04	0,0001/ заг.- сан.	/0,8				

»;

15) рядки 59, 60 викласти у такій редакції:

<<

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
59	Імексаб Форте, КЕ	абамектин, 1,8 %	0,0002	soя (зерно)	0,01	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3	30*	не потр.*	3*	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				soя (олія)	не потр.					-	-	-	
60	Імідафос, КС			Контроль за імідаклопридом та лямбда-цигалотрином									2 (високостійкий у воді)
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	ріпак (насіння)	0,1	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	30*	не потр.*	4*	
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,1	/0,1 небез- печний при потрапля нні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05				
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	ріпак (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	-	-	-	
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,2	/0,1 небез- печний при потрапля нні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05				
		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	сопляшник (насіння)	0,05	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	30*	не потр.*	4*	
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,2	/0,1 небез- печний при потрапля нні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05				

		імідаклоприд, 300 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.- сан.	/0,04	-	-	-	
		лямбда-цигалотрин, 100 г/л	0,003		0,4	/0,1 небез- печний при потрапля нні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05				

»;

16) рядок 69, 70 викласти у такій редакції:

«

69	Каптрил, КС (Captryl, SC)	каптан, 480 г/л	0,1	Яблука	0,03	0,3/	/0,01	0,2/ сан.- токс.	/1,0	70*	7*	3*	2
				яблучний сік	0,01								
				Виноград	0,03*					85*	7*	3*	
				виноградни й сік	0,01*					-	-	-	
70	Карнадин, РК (Carnadine, SL)	ацетаміприд, 200 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,05	/0,2	/0,003	0,02/ сан.- токс.	/0,1	35*	не потр.*	3*	3 (високостійкий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	

»;

17) рядок 72 викласти у такій редакції:

«

72	Керамокс Екстра (Ceramox Xtra), ВГ			Контроль за фамоксадонем та цимоксанілом								3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		фамоксадон, 250 г/кг +	0,01	соняшник (насіння)	0,04	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,4	40*	не потр.*	3*
		цимоксаніл, 250 г/кг	0,05		0,04	/1,0	/0,03	0,06/ сан.- токс.	/0,04			
		фамоксадон, 250 г/кг +	0,01	соняшник (олія)	0,1	/1,0	/0,01	0,01/ заг.- сан.	/0,4	-	-	-
		цимоксаніл, 250 г/кг	0,05		не потр.	/1,0	/0,03	0,06/ сан.- токс.	/0,04			

»;

18) рядок 75 викласти у такій редакції:

«

1	2	3		4						5			6
75	Колам Плюс, ФК (Colam Plus, ZC)			Контроль за лямбда-цигалотрином та тіаметоксамом									2
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	пшениця, ячмінь	0,05	/0,1 небез- печний при потрапл янні на шкір у	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05	35*	не потр.*	4*	
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,2	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,2	/0,1 небез- печний при потрапл янні на шкір у	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05	30*	не потр.*	4*	
		тіаметоксам, 141 г/л			0,4	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	соняшник (олія)	0,4	/0,1 небез- печний при потрапл янні на шкір у	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05	-	-	-	
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		не потр.	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1				
		лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	картопля	0,01	/0,1 небез- печний при потрапл янні	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05	20*	10*	4*	

				на шкір у						
тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,08	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1			
лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	буряки цукрові	0,01	/0,1 небез- печний при потрапл янні на шкір у	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05	30*	не потр.*	4*
тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,1	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1			
лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	томати	0,01	/0,1 небез- печний при потрапл янні на шкір у	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05	20*	10*	4*
тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,04	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1			
лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	томатний сік	0,05	/0,1 небез- печний при потрапл янні на шкір у	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05	-	-	-
тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,1	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1			
лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	яблука	0,01	/0,1 небез- печний при потрапл	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05	30*	10*	4*

				янні на шкір у							
	тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,1	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1			
	лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	яблучний сік	0,05	/0,1 небез- печний при потрапл янні на шкір у	/0,001	0,01/ сан.- токс.	/0,05	-	-	-
	тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,05	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1			

»;

19) рядки 78, 79 викласти у такій редакції:

«

1	2	3		4		5		6		7			8
78	Костас, КЕ			<i>Контроль за дифеноконазолом, триадимефоном (за триадименолом), тіофанат-метилом (за карбендазимою)</i>		<i>Контроль за дифеноконазол ом, триадимефоном, тіофанат- метилом</i>		<i>Контроль за дифеноконазолом, триадимефоном (за триадименолом), тіофанат-метилом (за карбендазимою)</i>					3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		дифеноконазол, 120 г/л +	0,002	пшениця	0,05	/0,2	/0,001	0,001/ сан.- токс.	/0,3	35*	не потр.*	3*	
		триадимефон, 50 г/л +	0,03		0,05	0,5/ небез- печний при потрапля нні на шкіру	/0,01	0,02/ сан.- токс.	0,03/ трансл.				
		тіофанат-метил, 200 г/л	0,08		0,1	0,1/	/0,01	0,05/ орг.	/0,4				
		триадименол (метаболіт тріадимефону)	0,03		0,03	0,5/	/0,01	0,05/ сан.- токс.	0,02/ трансл.				
		карбендазим (метаболіт тіофанат-метилу)	0,01		0,1	0,1/	/0,001	0,1/ орг.	/0,1				

79	Кромстар Плюс, КС (Kromstar Plus, SC)			Контроль за пікоксистробіном та ципроконазолом								2 (високостійкий у воді та ґрунті)	
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	пшениця	0,05	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	35*	не потр.*		3*
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,05	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	буряки цукрові	0,05	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	35*	7*		3*
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,1	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,1	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	35*	не потр.*		3*
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	-	-		- 3*
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	сосяшник (насіння)	0,1	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	50*	не потр.*		
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	сосяшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	-	-		-
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,1	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	40*	не потр.*		3*
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	-	-		-
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,1	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	35*	не потр.*		3*

		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	-	-	-	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				

»;

20) рядки 81, 82 викласти у такій редакції:

«

81	Ламіфан Ультра, МЕ			Контроль за пропіконазолом та прохлоразом									2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
		прохлораз, 400 г/л +	0,001	пшениця, ячмінЬ	0,1	/0,1	/0,001	0,06/ сан.- токс.	/0,3	30*	не потр.*	3*	
		пропіконазол, 125 г/л	0,04		0,1	0,5(с/г)/ 1,5 (умови виробн ицтва)/	/0,001	0,15/ орг.	/0,2				
82	Лаурен 600, КС	аклоніфен, 600 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05	/1,0	/0,005	0,01/ заг.- сан.	/0,08	не потр.*	не потр.*	3*	2 (алерген, високостійкий у ґрунті)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	

»;

21) рядок 84 викласти у такій редакції:

«

84	Лендінг, КС	аклоніфен, 600 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05	/1,0	/0,005	0,01/ заг.- сан.	/0,08	не потр.*	не потр.*	3*	2 (високостійкий у ґрунті)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	

»;

22) рядок 86 викласти у такій редакції:

«

86	Логус, КС			<i>Контроль за емаектин бензоатом та альфа-циперметрином</i>									3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		альфа-циперметрин, 100 г/л +	0,005	картопля 2	0,03	/0,1 небезпе чний при потрапл янні	/0,003	0,002/ заг.- сан.	/0,03	20*	10*	4*	

					на шкір у							
		емамектин бензоат, 100 г/л	0,001		0,01*	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.- токс.	/0,3			

»;

23) рядок 89 викласти у такій редакції:

«

89	Лютер Тріо, 537,5 CE			Контроль за S-метолахлором та тербутилазином								3 (високостійкий у воді)	
		S-метолахлор, 375 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,05	/0,5	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02	не потр.*	не потр.*		3*
		тербутилазин, 125 г/л +	0,003		0,4	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		мезотріон, 37,5 г/л	0,001		0,1	/0,2	/0,006	0,02/ сан.- токс.	/0,4				
		S-метолахлор, 375 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.	/0,5	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02	-	-		-
		тербутилазин, 125 г/л +	0,003		не потр.	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		мезотріон, 37,5 г/л	0,001		не потр.	/0,2	/0,006	0,02/ сан.- токс.	/0,4				

»;

24) рядки 92–94 викласти у такій редакції:

«

92	Меткон 100 SL, РК	метконазол, 100 г/л	0,001	пшениця	0,1	/0,2	/0,001	0,002/ сан.- токс.	0,1/ водн.-мігр.	30*	не потр.*	3*	2 (високостійки й у воді та ґрунті)
				ріпак (насіння)	0,2					50*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
93	Метрибуз-Стар, КС	метрибузин, 600 г/л	0,004	соя (зерно)	0,1	/0,3	/0,003	0,1/ заг.- сан.	0,2/ водн.-мігр.	не потр.*	не потр.*	3*	3 (високостійки й у воді)
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
94	Мефіст, KE (Mefist,	метконазол,	0,001	ріпак	0,2	/0,2	/0,001	0,002/ сан.-	0,1/	50*	не потр.*	3*	2

	ЕС)	60 г/л		(насіння)				токс.	водн.-мігр.				(небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	

25) рядок 99 викласти у такій редакції:

«

99	Нікосар 060, МД	нікосульфурон, 60 г/л	0,05	кукурудза (зерно)	0,01	/1,0	/0,01	0,001/ сан.-токс.	0,05/ фітотокс.	не потр.*	не потр.*	3*	3 (небезпечний при потраплянні на шкіру, алерген, високостійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	

26) рядок 102 викласти у такій редакції:

«

102	Параго, РК	дикват дибромід у перерахунку на дикват іон, 150 г/л	0,002	сояшник (насіння)	0,5	0,05/ небезпечний при потрап- лянні на шкір у	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7*	не потр.*	3*	2 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей)
				сояшник (олія)	0,1					-	-	-	
				soя (зерно)	0,5					7*	не потр.*	3*	
				soя (олія)	0,1					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,4					7*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	0,5					-	-	-	

27) рядок 106 викласти у такій редакції:

«

106	Піко-Стар, КС			Контроль за пікоксистробіном та ципроконазолом									2 (високостійки
		пікоксистробін, 200 г/л	0,01	soя	0,1	/1,0	/0,01	0,003/ заг.-	/0,2	30*	не потр.*	3*	

		+		(зерно)				сан.					й у воді та ґрунті)
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	0,01				
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	-	-	-	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	0,01				

»;

28) рядки 111, 112 викласти у такій редакції:

«

1	2	3		4					5			6	
111	Пресслар Плюс, CE (Presslar Plus, SE)			Контроль за пропізохлором та тербутилазином								3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)	
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,2	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.*	не потр.*		3*
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,4	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-		-
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.*	не потр.*		3*
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,2	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-		-
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	сосяшник (насіння)	0,2	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.		3
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003			0,4	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-				

								сан.					
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	-	-	-	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
112	Пресслар, КЕ (Presslar, EC)	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.*	не потр.*	3*	3 (високостійкий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	

»;

29) рядки 115, 116 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	Просенс, ВГ	емамектин бензоат, 100 гл	0,001	кукурудза (зерно)	0,01	/0,1	/0,0004	0,002/ сан.- токс.	/0,3	30*	не потр.*	3*	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,01					не потр.*	не потр.*	3*	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,01					не потр.*	не потр.*	3*	

				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
116	Протіоро, КС			Контроль за протіоконазолом- дестіо (1) та піраклостробіном		Контроль за протіоконазолом та піраклостробіном			Контроль за протіокона- золом-дестіо (1) та піраклост робіном				2 (високостійкий у воді)
		протіоконазол, 210 г/л +	0,001 (1,2)	пшениця, ячмінЬ	0,1 (1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)	35*	не потр.*	3*	
		піраклостробін, 170 г/л	0,03		0,2	/1,0	/0,01	0,02/ заг.- сан.	/0,6				

»;

30) рядки 120, 121 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
120	Регістан Про, РК	дикватон, 250 г/л у формі дикват дихлориду	0,002	соняшник (насіння)	0,5	0,05/ небезпе чний при потрапл янні на шкір у	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	10*	не потр.*	3*	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	0,1					-	-	-	
				соя (зерно)	0,5					10*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	0,1					-	-	-	
121	Рейнпріта Плюс, КС (Rainprita Plus, SC)			Контроль за імідаклопридом		Контроль за імідаклопридо м та бета- цифлутрином		Контроль за імідаклопридом					2 (високостійкий у воді)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	пшениця, ячмінь	0,1	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	35*	не потр.*	3*	
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,05	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	соя (зерно)	0,05	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	50*	не потр.*	3*	
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,02	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04				

імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	соя (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-
бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		не потр.	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04			
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	ріпак (насіння)	0,1	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	40*	не потр.*	3*
бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,1	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04			
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	ріпак (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-
бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		не потр.	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04			
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	40*	не потр.*	3*
бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,05	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04			
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	кукурудза (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-
бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,1	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04			
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	соняшник (насіння)	0,05	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	35*	не потр.*	3*
бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,05	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04			
імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	соняшник (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	-	-	-
бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,1	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04			

31) рядок 126 викласти у такій редакції:

«

»;

126	Сенат- Тебуконазол, ЕВ	тебуконазол, 250 г/л	0,03	пшениця, ячмінь	0,2	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	35*	не потр.*	3*	3 (високостійкий у воді)
				ріпак (насіння)	0,5					50*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	0,5*					-	-	-	

»;

32) рядок 128 викласти у такій редакції:

«

128	Синтак, КС			<i>Контроль за гекситіазоксом та абабектином</i>								3
		гекситіазокс, 204 г/л +	0,04	соя (зерно)	0,05	/0,5	/0,05	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30*	не потр.*	3*
		абабектин, 36 г/л	0,0002		0,01	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3			
		гекситіазокс, 204 г/л +	0,04	соя (олія)	не потр.	/0,5	/0,05	0,001/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-
		абабектин, 36 г/л	0,0002		0,01	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3			
		гекситіазокс, 204 г/л +	0,04	сосяшник (насіння)	0,01*	/0,5	/0,05	0,001/ заг.-сан.	/0,1	30*	не потр.*	3*
		абабектин, 36 г/л	0,0002		0,01	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3			
		гекситіазокс, 204 г/л +	0,04	сосяшник (олія)	не потр.*	/0,5	/0,05	0,001/ заг.-сан.	/0,1	-	-	-
		абабектин, 36 г/л	0,0002		0,01	/0,04	/0,0002	0,0003/ заг.-сан.	/0,3			

»;

33) рядки 130, 131 викласти у такій редакції:

«

1	2	3		4						5			6
130	Сіанан, КС			Контроль за дифеноконазолом та піраклостробіном									3 (високостійкий у воді)
		дифеноконазол, 130 г/л +	0,002	соя (зерно)	0,05	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	45*	не потр.*	3*	
		піраклостробін, 130 г/л	0,03		0,05	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		дифеноконазол, 130 г/л +	0,002	соя (олія)	0,1	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		піраклостробін, 130 г/л	0,03		0,1*	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		дифеноконазол, 130 г/л +	0,002	ріпак (насіння)	0,1	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	50*	не потр.*	3*	
		піраклостробін, 130 г/л	0,03		0,2	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
		дифеноконазол, 130 г/л +	0,002	ріпак (олія)	0,2*	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3	-	-	-	
		піраклостробін, 130 г/л	0,03		0,3	/1,0	/0,01	0,02/ заг.-сан.	/0,6				
131	Слуга (Sluga), РК (SL)	дикват дибромід, 200 г/л	0,002	ріпак (насіння)	0,4	0,05/ небезпечний при потрапленні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7*	не потр.*	3*	2 (небезпечний при потрапленні на шкіру та слизові оболонки очей)
				ріпак (олія)	0,5	у							

»;

34) рядок 133 викласти у такій редакції:

«

133	Сперамет, МД (Speramet OD)			<i>Контроль за сумою спіротетрамату і спіротетрамат-єнолу, вираженою як спіротетрамат</i>									3
		спіротетрамат, 150 г/л	0,01	яблука	0,3	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	21*	7*	3*	
				яблучний сік	0,1					-	-	-	

				томати	1,0					21*	7*	3*	
				томатний сік	0,1					-	-	-	
				виноград	0,8					30*	7*	3*	
				виноградний сік	0,5*					-	-	-	
				соя (зерно)	0,9					50*	7*	3*	
				соя (олія)	0,4					-	-	-	

»;

35) рядки 135, 136 викласти у такій редакції:

«

135	Стеліум Ультра, ТН			Контроль за тебуконазолом, прохлоразом, боскалідом та тіаметоксамом									2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		тебуконазол, 30 г/л +	0,03	пшениця, ячмінь	0,2	/0,4	/0,02	0,025/ заг.-сан.	/1,0	не потр.*	не потр.*	не потр.*	
		прохлораз, 150 г/л +	0,001		0,1	/0,1	/0,001	0,06/ сан.-токс.	/0,3				
		боскалід, 30 г/л +	0,04		0,1	/1,5	/0,01	0,03/ заг.-сан.	/0,4				
		тіаметоксам, 300 г/л	0,02		0,2	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
136	Стопграс, ВГ	трибенурон-метил, 750 г/кг	0,005	пшениця, ячмінь	0,01	/0,1	/0,003	0,06/ заг.-сан.	/0,01	не потр.*	не потр.*	3*	3
				соняшник (насіння)	0,02					не потр.*	не потр.*	3*	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	

»;

36) рядок 139 викласти у такій редакції:

«

139	Сутон, СЕ			<i>Контроль за тербутилазином та S-метолахлором</i>									3 (високостійкий
		S-метолахлор,	0,01	соняшник	0,1	/0,5	/0,02	0,02/ сан.-	/0,02	не	не потр.*	3*	

		468 г/л +		(насіння)				токс.		потр.*			у воді)
		тербутилазин, 281 г/л	0,003		0,4	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		S-метолахлор, 468 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.	/0,5	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02	-	-	-	
		тербутилазин, 281 г/л	0,003		не потр.	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				

»;

37) рядок 142, 143 викласти у такій редакції:

«

142	Тезосар 500, КС	тербутилазин, 500 г/л	0,003	кукурудза (зерно)	0,4	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04	не потр.*	не потр.*	3*	3 (високостійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,4					не потр.*	не потр.*	3*	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
143	Тембейк, МД	темботріон, 44 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,02	/0,1	/0,0000 5	0,0002/ сан.-токс.	/0,4	не потр.*	не потр.*	3*	2 (алерген, високостійкий у воді)
		ізоксадифен- етил, 22 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	-	-	-		
		темботріон, 44 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.	/0,1	/0,0000 5	0,0002/ сан.-токс.	/0,4				
		ізоксадифен- етил, 22 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.					

»;

38) рядок 146 викласти у такій редакції:

«

146	Тетрапрід Плюс, КС (Tetraprid Plus SC)		Контроль за сумою спіротетрамату і спіротетрамат-	Контроль за спіротетраматом та тіаклопридом		2 (високостійкий у воді)
-----	--	--	---	--	--	--------------------------------

				<i>єнолу, вираженою як спіротетрамат, та тіаклопридом</i>								
		спіротетрамат, 120 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,04*	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	45*	не потр.*	3*
		тіаклоприд, 120 г/л	0,006		0,02	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мігр., фітотокс.			
		спіротетрамат, 120 г/л +	0,01	соняшник (олія)	0,04*	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	-	-	-
		тіаклоприд, 120 г/л	0,006		не потр.	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мігр., фітотокс.			
		спіротетрамат, 120 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,04*	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	45*	не потр.*	3*
		тіаклоприд, 120 г/л	0,006		0,05	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мігр., фітотокс.			
		спіротетрамат, 120 г/л +	0,01	ріпак (олія)	0,04*	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	-	-	-
тіаклоприд, 120 г/л	0,006	0,05	/0,3		/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.-мігр., фітотокс.					

»;

39) рядок 150 викласти у такій редакції:

«

150	Трісолют Мікс, МД (Trisolut Mixx OD)			<i>Контроль за М-4-хлорфеноксистою кислотою (2М-4Х) (1), мезосульфурон-метилом та флорасуламом</i>	<i>Контр оль за 2М-4Х ІОЕ</i>	<i>Контроль за М-4-хлорфеноксистою кислотою (2М-4Х) (1), мезосульфурон-метилом та флорасуламом</i>						3
		2-метил-4-хлорфеноксистої кислоти ізооктиловий ефір (2М-4Х ІОЕ), 240 г/л +	0,008 (1)			/ 1,0 (2)	/0,02 (1)	0,003/ орг. (1)	/0,02 (1)	не потр.*	не потр.*	3*
		мезосульфурон-метил, 9 г/л +	0,1			0,01	/0,6	/0,02	0,001/ заг.-сан.	/0,2		

		флорасулам, 6 г/л +	0,05		0,01	/1,0	/0,003	0,1/ сан.- токс.	0,05/ фітотокс.				
		мефенпір-діетил, 25,2 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				

»;

40) рядок 152 викласти у такій редакції:

«

152	Фаворит 300, РК	клопіралід, 300 г/л	0,15	пшениця, ячмінь, овес	0,2	2,0/	/0,01	0,04/ сан.- токс.	/0,1	не потр.*	не потр.*	3*	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				просо	0,1					не потр.*	не потр.*	3*	
				кукурудза (зерно)	0,1					не потр.*	не потр.*	3*	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				капуста	0,1					не потр.*	не потр.*	3*	
				цибуля, крім на перо	0,1					не потр.*	не потр.*	3*	
				ріпак (насіння)	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	

»;

41) рядки 154–157 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
154	Феномен Прайм, ВГ	каптан, 780 г/кг	0,1	яблука яблучний сік	0,03 0,01	0,3/	/0,01	0,2/ сан.- токс.	/1,0	40* -	7* -	3* -	2 (небезпечний при попаданні на слизові оболонки очей)

155	Флока Екстра, ВГ (Flosa Xtra, WG)			<i>Контроль за сумою флонікаміду та метаболітів TFNA та TFNG у перерахунку на флонікамід</i>								2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)	
		флонікамід, 500 г/кг	0,004	яблука	0,3	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	35*	7*	3*	
				яблучний сік	0,03					-	-	-	
				<i>Яблучний сік не рекомендується для використання у дитячому харчуванні</i>									
				ріпак (насіння)	0,06*					49*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.*					-	-	-	
				картопля	0,09*					28*	7*	3*	

156	Флоупрід Плюс, ВГ (Flowprid Plus, WG)			<i>Контроль за сумою флонікаміду та метаболітів TFNA та TFNG у перерахунку на флонікамід, та ацетаміпридом</i>		<i>Контроль за флонікамідом та ацетаміпридом</i>							2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	яблука	0,3	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	42*	7*	3*	
			ацетаміприд, 150 г/кг		0,01	0,05	/0,2	/0,003	0,02/ сан.- токс.				
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	яблучний сік	0,03	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	-	-	-	
			ацетаміприд, 150 г/кг		0,01	0,01	/0,2	/0,003	0,02/ сан.- токс.				
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	ріпак (насіння)	0,06	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	49*	не потр.*	3*	
			ацетаміприд, 150 г/кг		0,01	0,05	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-				

		150 г/кг					токс.						
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	ріпак (олія)	не потр.	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	-	-	-	
		ацетаміприд, 150 г/кг	0,01		не потр.	/0,2	/0,003	0,02/ сан.- токс.	/0,1				
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	соє (зерно)	0,06*	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	56*	не потр.*	3*	
		ацетаміприд, 150 г/кг	0,01		0,1	/0,2	/0,003	0,02/ сан.- токс.	/0,1				
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	соє (олія)	не потр.	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	-	-	-	
		ацетаміприд, 150 г/кг	0,01		не потр.	/0,2	/0,003	0,02/ сан.- токс.	/0,1				
157	Флурооксі, КЕ	флуороксибір, 333 г/л у формі метил- гептилового ефіру, 480 г/л	0,2	пшениця, ячмін	0,05	/1,0	/0,003	0,01/ заг.- сан.	/0,2	не потр.*	не потр.*	3*	2 (високостійкий у воді)
				кукурудза (зерно)	0,05					не потр.*	не потр.*	3*	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	

»;

42) рядки 161, 162 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
161	Халветік, РК	гліфосату ізопропіламіна сіль, 242,9 г/л, у кислотному еквіваленті, 180,0 г/л	0,01	осіння післязбирал ьна та весняна обробка сільськогос подарських угідь, земель несільськог осподарсько го користуван ня, міжрядь садів,	не потр.*	1,0/	/0,01	0,02/ сан.- токс.	0,5/ трансл.	не потр.*	7*	3*	2 (небезпечний при погортаванні на слизові оболонки очей, алерген, високостійкий у воді)

				виноградни ків, декоративн их, лісових та сільськог осподарськ их культур									
162	Харбор, КС		Контроль за тіаметоксамом та біфентрином										3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		тіаметоксам, 150 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,04	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1	50*	не потр.*	4*	
		біфентрин, 170 г/л	0,02		0,1	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		тіаметоксам, 150 г/л +	0,02	соя (олія)	не потр.	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1	-	-	-	
		біфентрин, 170 г/л	0,02		не потр.	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		тіаметоксам, 150 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,4	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1	40*	не потр.*	4*	
		біфентрин, 170 г/л	0,02		0,2	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				
		тіаметоксам, 150 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.	/0,5 аерозол ь	/0,03	0,04/ сан.- токс.	/0,1	-	-	-	
		біфентрин, 170 г/л	0,02		0,5	/0,01	/0,001	0,005/ заг.-сан.	/0,1				

»;

43) рядок 164 викласти у такій редакції:

«

164	Хвастокс Турбо 340, РК			Контроль за 2М-4Х та дикамбою										3 (небезпечний при по потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		2-метил- 4-хлорфеноксиоцтова кислота, 300 г/л, в перерахунку на калієву сіль 2М-4Х, 357 г/л +	0,008	пшениця, ячмінь, тритикале, жито, овес	0,2	/ 1,0	/0,02	0,003/ орг.	/0,02	не потр.*	не потр.*	3*		

		дикамба, 40 г/л, в перерахунку на натрієву сіль дикамби, 44 г/л	0,004		0,04	1,0/	/0,01	0,02/ сан.- токс.	0,25/ трансл.				
		2-метил- 4-хлорфеноксоцтова кислота, 300 г/л, в перерахунку на калієву сіль 2М-4Х, 357 г/л +	0,008	кукурудза (зерно)	0,1	/ 1,0	/0,02	0,003/ орг.	/0,02	не потр.*	не потр.*	3*	
		дикамба, 40 г/л, в перерахунку на натрієву сіль дикамби, 44 г/л	0,004		0,1	1,0/	/0,01	0,02/ сан.- токс.	0,25/ трансл.				
		2-метил- 4-хлорфеноксоцтова кислота, 300 г/л, в перерахунку на калієву сіль 2М-4Х, 357 г/л +	0,008	кукурудза (олія)	не потр.	/ 1,0	/0,02	0,003/ орг.	/0,02	-	-	-	
		дикамба, 40 г/л, в перерахунку на натрієву сіль дикамби, 44 г/л	0,004		не потр.	1,0/	/0,01	0,02/ сан.- токс.	0,25/ трансл.				

»;

44) рядок 166 викласти у такій редакції:

«

166	Церіс, ВГ	етаметсульфурон- метил, 750 г/кг	0,02	ріпак (насіння)	0,01	/1,7	/0,006	0,015/ заг.-сан.	/0,1	не потр.*	не потр.*	3*	3 (високостійкий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	

»;

45) рядок 169 викласти у такій редакції:

«

169	Шетефон, РК	етефон, 660 г/л	0,006	соняшник (насіння)	0,1	/1,0	/0,02	0,01/ заг.- сан.	/0,5	не потр.*	не потр.*	3*	3
-----	-------------	--------------------	-------	-----------------------	-----	------	-------	---------------------	------	--------------	-----------	----	---

				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
--	--	--	--	--------------------	----------	--	--	--	--	---	---	---	--

»;

46) рядок 172 викласти у такій редакції:

«

172	Штеф-екстра Голд, СЕ			Контроль за S-метолахлором та тербутилазином								3 (високостійкий у воді)	
		S-метолахлор, 312,5 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1	/0,5	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02	не потр.*	не потр.*		3*
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,4	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				
		S-метолахлор, 312,5 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.	/0,5	/0,02	0,02/ сан.- токс.	/0,02	-	-		-
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.	/1,0	/0,05	0,005/ заг.-сан.	/0,04				

».

2. Доповнити новою таблицею такого змісту:

«Таблиця 7

№ з/п	Назва препарату	Назва діючої речовини	Допустима добова доза, мг/кг	Максимально допустимий рівень в продуктах харчування, мг/кг (мг/л)		Гранично допустима концентрація в повітрі робочої зони, мг/м³	Гранично допустима концентрація в атмосферному повітрі, мг/м³	Гранично допустима концентрація у воді водойм, мг/дм³	Гранично допустима концентрація у ґрунті, мг/кг	Строки очікування до збору врожаю, дні	Строки виходу на оброблені ділянки, дні		Клас небезпечності
				культура	максимально допустимий рівень						ручні роботи	механізовані роботи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Авант, КЕ	індоксакарб, 150 г/л	0,0005	кукурудза (зерно)	0,01	0,05	0,0003	0,0002 заг.-сан.	0,2	35	не потр.	3	3
				кукурудза (олія)	0,02					-	-	-	
2	Адарайв, КЕ			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та тебуконазолом		Контроль за протіоконазолом (2) та тебуконазолом			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та тебукона				3 (високостійкий у воді)

									золот				
		тебуконазол, 280 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	30*	не потр.*	3*	
		протіоконазол, 100 г/л	0,001 (1,2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		тебуконазол, 280 г/л +	0,03	ріпак (олія)	0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	-	-	-	
		протіоконазол, 100 г/л	0,001 (1,2)		не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		тебуконазол, 280 г/л +	0,03	пшениця	0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	30*	не потр.*	3*	
		протіоконазол, 100 г/л	0,001 (1,2)		0,1	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
3	Акура, РК	мепікват-хлорид, 300 г/л	0,2	ріпак (насіння)	1,0	0,35	0,01	0,15 заг.-сан.	0,8	не потр.*	не потр.*	3*	3 (високостій кий у воді)
			ріпак (олія)	не потр.						-	-	-	
			пшениця	0,4*						не потр.*	не потр.*	3*	
4	Амбір, СК	лямбда-цигалотрин, 300 г/л	0,003	ріпак (насіння)	0,1	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05	45*	не потр.*	4*	3 (небезпечн ий при потраплянні і на слизові оболонки очей)
				ріпак (олія)	0,2					-	-	-	
				пшениця	0,05					35*	не потр.*	4*	
5	Амістар Голд 250 SC, КС			Контроль за азоксистробіном та дифеноконазолом									2 (високостій кий у воді та ґрунті)
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	30	не потр.	3	
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	-	-	-	

		дифеноконазол, 125 г/л	0,002	ріпак (насіння)	0,4	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	30	не потр.	3	
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.	1	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	-	-	-	
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,2	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
6	Ампліго 150 ZC, ФК			Контроль за хлорантраніліпролом та лямбда-цигалотрином								2 (високостій- кий у воді та ґрунті)	
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	соняшник ¹ (насіння)	0,05	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	30	не потр.		4
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	-	-		-
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,4	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
		хлорантранілі- прол, 100 г/л +	0,02	кукурудза ¹ (зерно)	0,01	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	30	не потр.		4
		лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	/0,05				
		хлорантранілі- прол, 100 г/л	0,02	кукурудза (олія)	не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	-	-		-

2
(високостій
кий у воді
та ґрунті)

		+											
		лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003		0,2	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05				
7	Антигусінь, КС	лямбда-цигалотрин, 50 г/л	0,003	пшениця, ячмінь	0,05	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05	35	не потр.	4	2
8	Арданіс, КС			Контроль за клотіанідином та бета-цифлутрином									3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		клотіанідин, 250 г/л +	0,08	ріпак (насіння)	0,05	1,5	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	50*	не потр.*	4*	
		бета-цифлутрин, 50 г/л	0,01		0,1	0,01	0,001	0,001 заг.-сан.	0,04				
		клотіанідин, 250 г/л +	0,08	ріпак (олія)	не потр.	1,5	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	-	-	-	
		бета-цифлутрин, 50 г/л	0,01		0,4	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		клотіанідин, 250 г/л +	0,08	пшениця	0,02	1,5	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	50*	не потр.*	4*	
		бета-цифлутрин, 50 г/л	0,01		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
9	Ардіс, ВГ			Контроль за ацетаміпридом та біфентрином									3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		ацетаміприд, 250 г/кг +	0,01	картопля ²	0,025	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	30*	7*	3*	
		біфентрин, 250 г/кг	0,02		0,05	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1				
10	Артемікс, КС	міді оксихлорид, 239,36 г/л +	0,05 (по міді)	персик ²	5,0	0,5	0,003 — максимальна разова; 0,001 — середньодобова	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.	30	7	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
		міді гідроксид,	0,05		5,0	0,5	0,03 —	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.				

		236,64 г/л у загальному перерахунку на металеву мідь, 272 г/л	(по міді)				максимальна разова; 0,005 — середньо- добова					
		міді оксихлорид, 239,36 г/л +	0,05 (по міді)	персиковий сік	5,0	0,5	0,003 — максимальна разова; 0,001 — середньо- добова	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.	-	-	-
		міді гідроксид, 236,64 г/л у загальному перерахунку на металеву мідь, 272 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5	0,03 — максимальна разова; 0,005 — середньо- добова	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.			
		міді оксихлорид, 239,36 г/л +	0,05 (по міді)	яблука ²	5,0	0,5	0,003 — максимальна разова; 0,001 — середньо- добова	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.	30	7	3
		міді гідроксид, 236,64 г/л у загальному перерахунку на металеву мідь, 272 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5	0,03 — максимальна разова; 0,005 — середньо- добова	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.			
		міді оксихлорид, 239,36 г/л +	0,05 (по міді)	яблучний сік	5,0	0,5	0,003 — максимальна разова; 0,001 — середньо- добова	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.	-	-	-
		міді гідроксид, 236,64 г/л у загальному перерахунку на металеву мідь, 272 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5	0,03 — максимальна разова; 0,005 — середньо- добова	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.			
11	Архітект® Прайм, ВГ				Контроль за мефентрифлуконазолом, мепікват-хлоридом та прогексадіоном-кальцію							
		мефентрифлу- коназол,	0,035	ріпак (насіння)	0,01	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,08	50	не потр.	3 (високостій кий у воді)

		112,5 г/кг +											та ґрунті)
		мепікват-хлорид, 300 г/кг +	0,2		1,0	0,35	0,01	0,15 заг.-сан.	0,8				
		прогексадіон-кальцію, 50 г/кг	0,02		0,01	1	0,01	0,03 заг.-сан.	0,2				
		мефентрифлу-коназол, 112,5 г/кг +	0,035	ріпак (олія)	0,1	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,08	-	-	-	
		мепікват-хлорид, 300 г/кг +	0,2		не потр.	0,35	0,01	0,15 заг.-сан.	0,8				
		прогексадіон-кальцію, 50 г/кг	0,02		не потр.	1	0,01	0,03 заг.-сан.	0,2				
12	Атік Макс, КС	ацетаміприд, 300 г/л	0,01	пшениця	0,1	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	30	не потр.	3	3
				ріпак (насіння)	0,05					45	не потр.	3	(високостійкий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1					40	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,1					50	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				люцерна	не потр.					не потр.	7	3	
				яблука	0,05					45	7	3	
				яблучний сік	0,01					-	-	-	
13	Атрікс Максі, КС	альфа-циперметрин, 400 г/л	0,005	ріпак (насіння)	0,4	0,1 небезпечний при потраплянні	0,003	0,002 заг.-сан.	0,03	30	не потр.	4	2
				ріпак (олія)	1,0					-	-	-	(небезпечний при потраплянні)

				пшениця озима	0,01	на шкіру				30	не потр.	4	і на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
14	Ацетам SC, КС	ацетаміприд, 400 г/л	0,01	пшениця	0,1	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	35*	не потр.*	3*	3 (високостійкий у воді)
				ріпак (насіння)	0,05					35*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1					30*	не потр.*	3*	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
15	АЦ Люкс Ліквід, КС	ацетаміприд, 200 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,05	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	35	не потр.	3	3 (високостійкий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.								
16	Байндстрайк, КЕ			Контроль за флуроксипіром		Контроль за флуроксипіром-метилом		Контроль за флуроксипіром					2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		флуроксипір, 333 г/л	0,2	пшениця	0,05	1,0	0,003	0,01 заг.-сан.	0,2	не потр.	не потр.	3	
17	Баракуда, ВГ	боскалід, 500 г/кг	0,04	соняшник (насіння)	1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	35*	не потр.*	3*	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
				соняшник (олія)	2,0					-	-	-	
				ріпак (насіння)	1,0					35	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
18	Баркас Мікс, СЕ (Barkas Mixx, SE)			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексильовим ефіром		Контроль за 2,4-Д					3 (високостійкий у воді)
		2,4-Д 2-етилгексильовий ефір, 271 г/л	0,0001	пшениця, ячмінь	0,02	0,5	0,0005	0,002 сан.-токс.	0,1 трансл.	не потр.	не потр.	3	

		+											
		флорасулам, 5 г/л +	0,05		0,01	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
		амінопіралід, 10 г/л	0,05		0,1	1,5	0,05	0,002 заг.-сан.	0,4				
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 271 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015	0,5	0,0005	0,002 сан.-токс.	0,1 трансл.	не потр.	не потр.	3	
		флорасулам, 5 г/л +	0,05		0,1	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
		амінопіралід, 10 г/л	0,05		0,1	1,5	0,05	0,002 заг.-сан.	0,4				
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 271 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.	0,5	0,0005	0,002 сан.-токс.	0,1 трансл.	-	-	-	
		флорасулам, 5 г/л +	0,05		не потр.	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
		амінопіралід, 10 г/л	0,05		не потр.	1,5	0,05	0,002 заг.-сан.	0,4				
		19	Бастіон, ТН			Контроль за дифеноконазолом							
дифеноконазол, 30 г/л +	0,002	ячмінь		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	не потр.	не потр.	не потр.		
ципроконазол, 6,25 г/л	0,002			0,1	0,1	0,01	0,03 сан.-токс.	0,01					
20	Бельвін, КС	флубендіамід, 480 г/л	0,003	кукурудза (зерно)	0,05	0,2	0,001	0,003 заг.-сан.	0,25 трансл.	48*	не потр.*	3*	3 (високостій кий у воді та ґрунті)
				кукурудза (олія)	0,2*						-	-	
				соняшник (насіння)	0,05					35*	не потр.*	3*	
				соняшник (олія)	0,2*					-	-	-	
				ріпак	0,1					40*	не потр.*	3*	

				(насіння)									
				ріпак (олія)	0,2					-	-	-	
21	Бенк, УР			Контроль за дельтаметрином та піпероніл бутоксидом									3 високостійкий у зерні на зберіганні
		дельтаметрин, 6 г/л +	0,003	пшениця (запаси зерна на зберіганні)	1,0	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,006 сан.-токс.	0,01 трансл.	≤ МДР	1 година	1 година	
		піпероніл бутоксид, 54 г/л (синергіст)	0,03		4,0	1,5	0,05	не нормований	не нормований				
		дельтаметрин, 6 г/л +	0,003	кукурудза (запаси зерна на зберіганні)	1,0	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,006 сан.-токс.	0,01 трансл.	≤ МДР	1 година	1 година	
		піпероніл бутоксид, 54 г/л (синергіст)	0,03		4,0	1,5	0,05	не нормований	не нормований				
22	Бента, РК (Benta SL)	бентазон, 480 г/л	0,1	горох (зерно)	0,05	1,0 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,05	0,01 сан.-токс.	0,4	не потр.	не потр.	3	3
23	Боско, ВГ / Боскад, ВГ	боскалід, 500 г/кг	0,04	соняшник (насіння)	1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	45*	не потр.*	3*	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
				соняшник (олія)	2,0					-	-	-	
				соя (зерно)	3,0					45*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	2,0					-	-	-	
24	Вайбранс OSR FS, TH			Контроль за седаксаном та металаксил-М									2 (високостійкий у воді)
		седаксан, 100 г/л +	0,1	ріпак (насіння)	0,01	1,0	0,03	0,004 заг.-сан.	0,2	не потр.	не потр.	не потр.	
		флудиоксоніл,	0,015		0,2	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2				

		24 г/л +											
		металаксил-М, 96,9 г/л	0,03		0,02	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,05				
		седаксан, 100 г/л +	0,1	ріпак (олія)	не потр.	1,0	0,03	0,004 заг.-сан.	0,2				
		флудіоксоніл, 24 г/л +	0,015		не потр.	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2				
		металаксил-М, 96,9 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,05				
25	Вайрос Старт, ТН			Контроль за флудіоксонілом та металаксилом-М								3	
		флудіоксоніл, 25 г/л	0,015	соя (зерно)	0,4	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2	не потр.*	не потр.*		не потр. *
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		0,4	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,05				
		флудіоксоніл, 25 г/л	0,015	соя (олія)	не потр.	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2	-	-		-
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		не потр.	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,05				
		флудіоксоніл, 25 г/л	0,015	горох (зерно)	0,2	1,0	0,002	0,1 орг.	0,2	не потр.*	не потр.*		не потр. *
		металаксил-М, 10 г/л	0,03		0,2	0,5	0,01	0,001 заг.-сан.	0,05				
26	Вантакор, КС	хлорантрані- ліпрол, 600 г/л	0,02	соняшник (насіння)	0,05	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	30	не потр.	3	3 (високостій кий у воді та ґрунті)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2					30	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,05					30	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				томати	0,1					15	7	3	

				томатний сік	не потр.					-	-	-	
				картопля	0,01					20	7	3	
				яблука	0,1					20	7	3	
				яблучний сік	не потр.					-	-	-	
27	Вегесоль ePeC, CE-		Контроль за міддю										3 (алерген)
		сірка, 230 г/л +	не нормуєтьс я	яблука	не потр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	30	7	3	
		міді гідроксид, 115 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5	0,03 — максимальна разова; 0,005 — середньодобов а	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.				
		сірка, 230 г/л +	не нормується	яблучний сік	не потр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	-	-	-	
		міді гідроксид, 115 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5	0,03 — максимальна разова; 0,005 — середньодобов а	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.				
		сірка, 230 г/л +	не нормується	виноград	не потр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	30	7	3	
		міді гідроксид, 115 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5	0,03 — максимальна разова; 0,005 — середньодобов а	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.				
		сірка, 230 г/л +	не нормується	виноградний сік	не потр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	-	-	-	
		міді гідроксид, 115 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5	0,03 — максимальна разова; 0,005 — середньодобов а	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.				

		сірка, 230 г/л +	не нормується	пшениця	не потр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	30	7	3	
		міді гідроксид, 115 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5	0,03 — максимальна разова; 0,005 — середньодобов а	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.				
		сірка, 230 г/л +	не нормується	буряки цукрові	не потр.	6,0	0,07	не нормується	не нормується	20	7	3	
		міді гідроксид, 115 г/л	0,05 (по міді)		5,0	0,5	0,03 — максимальна разова; 0,005 — середньодобов а	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.				
28	Веранго Прайм 400 SC, KC	флуопірам, 400 г/л	0,01	картопля	0,03	1,0	0,003	0,02 сан.-токс., заг.- сан.	0,08	не потр. (внесення в борозни грунту при садінні)	не потр.	не потр. (внесе ння в боро зни грунту при садінні)	2 (високостій кий у воді та ґрунті)
цибуля (ріпка)	0,1	30	3 (після штангово ї обробки грунту) 7 (після крапельн ого поливу)	3									
томати	0,1	20	3 (після штангово ї обробки грунту) 7 (після	3									

											крапельного поливу)		
				томатний сік	0,05					-	-	-	
				суниця	0,1					14	3 (після штангової обробки ґрунту) 7 (після крапельного поливу)	3	
				суничний сік	0,05					-	-	-	
29	Вертимек Нео 018 SL, РК	абамектин, 18 г/л	0,0002	соняшник (насіння)	0,01	0,04	0,0002	0,0003 заг.-сан.	0,3	30	не потр.	3	2
				соняшник (олія)	0,01	0,5				-	-	-	
30	Ветеран, РК	ацетаміприд, 200 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,1	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	35	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.							-	
31	Віваро, КС			Контроль за карбендазимом та дифеноконазолом		Контроль за тіофанат-метилом		Контроль за карбендазимом, протіоконазолом (2) та дифеноконазолом	Контроль за карбендазимом, протіоконазолом-дестію (1) та дифеноконазолом				2 (високостійкий у воді)
		тіофанат-метил, 300 г/л +	0,08	соняшник (насіння)	0,1	0,1	0,01	0,05 орг.	0,4	35*	не потр.*	3*	
		протіоконазол, 100 г/л +	0,001 (1,2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				

		дифенокназол, 100 г/л	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		карбендазим (метаболіт тіофанат- мети́лу)	0,01		0,1	0,1	/0,001	0,1 орг.	0,1				
		тіофанат-метил, 300 г/л +	0,08	соняшник (олія)	не потр.	0,1	0,01	0,05 орг.	0,4	-	-	-	
		проти́окназол, 100 г/л +	0,001 (1,2)		не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		дифенокназол, 100 г/л	0,002		0,4	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		карбендазим (метаболіт тіофанат- мети́лу)	0,01		не потр.	0,1	/0,001	0,1 орг.	0,1				
32	Вірид SC 375, КС				Контроль за проти́окназолом-дестіо (1) та азоксистро́біном		Контроль за проти́окназолом (2) та азоксистро́біном		Контроль за проти́окон азолом (2) та азоксист ро́біном				3 (високостій кий у воді та ґрунті)
		проти́окназол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
		азоксистро́бін, 200 г/л	0,03		0,2	1,0	/0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		проти́окназол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		азоксистро́бін, 200 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		проти́окназол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
		азоксистро́бін, 200 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		проти́окназол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	

		еквіваленті 613 г/л		(олія)									
				льон олійний (насіння)	0,1					не потр.	не потр.	3	
				льон олійний (олія)	не потр.					-	-	-	
				льон- довгунець	не потр.					не потр.	не потр.	3	
35	Геліантекс Про, ВГ			Контроль за галауКСифен-метилом та трибенурон-метилом									3 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові оболонки очей, високостійк ий у воді)
		галауКСифен- метил, 62,5 г/кг +	0,02	соняшник (насіння)	0,05	1,0	0,006	0,04 сан.-токс.	0,3	не потр.	не потр.	3	
		трибенурон- метил, 500 г/кг	0,005		0,02	0,1	0,003	0,06 заг.-сан.	0,01				
		галауКСифен- метил, 62,5 г/кг +	0,02	соняшник (олія)	не потр.	1,0	0,006	0,04 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		трибенурон- метил, 500 г/кг	0,005		не потр.	0,1	0,003	0,06 заг.-сан.	0,01				
36	Дабл Трай, КЕ	метолахлор, 960 г/л	0,01	соя (зерно)	0,05	1,0	0,02	0,02 сан.-токс.	0,02	не потр.	не потр.	3	3 (високостій кий у воді)
				соя (олія)	не потр.					35	не потр.	4	
37	Дехканін, РК	гліфосату калійна сіль, 663 г/л	0,01	соя (зерно)	0,3	1,0	0,01	0,02 сан.-токс.	0,5 трансл.	14 (деси- кація)	не потр.	3	3 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові оболонки очей, високостійк ий у воді)
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
38	Джоуст, КЕ			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1)		Контроль за протіоконазолом (2)		Контроль за протіоконазолом-дестіо (1)					3 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові оболонки очей, високостійк ий у воді)
		протіоконазол, 250 г/л	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	35	не потр.	3	
39	Дивіденд 30 FS,	дифеноконазол,	0,002	ячмінь	0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	не потр.	не потр.	не	3

	ТН	30 г/л										потр.	(високостійкий у воді та ґрунті)
40	Диквалан, РК	дикват дибромід, 150 г/л	0,002	ріпак (насіння)	0,4	0,05/небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,003	0,02/ орг.	/0,2	7	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
41	Дібензон SC, KC	дифлубензурон, 220 г/л	0,02	кукурудза (зерно)	0,1	3	0,006	0,006 заг.-сан.	0,07	21	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				кукурудза (олія)	0,1					-	-	-	
42	Дікамбест, РК			Контроль за 2М-4Х (МСПА) та дикамбою									3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		2М-4Х (МСПА) у формі диметиламінної солі, 808 г/л, у кислотному еквіваленті 660 г/л +	0,008	пшениця, ячмінь	0,2	1,0	0,02	0,003 орг.	0,02	не потр.	не потр.	3	
		дикамба у формі диметиламінної солі, 108 г/л, у кислотному еквіваленті 90 г/л	0,004		0,04	1,0	0,01	0,02 сан.-токс.	0,25 трансл.				
		2М-4Х (МСПА) у формі диметиламінної солі, 808 г/л, у кислотному еквіваленті 660 г/л +	0,008	кукурудза (зерно)	0,1	1,0	0,02	0,003 орг.	0,02	не потр.	не потр.	3	

		дикамба у формі диметиламінної солі, 108 г/л, у кислотному еквіваленті 90 г/л	0,004		0,1	1,0	0,01	0,02 сан.-токс.	0,25 трансл.				
		2М-4Х (МСРА) у формі диметиламінної солі, 808 г/л, у кислотному еквіваленті 660 г/л +	0,008	кукурудза (олія)	не потр.	1,0	0,02	0,003 орг.	0,02	-	-	-	
		дикамба у формі диметиламінної солі, 108 г/л, у кислотному еквіваленті 90 г/л	0,004		не потр.	1,0	0,01	0,02 сан.-токс.	0,25 трансл.				
43	Дімефоль Турбо, СЕ	Контроль да диметенамідом-П та тербутилазином											3 (високостійкий у воді)
		диметенамід-П, 280 г/л +	0,02	соняшник (насіння)	0,02	0,7	0,01	0,1 орг.	0,1	не потр.*	не потр.*	3*	
		тербутилазин, 250 г/л	0,003		0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		диметенамід-П, 280 г/л +	0,02	соняшник (олія)	не потр.	0,7	0,01	0,1 орг.	0,1	-	-	-	
		тербутилазин, 250 г/л	0,003		не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		диметенамід-П, 280 г/л +	0,02	кукурудза (зерно)	0,02	0,7	0,01	0,1 орг.	0,1	не потр.*	не потр.*	3*	
		тербутилазин, 250 г/л	0,003		0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		диметенамід-П, 280 г/л	0,02	кукурудза (олія)	не потр.	0,7	0,01	0,1 орг.	0,1	-	-	-	

		+											
		тербутилазин, 250 г/л	0,003		не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
44	Дія-Аклоніфен, КС	аклоніфен, 600 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,05	1,0	0,005	0,01 заг.-сан.	0,08	не потр.*	не потр.*	3*	2 (високостій кий у воді та ґрунті)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
45	Дія-Боскалід Про, КС			Контроль за піраклостробіном та боскалідом									2 (високостій кий у воді та ґрунті)
		піраклостробін, 128 г/л +	0,03	пшениця, ячмінь	0,2	/1,0	/0,01	0,02 заг.-сан.	/0,6	35*	не потр.*	3*	
		боскалід, 252 г/л	0,04		0,1	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4				
46	Дія-Етопрокс, КС	етофенпрокс, 100 г/л	0,003	ріпак (насіння)	0,02	1,0	0,002	0,001 орг., заг.-сан.	0,2	30*	не потр.*	3*	3
				ріпак (олія)	0,02					-	-	-	
47	Дія-Протекс, КС			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та протіоконазолом (2)									3 (високостій кий у воді)
		протіоконазол, 480 г/л	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.								
48	Дуо Кватро Д ЕС, КЕ	2,4-Д 2-етил- гексильовий ефір, 875 г/л		Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2- етилгексильовим ефіром		Контроль за 2,4-Д					3
			0,0001	пшениця	0,02	0,5	0,0005	0,002 сан.-токс.	0,1 трансл.	не потр.*	не потр.*	3*	
				кукурудза (зерно)	0,015					не потр.*	не потр.*	3*	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
49	Еванс Про, СК	лямбда- цигалотрин, 50 г/л	0,003	пшениця	0,05	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05	35	не потр.	4	2
				ріпак (насіння)	0,1					35	не потр.	4	
				ріпак (олія)	0,2					-	-	-	
				соя (зерно)	0,02					35	не потр.	4	

				со́я (о́лія)	0,02					-	-	-		
				со́няшник (на́сіння)	0,2					35	не потр.	4		
				со́няшник (о́лія)	0,4					-	-	-		
				бу́ряки цукро́ві	0,01					21	не потр.	4		
50	Еквенто 100 FS, ТН	пліназолін (ізоциклосерам), 100 г/л	0,005	ячмінь, пшениця, жито	0,02	1,0	0,0015	0,0001 заг.-сан., орг.	0,05 водн.- мігр.	не потр.	не потр.	не потр.	3 (високостій кий у воді та ґрунті)	
51	Екселеріс, КС			Контроль за карбендазимом та епоксиконазолом									2 (високостій кий у воді та ґрунті)	
		карбендазим, 200 г/л +	0,01	пшениця	0,1*	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1	30*	не потр.*	3*		
		епоксиконазол, 200 г/л	0,004		0,05*	0,01	0,0005	0,004 заг.-сан.	0,4					
		карбендазим, 200 г/л +	0,01	ячмінь	0,5*	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1	30*	не потр.*	3*		
		епоксиконазол, 200 г/л	0,004		0,1*	0,01	0,0005	0,004 заг.-сан.	0,4					
52	Елантро, КС			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та піраклостробіном		Контроль за протіоконазолом (2) та піраклостробіном			Контроль за протіокон азолом- дестіо (1) та піраклос тробіном					3 (високостій кий у воді)
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1, 2)	со́няшник (на́сіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	35	не потр.	3		
		піраклостробін, 150 г/л +	0,03		0,2	1,0	/0,01	0,02 заг.-сан.	0,6					
		полісахаридний еліситор Immuno Bion™, 150 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.					
		протіоконазол,	0,001 (1, 2)	со́няшник	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-		

		150 г/л +		(олія)									
		піраклостробін, 150 г/л +	0,03		0,4	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		полісахаридний еліситор Immuno Bion™, 150 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1, 2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	35	не потр.	3	
		піраклостробін, 150 г/л +	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		полісахаридний еліситор Immuno Bion™, 150 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1, 2)	ріпак (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-	
		піраклостробін, 150 г/л +	0,03		0,3	/1,0	/0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		полісахаридний еліситор Immuno Bion™, 150 г/л	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		53	Еледжі, КЕ	хізалофоп- птефурил, 120 г/л	0,005	соняшник (насіння)	0,1	0,2	0,001	0,001 заг.-сан.	0,1	не потр.*	не потр.*
соняшник (олія)	0,2					-	-					-	
соя (зерно)	0,1					не потр.	не потр.					3	
соя (олія)	0,2					-	-					-	
54	ЕЛИСОР WG, ВГ			Контроль за тифенсульфурун-метилом та флорасуламом									2 (високостій кий у воді)
		тифенсульфурун -метил,	0,01	пшениця ячмінь жито	0,1*	0,1	0,01	0,01 сан.-токс.	0,05	не потр.*	не потр.*	3*	

		500 г/кг +											
		флорасулам, 170 г/л	0,05		0,01*	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
55	Елсвін, ME			Контроль за клопіралідом, флуороксипіром та піклорамом		Контроль за клопіралідом, флуороксипір-ментилом та піклорамом		Контроль за клопіралідом, флуороксипіром та піклорамом					3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		клопіралід, 320 г/л +	0,15	ріпак (насіння)	0,2	2,0	/0,01	0,04 сан.-токс.	0,1	не потр.*	не потр.*	3*	
		флуороксипір-ментил, 50 г/л +	0,2		0,05	1,0	0,003	0,01 заг.-сан.	0,2				
		піклорам, 80 г/л	0,02		0,05	5,0	0,02	0,04 сан.-токс.	0,05 трансл.				
		клопіралід, 320 г/л +	0,15	ріпак (олія)	не потр.	2,0	0,01	0,04 сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		флуороксипір-ментил, 50 г/л +	0,2		не потр.	1,0	0,003	0,01 заг.-сан.	0,2				
		піклорам, 80 г/л	0,02		не потр.	5,0	0,02	0,04 сан.-токс.	0,05 трансл.				
56	Еместо Сільвер 118 FS, TH			Контроль за пенфлуфеном, протіоконазолом-дестіо (1) та протіоконазолом (2)								2 (високостійкий у воді та ґрунті)	
		пенфлуфен, 100 г/л +	0,02	картопля	0,01	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,06 водн.-мігр.	не потр.	не потр.		не потр.
		протіоконазол, 18 г/л	0,001 (1, 2)		0,02 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
57	Енервін™ Duo, КС											2 (високостійкий у воді)	
		аметоктрадин, 120 г/л +	0,2	кавун	0,02	0,7	0,02	0,005 заг.-сан.	0,6	35	7		3
		пропамокарб гідрохлорид, 451 г/л, в кислотному еквіваленті —	0,02		0,05	0,7	0,007	0,08 сан.-токс.	0,1				

		378 г/л										
		аметоктрадин, 120 г/л +	0,2	томати	0,2	0,7	0,02	0,005 заг.-сан.	0,6	20	7	3
		пропамокарб гідрохлорид, 451 г/л, в кислотному еквіваленті — 378 г/л	0,02		0,05	0,7	0,007	0,08 сан.-токс.	0,1			
		аметоктрадин, 120 г/л +	0,2	томатний сік	0,1	0,7	0,02	0,005 заг.-сан.	0,6	-	-	-
		пропамокарб гідрохлорид, 451 г/л, в кислотному еквіваленті — 378 г/л	0,02		0,025	0,7	0,007	0,08 сан.-токс.	0,1			
		аметоктрадин, 120 г/л +	0,2	цибуля (ріпка)	0,2	0,7	0,02	0,005 заг.-сан.	0,6	20	7	3
		пропамокарб гідрохлорид, 451 г/л, в кислотному еквіваленті — 378 г/л	0,02		0,1	0,7	0,007	0,08 сан.-токс.	0,1			
		аметоктрадин, 120 г/л +	0,2	картопля	0,2	0,7	0,02	0,005 заг.-сан.	0,6	20	7	3
		пропамокарб гідрохлорид, 451 г/л, в кислотному еквіваленті — 378 г/л	0,02		0,05	0,7	0,007	0,08 сан.-токс.	0,1			

58	Інзак Зеон 280 ZC, ФК			Контроль за лямбда-цигалотрином та ацетаміпридом									2 (високостій кий у воді)
		лямбда- цигалотрин, 80 г/л +	0,003	яблука ²	0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05	30	10	4	

		ацетаміприд, 200 г/л	0,01		0,1	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1				
		лямбда- цигалотрин, 80 г/л +	0,003	яблучний сік	0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	/0,05	-	-	-	
		ацетаміприд, 200 г/л	0,01			0,01	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1			
		лямбда- цигалотрин, 80 г/л +	0,003	картопля ²	0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,01 сан.-токс.	0,05	20	10	4	
		ацетаміприд, 200 г/л	0,01			0,025	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.				0,1
59	Каптрил 480 SC, КС (Captryl 480 SC)	каптан, 480 г/л	0,1	персики	0,1	0,3	0,01	0,2 сан.-токс.	1,0	40	7	3	2
				периковий сік	0,1					-	-	-	
				виноград	0,03					40	7	3	
				виноградний сік	0,02					-	-	-	
				яблука	0,3					30	7	3	
				яблучний сік	0,05					-	-	-	
				черешні	0,1					30	7	3	
				черешневий сік	0,1					-	-	-	
60	Кікер, КС			Контроль за флутріафолом та карбендазимом									3 (високостій кий у воді та ґрунті)
		флутріафол, 117,5 г/л +	0,01	пшениця	0,1	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	35	не потр.	3	
		карбендазим, 250 г/л	0,01		0,1	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1				
		флутріафол, 117,5 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,2	0,1 небезпечний при	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	30	не потр.	3	

					потраплянні на шкіру						
	карбендазим, 250 г/л	0,01		0,1	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1			
	флутріафол, 117,5 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	-	-	-
	карбендазим, 250 г/л	0,01		не потр.	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1			
	флутріафол, 117,5 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,4	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	40	не потр.	3
	карбендазим, 250 г/л	0,01		0,1	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1			
	флутріафол, 117,5 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	-	-	-
	карбендазим, 250 г/л	0,01		не потр.	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1			
	флутріафол, 117,5 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	30	не потр.	3
	карбендазим, 250 г/л	0,01		0,15	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1			
	флутріафол, 117,5 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	-	-	-
	карбендазим, 250 г/л	0,01		не потр.	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1			

61	Кларк Стар, КС	азоксистробін, 500 г/л	0,03	ріпак (насіння)	0,2	1,0	/0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	35	не потр.	3	2 (високостій
----	----------------	---------------------------	------	--------------------	-----	-----	-------	----------------	-----	----	----------	---	------------------

				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	кий у воді)
				соняшник (насіння)	0,2					40	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				пшениця	0,5					35	не потр.	3	
				соя (зерно)	0,2					35	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				буряки цукрові	0,1					35	не потр.	3	
62	Клеріо, КЕ	клетодим, 360 г/л	0,01	<i>Контроль за сумою клетодиму, метаболітів клетодим-сульфону і клетодим-сульфоксиду в перерахунку на клетодим)</i>		0,07	0,005	0,01 заг.-сан.	0,1				3 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові оболонки очей)
				ріпак (насіння)	0,15					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,1					не потр.	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05					не потр.	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				буряки цукрові	0,1					не потр.	не потр.	3	
63	Колорит, КС	тіаклоприд, 480 г/л	0,006	ріпак (насіння)	0,05	0,3	0,002	0,005 заг.-сан.	0,09 водн.- мігр., фітотокс.	30*	не потр.*	3*	2 (високостій кий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				яблука	0,1					30*	не потр.*	3*	
				яблучний сік	0,06					-	-	-	

64	Корвизар М, КЕ			Контроль за фенпропідіном									3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		міклобутаніл, 100 г/л +	0,03	пшениця	0,02	0,7	0,003	0,05 заг.-сан.	0,35 трансл., водн.-мігр., фітотокс.	30*	не потр.*	3*	
		тебуконазол, 150 г/л +	0,03		0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
		фенпропідин, 375 г/л	0,005		0,1	1,0	0,03	0,03 заг.-сан.	0,4				
65	Ксевело, КЕ			Контроль за цигалофоп-бутилом як сумою цигалофоп-бутилу та цигалофоп-кислоти в перерахунку на цигалофоп-бутил		Контроль за цигалофоп-бутилом		Контроль за цигалофоп-бутилом як сумою цигалофоп-бутилу та цигалофоп-кислоти в перерахунку на цигалофоп-бутил					3
		флорпірауксифен-бензил, 12г/л +	0,02	рис (зерно)	0,01	1,5	0,006	0,001 заг.-сан.	0,14	не потр.	не потр.	3	
		цигалофоп-бутил, 160 г/л	0,003		0,02	1,5	0,001	0,006 сан.-токс.	0,4				
66	Ландін, ТН			Контроль за клотіанідіном та біфентрином								3 (високостійкий у воді та ґрунті)	
		клотіанідин, 525 г/л +	0,08	пшениця, ячмінь	0,02	1,5	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	не потр.	не потр.		не потр.
		біфентрин, 125 г/л	0,02		0,1	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1				
		клотіанідин, 525 г/л +	0,08	соняшник (насіння)	0,05	1,5	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	не потр.	не потр.		не потр.
		біфентрин, 125 г/л	0,02		0,2	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1				
		клотіанідин, 525 г/л +	0,08	соняшник (олія)	не потр.	1,5	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	-	-		-
		біфентрин, 125 г/л	0,02		не потр.	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1				
		клотіанідин, 525 г/л +	0,08	кукурудза (зерно)	0,05	1,5	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	не потр.	не потр.		не потр.

		біфентрин, 125 г/л	0,02		0,2	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1				
		клотіанідин, 525 г/л +	0,08	кукурудза (олія)	не потр.	1,5	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	-	-	-	
		біфентрин, 125 г/л	0,02		не потр.	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1				
67	Ларс Дельта, КС (Lars Delta, SC)			Контроль за дифлюфеніканом та флорасуламом									3 (високостій кий у воді та ґрунті)
		дифлюфенікан, 500 г/л +	0,05	пшениця	0,02*	0,5	0,001	0,15 сан.-токс.	0,15	не потр.*	не потр.*	3*	
		флорасулам, 50 г/л	0,05		0,01	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
68	Лексикон, КС			Контроль за ацетаміпридом та хлорантраніліпролом								2 (високостій кий у воді та ґрунті)	
		ацетаміприд, 200 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,1	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	30	не потр.		3
		хлорантранілі- прол, 100 г/л	0,02		0,05	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1				
		ацетаміприд, 200 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	-	-		-
		хлорантранілі- прол, 100 г/л	0,02		не потр.	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1				
69	Лентагран 45, ЗП	піридат, 45 г/л	0,002	часник ²	0,05	1	0,01	0,002 заг.-сан.	0,03	не потр.	7	3	3 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові оболонки очей, алерген)
70	Лівендор, МЕ			Контроль за 2М-4Х (МСПА)									3 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові оболонки очей)
		2М-4Х (МСПА) у формі диметиламіної солі, 519,6 г/л, у кислотному еквіваленті	0,008	пшениця	0,2	1,0	0,02	0,003 орг.	0,02	не потр.*	не потр.*	3*	

		400 г/л +										
		флорасулам, 50 г/л	0,05			0,01	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.		
		2М-4Х (МСРА) у формі диметиламінної солі, 519,6 г/л, у кислотному еквіваленті 400 г/л +	0,008	кукурудза (зерно)	0,1	1,0	0,02	0,003 орг.	0,02	не потр.*	не потр.*	3*
		флорасулам, 50 г/л	0,05			0,1	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.			
		2М-4Х (МСРА) у формі диметиламінної солі, 519,6 г/л, у кислотному еквіваленті 400 г/л +	0,008	кукурудза (олія)	не потр.	1,0	0,02	0,003 орг.	0,02	-	-	-
		флорасулам, 50 г/л	0,05			не потр.	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.			

71	Логус, КС		Контроль за альфа-циперметрином та емаектин бензоатом									3 (високостій кий у воді)	
		альфа- циперметрин, 100 г/л +	0,005	кукурудза (зерно)	0,05	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,002 заг.-сан.	0,03	30	не потр.		4
		емаектин бензоат, 100 г/л	0,001			0,01	0,1	0,0004	0,002 сан.-токс.				
		альфа- циперметрин, 100 г/л +	0,005	кукурудза (олія)	0,1	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,002 заг.-сан.	0,03	-	-		-
		емаектин бензоат, 100 г/л	0,001			не потр.	0,1	0,0004	0,002 сан.-токс.				

3
(високостій
кий у воді)

		альфа-циперметрин, 100 г/л +	0,005	яблука	0,02	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,002 заг.-сан.	0,03	30	10	4	
		емаектин бензоат, 100 г/л	0,001		0,01	0,1	0,0004	0,002 сан.-токс.	0,3				
		альфа-циперметрин, 100 г/л +	0,005	яблучний сік	0,03	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,002 заг.-сан.	0,03	-	-	-	
		емаектин бензоат, 100 г/л	0,001		не потр.	0,1	0,0004	0,002 сан.-токс.	0,3				
72	Лос Делметрос 280, КС			Контроль за ацетаміпридом та дельтаметрином									2
		ацетаміприд, 250 г/л +	0,01	пшениця	0,1	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	30*	не потр.*	3*	(високістю кий у воді та ґрунті)
		дельтаметрин, 30 г/л	0,003		0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,006 сан.-токс.	0,01 трансл.				
		ацетаміприд, 250 г/л +	0,01	яблука	0,05	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	45*	7*	3*	
		дельтаметрин, 30 г/л	0,003		0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,006 сан.-токс.	0,01 трансл.				
		ацетаміприд, 250 г/л +	0,01	яблучний сік	0,01	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		дельтаметрин, 30 г/л	0,003		0,01	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,006 сан.-токс.	0,01 трансл.				
		ацетаміприд, 250 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,1	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	50*	не потр.*	3*	

		дельтаметрин, 30 г/л	0,003		0,03	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,006 сан.-токс.	0,01 трансл.				
		ацетаміприд, 250 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		дельтаметрин, 30 г/л	0,003		0,05	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,006 сан.-токс.	0,01 трансл.				
		ацетаміприд, 250 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,05	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	50*	не потр.*	3*	
		дельтаметрин, 30 г/л	0,003		0,05	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,006 сан.-токс.	0,01 трансл.				
		ацетаміприд, 250 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		дельтаметрин, 30 г/л	0,003		0,10	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,006 сан.-токс.	0,01 трансл.				
73	Луміант (Lumiantе), ТН	етабоксам, 385 г/л	0,01	кукурудза (зерно)	0,02	1,5	0,001	0,01 сан.-токс.	0,3	не потр.	не потр.	не потр.	2
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,02					не потр.	не потр.	не потр.	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,02					не потр.	не потр.	не потр.	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	

74	Лумівія, ТН	хлорантранілі- прол, 625 г/л	0,02	буряки цукрові	0,01	1,5	0,015	0,001 заг.-сан.	0,1	не потр.	не потр.	не потр.	3 (високостій кий у воді та ґрунті)
75	Лумішур, ТН (Lumisure, FS)	клотіанідин, 600 г/л	0,08	соя (зерно)	0,02	1,5	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.	не потр.	не потр.	не потр.	2 (високостій кий у воді та ґрунті)
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,05					не потр.	не потр.	не потр.	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
76	Манвіт, ЗП	манкоцеб, 750 г/кг	0,005	яблука	0,04	0,5	/0,01	0,01 заг.-сан., орг.	0,1	30	7	3	3
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003		0,02	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується				
		манкоцеб, 750 г/кг	0,005	яблучний сік	0,01	0,5	/0,01	0,01 заг.-сан., орг.	0,1	-	-	-	
		ЕТС (метаболіт манкоцебу)	0,0003		0,02	не потр.	не потр.	не нормується	не нормується				
77	Мангелло 350 ЕС, КЕ			Контроль за дифеноконазолом та тебуконазолом									2 (високостій кий у воді та ґрунті)
		дифеноконазол, 100 г/л +	0,002	ріпак (насіння)	0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	50	не потр.	3	
		тебуконазол, 250 г/л	0,03		0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
		дифеноконазол, 100 г/л +	0,002	ріпак (олія)	0,2	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		тебуконазол, 250 г/л	0,03		0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
78	Марсель, КС			Контроль за ізоксафлютолом (як суми ізоксафлютолу і його метаболіта RPA 202248 в перерахунку на ізоксафлютол)									2
		ізоксафлютол, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,02	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	не потр.*	не потр.*	3*	
				кукурудза	не потр.					-	-	-	

				(олія)									
79	Медян Екстра 350 SC, КС	хлорокис міді, 350 г/л	0,05 (по міді)	томати ²	5,0	0,5	0,003 — максимальна разова; 0,001 — середньо-добова	1,0 орг.	3,0 заг.-сан.	20	7	3	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				томатний сік	5,0					-	-	-	
80	Мезофорт, КС	мезотріон, 480 г/л	0,001	кукурудза (зерно)	0,1	/0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4	не потр.	не потр.	3	3 (високостійкий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
81	Мелізол Гроу, РК	етефон, 660 г/л	0,006	Ячмінь	0,5	1,0	0,02	0,01 заг.-сан., сан.-токс.	0,5	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				соняшник (насіння)	0,1					не потр.	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
82	Методус 650, ВГ			Контроль за ізоксафлютолом (як сумою ізоксафлютолу і його метаболіта RPA 202248 в перерахунку на ізоксафлютол), мезотріоном та тербутилазином		Контроль за ізоксафлютолом, мезотріоном та тербутилазином		Контроль за ізоксафлютолом (як сумою ізоксафлютолу і його метаболіта RPA 202248 в перерахунку на ізоксафлютол), мезотріоном та тербутилазином					2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді та ґрунті)
		ізоксафлютол, 100 г/кг +	0,001	кукурудза (зерно)	0,02	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	не потр.*	не потр.*	3*	
		мезотріон, 150 г/кг +	0,001		0,1	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4				
		тербутилазин, 400 г/кг	0,003		0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
				ізоксафлютол, 100 г/кг	0,001	кукурудза (олія)	не потр.	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	-	

		+											
		мезотріон, 150 г/кг +	0,001		не потр.	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4				
		тербутилазин, 400 г/кг	0,003		не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
83	Мігіва, КС	іпфлуфеноквін, 200 г/л	0,02	яблука ²	0,1	0,1	0,006	0,002 заг.-сан.	0,1	14	7	3	2 (високостій кий у воді та ґрунті)
				яблучний сік	0,01					-	-	-	
84	Мілафорт Про, МД	нікосульфурон, 100 г/л	2,0	кукурудза (зерно)	0,01	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2	не потр.	не потр.	3	3 (високостій кий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
85	Міравіс Макс 325 SC, КС			Контроль за підіфлуметофеном, азоксистробіном та дифеноконазолом									2 (високостій кий у воді та ґрунті)
		підіфлуметофен, 75 г/л +	0,03	соняшник ¹ (насіння)	0,01	1,0	0,01	0,002 заг.-сан.	0,06 водн.- мігр.	30	не потр.	3	
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		підіфлуметофен, 75 г/л +	0,03	соняшник (олія)	0,05	1,0	0,01	0,002 заг.-сан.	0,06 водн.- мігр.	-	-	-	
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,4	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		підіфлуметофен, 75 г/л +	0,03	ріпак ¹ (насіння)	0,01	1,0	0,01	0,002 заг.-сан.	0,06 водн.- мігр.	30	не потр.	3	
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л	0,002		0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				

		підіфлуметофен, 75 г/л +	0,03	ріпак (олія)	0,05	1,0	0,01	0,002 заг.-сан.	0,06 водн.- мігр.	-	-	-	
		азоксистробін, 125 г/л +	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифенокназол, 125 г/л	0,002		0,2	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
86	Метагрін ЕС, КЕ			Контроль за 2М-4Х (МСПА) (1)		Контроль за 2М-4Х (МСПА) ІОЕ (2)	Контроль за 2М-4Х (МСПА) (1)						3
		2-метил- 4-хлорфенокси- оцтової кислоти (2М-4Х (МСПА)) ізооктиловий ефір (ІОЕ), 850 г/л	0,008 (1)	кукурудза (зерно)	0,1 (1)	1,0 (2)	0,02 (1)	0,003 орг. (1)	0,02 (1)	не потр.*	не потр.*	3*	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
87	Моспілан, ВП	ацетаміприд, 200 г/кг	0,01	ріпак (насіння)	0,05	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1	30	не потр.	3	3 (високостій кий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1					35	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
88	Напалм, РК	гліфосату ізопропіламінна сіль, 480 г/л	0,01	поля, відведені під посіви сільськогосп одарських культур (пшениця озима, кукурудза. соняшник, ріпак, соя)	не потр.*	1,0	0,01	0,02 сан.-токс.	0,5 трансл.	не потр.	не потр.	3	3 (високостій кий у воді)
				соя (зерно)	0,3					14 (деси- кація)	не потр.	3	

				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
89	НАСЕТО SC, КС			Контроль за флуфенацетом та дифлюфеніканом									2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		флуфенацет, 300 г/л +	0,004	пшениця, ячмінь, жито, тритікале	0,1*	0,7	0,001	0,002 заг.-сан., сан.-токс.	/0,2	не потр.*	не потр.*	3*	
		дифлюфенікан, 300 г/л	0,05		0,02*	0,5	0,001	0,15 сан.-токс.	0,15				
90	Ньютон, КС			Контроль за боскалідом, дифенокназолом та піраклостробіном									3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		боскалід, 150 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	35*	не потр.*	3*	
		дифенокназол, 150 г/л +	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		піраклостробін, 100 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		боскалід, 150 г/л +	0,04	соняшник (олія)	2,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	-	-	-	
		дифенокназол, 150 г/л +	0,002		0,4	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		піраклостробін, 100 г/л	0,03		0,2*	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		боскалід, 150 г/л +	0,04	соя (зерно)	3,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	50*	не потр.*	3*	
		дифенокназол, 150 г/л +	0,002		0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				
		піраклостробін, 100 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
		боскалід, 150 г/л +	0,04	соя (олія)	не потр.	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	-	-	-	
		дифенокназол, 150 г/л +	0,002		0,4	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3				

		піраклостробін, 100 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6				
91	Одін, РК	2-метил-4-хлорфенокси-оцтова кислота (2М-4Х (МСРА)), 500 г/л	0,008	кукурудза (зерно)	0,1	1,0	0,02	0,003 орг.	0,02	не потр.*	не потр.*	3*	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				пшениця, ячмінь	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
92	Оптиміст, СЕ			Контроль за пропізохлором та тербутилазином									3 (високотійкий у воді)
		пропізохлор, 500 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,2	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 238 г/л	0,003		0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		пропізохлор, 500 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6	-	-	-	
		тербутилазин, 238 г/л	0,003		не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		пропізохлор, 500 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,2	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 238 г/л	0,003		0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		пропізохлор, 500 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6	-	-	-	
		тербутилазин, 238 г/л	0,003		не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		пропізохлор, 500 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 238 г/л	0,003		0,2	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				
		пропізохлор, 500 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.	1,0	0,01	0,002 орг.	0,6	-	-	-	
		тербутилазин, 238 г/л	0,003		не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04				

93	Палдіс, ВГ	темботріон, 200 г/кг	0,0001	кукурудза (зерно)	0,02	0,1	0,00005	0,0002 сан.-токс.	0,4	не потр.*	не потр.*	3*	3 (високостій кий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
94	Перемога, КС			Контроль за дифеноконазолом та азоксистробіном									3 (високостій кий у воді)
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	соняшник (насіння)	0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	35	не потр.	3	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	соняшник (олія)	0,4	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	ріпак (насіння)	0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	35	не потр.	3	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	ріпак (олія)	0,2	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	соя (зерно)	0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	35	не потр.	3	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		дифеноконазол, 125 г/л +	0,002	соя (олія)	0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	-	-	-	
		азоксистробін, 125 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
95	Перун, КС	прометрин, 500 г/л	0,005	соя (зерно)	0,1	5,0	0,02	0,002 сан.-токс.	0,5 трансл.	не потр.	не потр.	3	3 (високостій кий у воді)
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	

96	Пінтрей, КЕ (Pintray, ЕС)			Контроль за тебуконазолом та протіоконазолом-дестіо (1)		Контроль за тебуконазолом та протіоконазолом (2)			Контроль за тебуконазолом та протіоконазолом-дестіо (1)					3 (високостійкий у воді)
		тебуконазол, 160 г/л +	0,03	пшениця	0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	30	не потр.	3		
		протіоконазол, 80 г/л	0,001 (1, 2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)					
		тебуконазол, 160 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	30	не потр.	3		
		протіоконазол, 80 г/л	0,001 (1, 2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)					
		тебуконазол, 160 г/л +	0,03	ріпак (олія)	0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	-	-	-		
		протіоконазол, 80 г/л	0,001 (1, 2)		не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)					
97	Пленум 50 WG, ВГ	піметрозин, 500 г/кг	0,00	ріпак (насіння)	0,02	1,0	0,002	0,0002 заг.-сан.	0,1	не потр.	не потр.	3	2 (високостійкий у воді)	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-		
98	Примус, СЕ			Контроль за 2,4-Д		Контроль за 2,4-Д 2-етилгексильовим ефіром		Контроль за 2,4-Д					3	
		2,4-Д 2-етилгексильовий ефір, 452,42 г/л +	0,0001	сорго	0,02	0,5	0,0005	0,002 сан.-токс.	0,1 трансл.	не потр.	не потр.	3		
		флорасулам, 6,3 г/л	0,05		0,1	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.					
99	Пріланко КС, SC			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та боскалідом		Контроль за протіоконазолом (2) та боскалідом			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та боскалідом					2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		протіоконазол, 156 г/л	0,001 (1, 2)	пшениця, ячмінь, жито	0,1 (1)*	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*		

		+										
		боскалід, 156 г/л	0,04			0,1*	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.			
		протіоконазол, 156 г/л +	0,001 (1, 2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	50*	не потр.*	3*
		боскалід, 156 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4			
		протіоконазол, 156 г/л +	0,001 (1, 2)	соняшник (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-
		боскалід, 156 г/л	0,04		2,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4			
		протіоконазол, 156 г/л +	0,001 (1, 2)	соя (зерно)	0,05 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	50*	не потр.*	3*
		боскалід, 156 г/л	0,04		3,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4			
		протіоконазол, 156 г/л +	0,001 (1, 2)	соняшник (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-
		боскалід, 156 г/л	0,04		не потр.	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4			

100	Протікон 250, КЕ			Контроль за протіоконазолом- дестіо (1)		Контроль за протіоконазолом (2)			Контроль за протіокон- азолом- дестіо (1)				2 (високостій- кий у воді)
		протіоконазол, 250 г/л	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
				ріпак (насіння)	0,1 (1)					30*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,05 (1)					30*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1 (1)					50*	не потр.*	3*	

				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
101	Протіо 250, КЕ			Контроль за протіоконазолом- дестіо (1)		Контроль за протіоконазолом (2)			Контроль за протіо коназолом- дестіо (1)				2 (високостій кий у воді)
		протіоконазол, 250 г/л	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.-сан.	/0,2 (1)	30*	не потр.*	3*	
				ріпак (насіння)	0,1 (1)					30*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,05 (1)					30*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1 (1)					50*	не потр.*	3*	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				буряки цукрові	0,3 (1)					30*	7*	3*	
102	Протрікс Ультра, ТН			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та металаксилом-М		Контроль за протіоконазолом та металаксилом-М			Контроль за протіокон азолом- дестіо (1) та мета- лаксилом-М				3 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові оболонки очей, високостійк ий у воді)
		протіоконазол, 200 г/л +	0,001 (1,2)	соя (зерно)	0,05 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	не потр.	не потр.	не потр.	
					металаксил-М, 40 г/л	0,03	0,4	0,5	0,01				
		протіоконазол, 200 г/л +	0,001 (1,2)	соя (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
					металаксил-М, 40 г/л	0,03	не потр.	0,5	0,01				
103	Пульсар® Дуо, КС			Контроль за імазамоксом та прогексадіоном кальцію									2 (високостій
		імазамокс,	3,0	соняшник	1,0	1,0	0,04	0,06 заг.-сан.	0,4	не потр.	не потр.	3	

		26,7 г/л +		(насіння)									кий у воді)
		прогексадіон кальцію, 16,7 г/л	0,02		0,01	1,0	0,01	0,03 заг.-сан.	0,2				
		імазамокс, 26,7 г/л +	3,0	соняшник (олія)	не потр.	1,0	0,04	0,06 заг.-сан.	0,4	-	-	-	
		прогексадіон кальцію, 16,7 г/л	0,02		не потр.	1,0	0,01	0,03 заг.-сан.	0,2				
104	Равак, ГР	метальдегід, 6 %	0,006	капуста	0,4*	0,2	0,003	0,01	0,5	28*	не потр.*	2*	3
				соняшник (насіння)	не потр.					не потр.*	не потр.*	2*	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	не потр.					не потр.*	не потр.*	2*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
106	Радикал, ВГ	боскалід, 500 г/кг	0,04	соняшник (насіння)	1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	30	не потр.	3	3 (високостій кий у воді та ґрунті)
				соняшник (олія)	2,0					-	-	-	
				ріпак (насіння)	1,0					30	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	3,0					30	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				виноград	0,3					50	не потр.	3	
				виноградний сік	0,15					-	-	-	
106	Радикал Нео, КС			Контроль за боскалідом та азоксистробіном									3 (високостій кий у воді та ґрунті)
		боскалід, 150 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	50	не потр.	3	

		азоксистробін, 250 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		боскалід, 150 г/л +	0,04	соняшник (олія)	2,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	-	-	-	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		боскалід, 150 г/л +	0,04	ріпак (насіння)	1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	30	не потр.	3	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		боскалід, 150 г/л +	0,04	ріпак (олія)	не потр.	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	-	-	-	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		боскалід, 150 г/л +	0,04	соя (зерно)	3,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	35	не потр.	3	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		боскалід, 150 г/л +	0,04	соя (олія)	не потр.	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	-	-	-	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		боскалід, 150 г/л +	0,04	буряки цукрові	0,1	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4	30	не потр.	3	
		азоксистробін, 250 г/л	0,03		0,1	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
107	Ревіона, КС	мефентрифлу- коназол, 75 г/л	0,035	лохина	0,02	/0,5	/0,01	0,001/ заг.-сан.	/0,08	20	7	3	3 (високостій кий у воді та ґрунті)
				сік лохини	0,0					-	-	-	
108	Регістан Про, РК	дикватон, 250 г/л у формі дикват дихлориду	0,002	ріпак (насіння)	0,4	0,05 небезпечний при потраплянні	0,003	0,02 орг.	0,2	9**	не потр.**	3**	2 (небезпечн ий при потраплянн

						на шкіру							і на слизові оболонки очей)
				ріпак (олія)	0,5					-	-	-	
109	Редокс, КС	тербутилазин, 500 г/л	0,003	соняшник (насіння)	0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04	не потр.	не потр.	3	3 (високостійкий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,4					не потр.	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,2					не потр.	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
110	Саксессор, КЕ	петоксамід, 600 г/л	0,005	ріпак (насіння)	0,01	0,5	0,0015	0,01 заг.-сан., сан.-токс.	0,1	не потр.	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, алерген)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,01					не потр.	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,01					не потр.	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
111	Санджіма Екстра (Sungima Xtra. WG), ВГ			Контроль за флуміоксазином та імазетапіром									2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		флуміоксазин, 250 г/кг +	0,002	соя (зерно)	0,05	1,0	0,001	0,004 сан.-токс.	/0,4	не потр.	не потр.	3	
		імазетапір, 530 г/кг	1,0		0,5	0,5	0,04	0,006 заг.-сан.	0,03 водн.-мігр.				
		флуміоксазин, 250 г/кг +	0,002	соя (олія)	не потр.	1,0	0,001	0,004 сан.-токс.	/0,4	-	-	-	

		імазетапір, 530 г/кг	1,0		не потр.	0,5	0,04	0,006 заг.-сан.	0,03 водн.-мігр.				
112	Сахара Супер, КЕ	ацетохлор, 800 г/л +	0,001	соя (зерно)	0,01	1,0	0,0001	0,002 сан.-токс.	0,5 водн.-мігр.	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні і на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		АД-67, 80 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		ацетохлор, 800 г/л +	0,001	соя (олія)	0,01	1,0	0,0001	0,002 сан.-токс.	0,5 водн.-мігр.	-	-	-	
		АД-67, 80 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		ацетохлор, 800 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,03	1,0	0,0001	0,002 сан.-токс.	0,5 водн.-мігр.	не потр.	не потр.	3	
		АД-67, 80 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		ацетохлор, 800 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	0,02	1,0	0,0001	0,002 сан.-токс.	0,5 водн.-мігр.	-	-	-	
		АД-67, 80 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		ацетохлор, 800 г/л +	0,001	соняшник (насіння)	0,01	1,0	0,0001	0,002 сан.-токс.	0,5 водн.-мігр.	не потр.	не потр.	3	
		АД-67, 80 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
		ацетохлор, 800 г/л +	0,001	соняшник (олія)	0,01	1,0		0,002 сан.-токс.	0,5 водн.-мігр.	-	-	-	
		АД-67, 80 г/л (антидот)	не потр.		не потр.		не потр.	не потр.	не потр.				
113	Сенат-Альфа-циперметрин, КЕ	альфа-циперметрин, 100 г/л	0,005	пшениця	0,01	0,1 небезпечний при	0,003	0,002 заг.-сан.	0,03	35*	не потр.*	4*	2 (високостійкий у воді)
				ріпак (насіння)	0,4					35*	не потр.*	4*	

				ріпак (олія)	1,0	потраплянні на шкіру				-	-	-	
				соя (зерно)	0,05					35*	не потр.*	4*	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
114	Сенат- Флутриафол- Карбендазим, КС			Контроль за флутріафолом та карбендазимом									2 (високостій кий у воді та ґрунті)
		флутріафол, 117,5 г/л +	0,01	пшениця	0,2	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	35	не потр.	3	
		карбендазим, 250 г/л	0,01		0,1*	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1				
		флутріафол, 117,5 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,4	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	40	не потр.	3	
		карбендазим, 250 г/л	0,01		0,1	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1				
		флутріафол, 117,5 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	-	-	-	
		карбендазим, 250 г/л	0,01		не потр.	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1				
115	Серапен Плюс, KE (Serapen Plus, EC)			Контроль за сумою піноксадену та метаболіту піноксадену М4 в перерахунку на піноксаден			Контроль за піноксаденом та флорасуламом						
		піноксаден, 45 г/л +	0,005	пшениця, ячмінЬ	0,2	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3	не потр.	не потр.	3	
		флорасулам, 5 г/л +	0,05		0,01	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
		клоквінтосет- мексил, 11,25 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				

116	Сигма, КС			Контроль за азоксистробіном та ципроконазолом								3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (насіння)	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	50	не потр.	3
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	0,1	0,01	0,03 сан.-токс.	0,01			
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соняшник (олія)	не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	-	-	-
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	0,1	0,01	0,03 сан.-токс.	0,01			
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	30	не потр.	3
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	0,1	0,01	0,03 сан.-токс.	0,01			
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	ріпак (олія)	не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	-	-	-
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	0,1	0,01	0,03 сан.-токс.	0,01			
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	пшениця, ячмінь	0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	35	не потр.	3
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,1	0,1	0,01	0,03 сан.-токс.	0,01			
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соя (зерно)	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	35	не потр.	3
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	0,1	0,01	0,03 сан.-токс.	0,01			
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	соя (олія)	0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	-	-	-
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	0,1	0,01	0,03 сан.-токс.	0,01			
		азоксистробін, 200 г/л +	0,03	буряки цукрові	0,1	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3	30	не потр.	3
		ципроконазол,	0,002		0,1	0,1	0,01	0,03 сан.-токс.	0,01			

		80 г/л											
117	Скорпіон Максі, РК	дикват дибромід, 480 г/л, в перерахунку на дикват іон — 257 г/л	0,002	соняшник ¹ (насіння)	0,5	0,05 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,003	0,02 орг.	0,2	10	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	0,1					-	-	-	
118	Сламмер, КС (Slammer, SC)			Контроль за біфентрином та сумою флонікамідів та метаболітів TFNA та TFNG у перерахунку на флонікамід		Контроль за біфентрином та флонікамідом							2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		біфентрин, 100 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,2	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	49	не потр.	4	
		флонікамід, 100 г/л	0,004		0,06	1,0	0,002	0,008 сан.-токс,	0,4				
		біфентрин, 100 г/л +	0,02	ріпак (олія)	0,3	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		флонікамід, 100 г/л	0,004		не потр.	1,0	0,002	0,008 сан.-токс,	0,4				
		біфентрин, 100 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,1	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	42	не потр.	4	
		флонікамід, 100 г/л	0,004		0,06	1,0	0,002	0,008 сан.-токс,	0,4				
		біфентрин, 100 г/л +	0,02	соя (олія)	не потр.	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		флонікамід, 100 г/л	0,004		не потр.	1,0	0,002	0,008 сан.-токс,	0,4				
		біфентрин, 100 г/л +	0,02	яблука	0,2	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	35	7	3	
		флонікамід, 100 г/л	0,004		0,3	1,0	0,002	0,008 сан.-токс,	0,4				

		біфентрин, 100 г/л +	0,02	соя (олія)	не потр.	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1	-	-	-	
		флонікамід, 100 г/л	0,004		0,03	1,0	0,002	0,008 сан.-токс,	0,4				
119	Слизне Стоп, ГР	метальдегід, 6 %	0,006	капуста ²	0,4*	0,2	0,003	0,01	0,5	28*	5*	не потр. *	3
120	СлимАктив, ГР	метальдегід, 6 %	0,006	капуста ²	0,4*	0,2	0,003	0,01	0,5	28*	5*	не потр. *	3
				газони ²	не потр.					не потр.*	5*	не потр. *	
121	СПАРАТО, КС			<i>Контроль за сумою спіротетрамату і спіротетрамат- енолу, вираженою як спіротетрамат</i>									3
		спіротетрамат, 100 г/л	0,01	яблука	0,3	1,0	0,003	0,005 заг.-сан.	0,25	21*	7*	3*	
				яблучний сік	0,1					-	-	-	
				томати	1,0					21*	7*	3*	
				томатний сік	0,1					-	-	-	
122	Спірел, КС (Spirel, SC)			<i>Контроль за протіоконазолом- дестію (I) та трифлуксистробіном</i>		<i>Контроль за протіоконазолом та трифлуксистробіном</i>		<i>Контроль за протіокон азолом- дестію (I) та трифлок систробіном</i>				2 (високостій кий у воді)	
		протіоконазол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	40	не потр.		3
		трифлуксистро- бін, 150 г/л	0,02		0,05	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1				
		протіоконазол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-		-
		трифлуксистро- бін, 150 г/л	0,02		0,1	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1				

		протіоконазол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (насіння)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	40	не потр.	3
		трифлуксистеро- бін, 150 г/л	0,02		0,05	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1			
		протіоконазол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	ріпак (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-
		трифлуксистеро- бін, 150 г/л	0,02		0,1	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1			
		протіоконазол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	соя (зерно)	0,05 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	40	не потр.	3
		трифлуксистеро- бін, 150 г/л	0,02		0,05	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1			
		протіоконазол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	соя (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-
		трифлуксистеро- бін, 150 г/л	0,02		0,1	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1			
		протіоконазол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	кукурудза (зерно)	0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	40	не потр.	3
		трифлуксистеро- бін, 150 г/л	0,02		0,05	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1			
		протіоконазол, 175 г/л +	0,001 (1,2)	кукурудза (олія)	не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)	-	-	-
		трифлуксистеро- бін, 150 г/л	0,02		не потр.	0,8	0,01	0,03 заг.-сан.	0,1			

123	Ставарро, СЕ			Контроль за пропіконазолом та азоксистробіном								3 (високостій- кий у воді та ґрунті)	
		пропіконазол, 233 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	0,1	0,5 (с/г роботи), 1,5 (умови виробництва)	0,001	0,15 орг.	0,2	30*	не потр.*		3*
		азоксистробін, 167 г/л	0,03		0,2	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		пропіконазол, 233 г/л	0,04	соняшник (олія)	не потр.	0,5 (с/г роботи),	0,001	0,15 орг.	0,2	-	-		-

		+				1,5 (умови виробництва)							
		азоксистробін, 167 г/л	0,03		не потр.	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
		пропіконазол, 233 г/л +	0,04	пшениця	0,1	0,5 (с/г роботи), 1,5 (умови виробництва)	0,001	0,15 орг.	0,2	30*	не потр.*	3*	
		азоксистробін, 167 г/л	0,03		0,5	1,0	0,01	0,01 заг.-сан.	0,3				
124	Стайєр 500 KE		Контроль за пропіконазолом та тебуконазолом										3 (високостій кий у воді та ґрунті)
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	0,1	0,5 (с/г роботи), 1,5 (умови виробництва)	0,001	0,15 орг.	0,2	50	не потр.	3	
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,07	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
		пропіконазол, 300 г/л +	0,04	соняшник (олія)	0,04	0,5 (с/г роботи), 1,5 (умови виробництва)	0,001	0,15 орг.	0,2	-	-	-	
		тебуконазол, 200 г/л	0,03		0,04	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
125	Стелавіт, РК (Stelavit, SL)	топрамезон, 50 г/л	0,0005	кукурудза (зерно)	0,2	0,5	0,002	0,002 сан.-токс.	0,3	не потр.	не потр.	3	2 (високостій кий у воді)
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
126	Страж, ВГ	ципродиніл, 500 г/кг	0,03	персики	0,05	1	0,05	0,02 заг.-сан.	0,2	30	7	3	3
				периковий сік	0,1					-	-	-	
				яблука ²	0,05					30	7	3	
				яблучний сік	0,05					-	-	-	
127	Суховій Пауєр SL, РК			Контроль за глүфосинат амонієм як сумою глүфосинату амонію,		Контроль за глүфосинат амонієм			Контроль за глүфосин ат амонієм				2

				глюфосинат-кислоти, 3-гiдрокси(метил) фосфiнол/пропiонової кислоти та N-ацетил-глюфосинату в перерахунку на глюфосинат амонiю)					як сумою глюфосинат у амонiю та глюфосинат-кислоти в перерахунк у на глюфосинат амонiю				
		глюфосинат амонiю, 200 г/л	0,02	кукурудза ¹ (зерно)	0,1	0,02	0,002	0,02 заг.-сан.	0,1	не потр.* (гербицид) 10* (десикант)	не потр.*	3*	
				кукурудза ¹ (зерно)	0,1					не потр.* (гербицид) 10* (десикант)	не потр.*	3*	
				кукурудза (олiя)	не потр.					-	-	-	
				соняшник ¹ (насiння)	1,0					не потр.* (гербицид) 7 (десикант)	не потр.*	3*	
				соняшник (олiя)	не потр.					-	-	-	
				соя ¹ (зерно)	1,0					не потр.* (гербицид) 13* (десикант)	не потр.*	3*	
				соя (олiя)	не потр.					-	-	-	
128	Такомир 40 SL, РК	iмазамокс, 40 г/л	3,0	соя (зерно)	0,5	1	0,04	0,06 заг.-сан.	0,4	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потрапляннi на слизовi оболонки очей, високостiйкий у водi)
				соя (олiя)	не потр.					-	-	-	
				горох (зерно)	0,5					не потр.	не потр.	3	
129	Талер Макс, КС	тебуконазол,	0,03	пшениця	0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	30	не потр.	3	3

		500 г/л		ріпак (насіння)	0,5					50	не потр.	3	(високостій кий у воді)
				ріпак (олія)	0,5					-	-	-	
				соя (зерно)	0,15					30	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
130	Танарт, ВГ	каптан, 780 г/кг	0,1	яблука	0,3	0,3	0,01	0,2 сан.-токс.	1,0	30*	7*	3*	2 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові оболонки очей)
				яблучний сік	0,05					-	-	-	
131	Твікс, КЕ			Контроль за хлорпірифосом				Контроль за хлорпірифосом та циперметрином					2 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові оболонки очей)
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,01	0,3 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,002 заг.-сан.	0,2 трансл.	50	не потр.	4	
		циперметрин, 50 г/л	0,03		0,04	0,2	0,04 — макси- мальна разова; 0,01 — середньо- добова	0,006 сан.-токс.	0,02 трансл.				
		хлорпірифос, 500 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	0,01	0,3 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,002 заг.-сан.	0,2 трансл.	-	-	-	
		циперметрин, 50 г/л	0,03		0,04	0,2	0,04 — максимальна разова; 0,01 — середньо- добова	0,006 сан.-токс.	0,02 трансл.				
132	Теламус, КЕ			Контроль за пропіконазолом, піраклостробіном та боскалідом									3 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові
		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	соняшник (насіння)	0,1	0,5 (с/г роботи), 1,5 (умови	0,001	0,15 орг.	0,2	50*	не потр.*	3*	

						виробництва)						оболонки очей, високостійк ий у воді та ґрунті)			
		піраклостробін, 167 г/л +	0,03		0,2	1,0	/0,01	0,02 заг.-сан.	/0,6						
		боскалід, 133 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4						
		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	соняшник (олія)	не потр.	0,5 (с/г роботи), 1,5 (умови виробництва)	0,001	0,15 орг.	0,2	-	-	-			
		піраклостробін, 167 г/л	0,03		0,2*	1,0	/0,01	0,02 заг.-сан.	/0,6						
		боскалід, 133 г/л	0,04		2,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4						
		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	ріпак (насіння)	0,1	0,5 (с/г роботи), 1,5 (умови виробництва)	0,001	0,15 орг.	0,2	50*	не потр.*	3*			
		піраклостробін, 167 г/л +	0,03		0,2	1,0	/0,01	0,02 заг.-сан.	/0,6						
		боскалід, 133 г/л	0,04		1,0	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4						
		пропіконазол, 200 г/л +	0,04	ріпак (олія)	не потр.	0,5 (с/г роботи), 1,5 (умови виробництва)	0,001	0,15 орг.	0,2	-	-	-			
		піраклостробін, 167 г/л	0,03		0,3	1,0	/0,01	0,02 заг.-сан.	/0,6						
		боскалід, 133 г/л	0,04		не потр.	1,5	0,01	0,03 заг.-сан.	0,4						
133	Тембо, ВГ / Темпріон, ВГ	темботріон, 200 г/кг +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,02	0,1	0,00005	0,0002 сан.-токс.	0,4	не потр.*	не потр.*	3*	2 (високостій кий у воді)		
		ізоксадифен- етил, 100 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.						

		темботріон, 200 г/кг +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.	0,1	0,00005	0,0002 сан.-токс.	0,4	-	-	-		
		ізоксадифен- етил, 100 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.					
134	Темпо, ВГ			<i>Контроль за сумою флонікаміду та метаболітів TFNA та TFNG у перерахунку на флонікамід</i>									2 (високостій кий у воді)	
		флонікамід, 500 г/кг	0,004	яблука²	0,3	1,0	0,002	0,008 сан.-токс,	0,4	35*	7*	3*		
				яблучний сік	0,03					-	-	-		
135	Термекс, СЕ (Termex, SE)			<i>Контроль за мезотріоном, S-метолахлором та тербутилазином</i>								2 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові оболонки очей, високостійк ий у воді)		
		мезотріон, 37,5 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,1	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4	не потр.	не потр.		7	
		S-метолахлор, 375 г/л +	0,01		0,05	0,5	0,02	0,02 сан.-токс.	0,02					
		тербутилазин, 125 г/л	0,003		0,4	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04					
		мезотріон, 37,5 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4	-	-		-	
		S-метолахлор, 375 г/л +	0,01		не потр.	0,5	0,02	0,02 сан.-токс.	0,02					
		тербутилазин, 125 г/л	0,003		не потр.	1,0	0,05	0,005 заг.-сан.	0,04					
		136	Террамін ЕС, КЕ	пендиметалін, 500 г/л	0,008	соняшник (насіння)	0,03	0,5	0,002	0,05 орг.	0,2		не потр.*	не потр.*
соняшник (олія)	не потр.					-	-					-		
соя (зерно)	0,02					не потр.*	не потр.*					3*		
соя (олія)	не потр.					-	-					-		
137	Тіаклотрин М,			<i>Контроль за тіаметоксамом, клотіанідином, бета-цифлутрином</i>										3

	КС	тіаметоксам, 200 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,4	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1	35	не потр.	3	(високостій кий у воді)		
		клотіанідин, 50 г/л +	0,08		0,05	1,5	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.						
		бета-цифлутрин, 50 г/л	0,01		0,1	0,01	0,001	0,001 заг.-сан.	0,04						
		тіаметоксам, 200 г/л +	0,02	ріпак (олія)	не потр.	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1	-	-	-			
		клотіанідин, 50 г/л +	0,08		не потр.	1,5	0,02	0,004 заг.-сан.	0,03 трансл., фітотокс.						
		бета-цифлутрин, 50 г/л	0,01		не потр.	0,01	0,001	0,001 заг.-сан.	0,04						
	138	Тівіант 77 WG, ВГ		Контроль за ізотіанілом та фосетилом алюмінію										2 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові оболонки очей)	
			ізотіаніл, 70 г/кг +	0,01	яблука	0,01	0,7	0,025	0,001 заг.-сан., орг.	0,27	30	7			3
			фосетил алюмінію, 700 г/кг	2,0		10,0	2	0,02	0,3 сан.-токс.	0,50					
ізотіаніл, 70 г/кг +			0,01	яблучний сік	0,01	0,7	0,025	0,001 заг.-сан., орг.	0,27	-	-	-			
фосетил алюмінію, 700 г/кг			2,0		15,0	2	0,02	0,3 сан.-токс.	0,50						
ізотіаніл, 70 г/кг +			0,01	груші	0,01	0,7	0,025	0,001 заг.-сан., орг.	0,27	30	7	3			
фосетил алюмінію, 700 г/кг			2,0		10,0	2	0,02	0,3 сан.-токс.	0,50						
ізотіаніл, 70 г/кг +			0,01	грушевий сік	0,01	0,7	0,025	0,001 заг.-сан., орг.	0,27	-	-	-			
фосетил алюмінію, 700 г/кг			2,0		15,0	2	0,02	0,3 сан.-токс.	0,50						

		ізотіаніл, 70 г/кг +	0,01	Томати	0,01	0,7	0,025	0,001 заг.-сан., орг.	0,27	30	7	3	
		фосетил алюмінію, 700 г/кг	2,0		0,2	2	0,02	0,3 сан.-токс.	0,50				
		ізотіаніл, 70 г/кг +	0,01	томатний сік	0,01	0,7	0,025	0,001 заг.-сан., орг.	0,27	-	-	-	
		фосетил алюмінію, 700 г/кг	2,0		0,1	2	0,02	0,3 сан.-токс.	0,50				
139	Тіома, КС			Контроль за карбендазимом (як сума тіофанат-метилу і карбендазиму)		Контроль за тіофанат-метилом та карбендазимом						3 (високостій кий у воді)	
		тіофанат-метил, 500 г/л	0,08	соняшник (насіння)	0,1	0,1	0,01	0,05 орг.	0,4	30	не потр.	3	
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,1	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1				
		тіофанат-метил, 500 г/л	0,08	соняшник (олія)	не потр.	0,1	0,01	0,05 орг.	0,4	-	-	-	
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		не потр.	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1				
140	Тіофен Турбо, КС			Контроль за карбендазимом (як сума тіофанат-метилу та карбендазиму)		Контроль за тіофанат-метилом		Контроль за карбендазимом					2 (високостій кий у воді)
		тіофанат-метил, 500 г/л	0,08	соняшник (насіння)	0,1	0,1	0,01	0,05 орг.	0,4	42	не потр.	3	
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,1	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1				
		тіофанат-метил, 500 г/л	0,08	соняшник (олія)	не потр.	0,1	0,01	0,05 орг.	0,4				
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		не потр.	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1				

		метилу)											
				Контроль за карбендазимом									
		тіофанат-метил, 500 г/л	0,08	пшениця	0,1	0,1	0,01	0,05 орг.	0,4	35	не потр.	3	
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,1	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1				
				Контроль за карбендазимом									
		тіофанат-метил, 500 г/л	0,08	буряки цукрові	0,5	0,1	0,01	0,05 орг.	0,4	20	не потр.	3	
		карбендазим (метаболіт тіофанат- метилу)	0,01		0,1	0,1	0,001	0,1 орг.	0,1				
141	Токсігрейн (Toxigrain), ТБ			Контроль за фосфіном									1 (небезпечний при потраплянні і на слизові оболонки очей)
		фосфід алюмінію, 560 г/кг		пшениця	0,1	0,1	0,01 — максимальна разова; 0,001 — середньо- добова	0,005 сан.-токс.	0,4	20 ≤МДР	5 < ГДК	5 < Г ДК	
		соя (зерно)		0,05	20 ≤МДР					5 < ГДК	5 < Г ДК		
		соняшник (насіння)		0,05	20 ≤МДР					5 < ГДК	5 < Г ДК		
		складські приміщення, трюми, вагони, контейнери		не потр.	-					5 < ГДК	5 < Г ДК		
142	Тонус, КЕ	піраклостробін, 250 г/л	0,03	соняшник (насіння)	0,2	1,0	0,01	0,02 заг.-сан.	0,6	50	не потр.	3	2 (небезпечний при потраплянні і на слизові оболонки очей)
				соняшник (олія)	0,2					-	-	-	
143	Топал, КЕ			Контроль за сумою тринексапака (кислоти) та її солей, вираженою як тринексапак)								3	
		тринексапак- етил, 175 г/л	0,004	пшениця, ячмінь	0,2*	1,5	0,01	0,005 заг.-сан.	0,6	не потр.*	не потр.*		3*

				ріпак (насіння)	0,2					не потр.*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,05					не потр.*	не потр.*	3*	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
144	Тремізія, КС	Контроль за флуїндапіром та флутріафолом											2 (високостій кий у воді та ґрунті)
		флуїндапір, 240 г/л +	0,004	соняшник (насіння)	0,07	1,0	0,001	0,001 заг.-сан.	0,2	50	не потр.	3	
		флутріафол, 240 г/л	0,01		0,4	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.				
		флуїндапір, 240 г/л +	0,00	соняшник (олія)	0,1	1,0	0,001	0,001 заг.-сан.	0,2	-	-	-	
		флутріафол, 240 г/л	0,01		не потр.	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.				
		флуїндапір, 240 г/л +	0,00	ріпак (насіння)	0,05	1,0	0,001	0,001 заг.-сан.	0,2	50	не потр.	3	
		флутріафол, 240 г/л	0,01		0,2	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.				
		флуїндапір, 240 г/л +	0,00	ріпак (олія)	0,1	1,0	0,001	0,001 заг.-сан.	0,2	-	-	-	
		флутріафол, 240 г/л	0,01		не потр.	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.				

		флуіндапір, 240 г/л +	0,00	пшениця	0,07	1,0	0,001	0,001 заг.-сан.	0,2	35	не потр.	3	
		флутріафол, 240 г/л	0,01		0,1	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.				
145	Трінетил, КЕ			<i>Контроль за сумою тринексапака (кислоти) та її солей, вираженою як тринексапак)</i>									3 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові оболонки очей, високостійк ий у воді)
		трінексапак- етил, 250 г/л	0,004	ріпак (насіння)	0,2	1,5	0,01	0,005 заг.-сан.	0,6	не потр.*	не потр.*	3*	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
146	Троллер, СЕ			<i>Контроль за 2,4-Д</i>		<i>Контроль за 2,4-Д 2- етилгексиловим ефіром</i>		<i>Контроль за флорасуламом</i>	<i>Контроль за 2,4-Д</i>				3 (високостій кий у воді)
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 543,6 г/л +	0,0001	пшениця	0,02	0,5	0,0005	0,002 сан.-токс.	0,1 трансл.	не потр.	не потр.	3	
		флорасулам, 7,5 г/л	0,05		0,01	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 543,6 г/л +	0,0001	кукурудза (зерно)	0,015	0,5	0,0005	0,002 сан.-токс.	0,1 трансл.	не потр.	не потр.	3	
		флорасулам, 7,5 г/л	0,05		0,1	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
		2,4-Д 2-етил- гексиловий ефір, 543,6 г/л +	0,0001	кукурудза (олія)	не потр.	0,5	0,0005	0,002 сан.-токс.	0,1 трансл.	-	-	-	
		флорасулам, 7,5 г/л	0,05		не потр.	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
147	Фаворит 300, РК	клопіралід, 300 г/л	0,15	жито	0,2*	2	/0,01	0,04 сан.-токс.	0,1	не потр.*	не потр.*	3*	2 (небезпечн ий при потраплянн
				буряк білий столовий	0,1*					не потр.*	не потр.*	3*	

				льон- довгунець	не потр.					не потр.*	не потр.*	3*	і на слизові оболонки очей, високостійк ий у воді)
148	Фантастік, МД			<i>Контроль за мезотріоном, нікосульфуроном та тієнкарбазон-метилом</i>		<i>Контроль за мезотріоном</i>		<i>Контроль за мезотріоном, нікосульфуроном та тієнкарбазон-метилом</i>					3 (високостій кий у воді)
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (зерно)	0,1	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4	не потр.*	не потр.*	3*	
		нікосульфурон, 30 г/л +	2,0		0,01	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2				
		тієнкарбазон- метил, 10 г/л +	0,05		0,4	1,0	0,02	0,01 заг.-сан.	0,4				
		ципросуль- фамід, 15 г/л (антидот)	не потр.*		не потр.*	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.*				
		мезотріон, 75 г/л +	0,001	кукурудза (олія)	не потр.	0,2	0,006	0,02 сан.-токс.	0,4	-	-	-	
		нікосульфурон, 30 г/л +	2,0		не потр.	1,0	0,01	0,001 заг.-сан.	0,2				
		тієнкарбазон- метил, 10 г/л +	0,05		не потр.	1,0	0,02	0,01 заг.-сан.	0,4				
		ципросуль- фамід, 15 г/л (антидот)	не потр.		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				
149	Феномен Прайм, ВГ	каптан, 780 г/кг	0,1	яблука ²	0,3	0,3	0,01	0,2 сан.-токс.	1,0	30	7	3	2 (небезпечн ий при потраплянн і на слизові оболонки очей)
				яблучний сік	0,05					-	-	-	
150	Фенс, СК	тефлутрин, 200 г/л	0,005	соняшник (насіння)	0,05	0,1 алерген	0,007	0,001 заг.-сан.	0,2	не потр.*	не потр.*	не потр. *	2

				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				кукурудза (зерно)	0,2					не потр.*	не потр.*	не потр. *	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				буряки цукрові	0,06					не потр.*	не потр.*	не потр. *	
151	Фламіприд, КС			Контроль за флuben- діамідом та ацета- міпридом, в оліях — за флuben- діамідом	Контроль за флubenдіамідом та ацетаміпридом								3 (високостій- кий у воді та ґрунті)
		флubenдіамід, 350 г/л +	0,003	кукурудза (зерно)	0,05	0,2	0,001	0,003 заг.-сан.	0,25 трансл.	55*	не потр.*	3*	
		ацетаміприд, 150 г/л	0,01		0,01	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1				
		флubenдіамід, 350 г/л +	0,003	кукурудза (олія)	0,2	0,2	0,001	0,003 заг.-сан.	0,25 трансл.	-	-	-	
		ацетаміприд, 150 г/л	0,01		не потр.	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1				
		флubenдіамід, 350 г/л +	0,003	соя (зерно)	0,05	0,2	0,001	0,003 заг.-сан.	0,25 трансл.	55*	не потр.*	3*	
		ацетаміприд, 150 г/л	0,01		0,1	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1				
		флubenдіамід, 350 г/л +	0,003	соя (олія)	0,2	0,2	0,001	0,003 заг.-сан.	0,25 трансл.	-	-	-	
		ацетаміприд, 150 г/л	0,01		не потр.	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1				
		флubenдіамід, 350 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,05	0,2	0,001	0,003 заг.-сан.	0,25 трансл.	50*	не потр.*	3*	

		ацетаміприд, 150 г/л	0,01		0,1	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1				
		флубендіамід, 350 г/л +	0,003	соняшник (олія)	0,2	0,2	0,001	0,003 заг.-сан.	0,25 трансл.	-	-	-	
		ацетаміприд, 150 г/л	0,01		не потр.	0,2	0,003	0,02 сан.-токс.	0,1				
152	Флойд Некст, КЕ	флуазифоп-п- бутил, 150 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,02	0,5	0,01	0,01 заг.-сан., орг.	0,3	не потр.*	не потр.*	3*	3
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				соя (зерно)	0,03					не потр.*	не потр.*	3*	
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				буряки цукрові	0,02					не потр.*	не потр.*	3*	
153	Флоніки 500, ВГ				<i>Контроль за сумою флонікаміду та метаболітів TFNA та TFNG у перерахунку на флонікамід</i>								3 (небезпечний при потраплянні і на слизові оболонки очей, високостійкий у воді) та ґрунті)
		флонікамід, 500 г/кг	0,004	яблука	0,3	1,0	0,002	0,008 сан.-токс,	0,4	35*	7*	3*	
				яблучний сік	0,03					-	-	-	
				Томати	0,5*					35*	7*	3*	
				томатний сік	0,03*					-	-	-	
154	Флуорит SC, КС	флутріафол, 400 г/л	0,01	пшениця	0,1	0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	0,001	0,006 сан.-токс.	0,1 трансл.	30*	не потр.*	3*	3 (високостійкий у воді та ґрунті)
155	Хаксар 750, РК	2-метил- 4-хлорфенокси- оцтової кислоти (2М-4Х (МСРА) диметиламінна сіль, в перерахунку на 2М-4Х	0,008	пшениця, ячмінь, тритікале, жито, овес, сорго (просо)	0,2	1,0	0,02	0,003 орг.	0,02	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні і на слизові оболонки очей)
				горох (зерно)	0,1					не потр.	7	3	

		(МСПА), 750 г/л		кукурудза (зерно)	0,1					не потр.	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.					-	-	-	
				Картопля	0,05					не потр.	7	3	
				льон-довгунець	не потр.					не потр.	не потр.	3	
156	Харбор, КС			Контроль за тіаметоксамом та біфентрином									3 (високостійкий у воді та ґрунті)
		тіаметоксам, 150 г/л +	0,02	ріпак (насіння)	0,4	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1	30**	не потр.**	4**	
		біфентрин, 170 г/л	0,02		0,2	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1				
		тіаметоксам, 150 г/л +	0,02	ріпак (олія)	не потр.	0,5 аерозоль	0,03	0,04 сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		біфентрин, 170 г/л	0,02		0,3	0,01	0,001	0,005 заг.-сан.	0,1				
157	Харума, КЕ	хізалофоп-етил, 125 г/л	0,01	льон-довгунець (технічні цілі)	не потр.	0,2	0,04	0,0001 заг.-сан.	0,8	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
158	Харума Макс, КЕ	хізалофоп-етил, 150 г/л	0,01	соя (зерно)	0,1	0,2	0,04	0,0001 заг.-сан.	0,8	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				соя (олія)	не потр.					-	-	-	
				соняшник (насіння)	0,1					не потр.	не потр.	3	
				соняшник (олія)	не потр.					-	-	-	
				ріпак (насіння)	0,2					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	

				буряки цукрові	0,05					не потр.	не потр.	3	
				Льон	не потр.					не потр.	не потр.	3	
159	Хінгіос 75 OD, МД	прогексадіон кальцію, 75 г/л	0,02	ріпак (насіння)	0,01	1,0	0,01	0,03 заг.-сан.	0,2	50*	не потр.*	3*	2 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, алерген)
				ріпак (олія)	не потр.					-	-	-	
160	Хурон 574 SC, КС			Контроль за флуфенацетом та дифлюфеніканом									
		флуфенацет, 312 г/л +	0,004	пшениця	0,1*	0,7	0,001	0,002 заг.-сан., сан.-токс.	0,2	не потр.*	не потр.*	3*	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
		дифлюфенікан, 250 г/л +	0,05		0,02*	0,5	0,001	0,15 сан.-токс.	0,15				
		флорасулам, 7,5 г/л	0,05		0,01	1,0	0,003	0,1 сан.-токс.	0,05 фітотокс.				
161	Цензор Part D SC, КС	дифеноконазол, 400 г/л	0,002	соняшник (насіння)	0,05	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	50	не потр.	3	3 (високостійкий у воді)
				соняшник (олія)	0,4					-	-	-	
				соя (зерно)	0,05					40	не потр.	3	
				соя (олія)	0,1					-	-	-	
				пшениця	0,05					35	не потр.	3	
162	Церекарб, КЕ (Cerecarb, ЕС)	просульфокарб, 800 г/л	0,001	пшениця, ячмінь	0,01	0,7	0,01	0,002 заг.-сан., сан.-токс.	0,3	не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на шкіру та слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
163	Цукрон Турбо,			Контроль за клопіралідом		Контроль за клопіралідом		Контроль за клопіралідом					3

	МЕ			та флуроксипіром		та флуроксипір-ментилом		та флуроксипіром					(високостійкий у воді)
		клопіралід, 100 г/л +	0,15	ріпак (насіння)	0,2	2,0	0,01	0,04 сан.-токс.	0,1	не потр.	не потр.	3	
		флуроксипір 1-метилгептиловий ефір, 21,6 г/л	0,2		0,05	1,0	0,003	0,01 заг.-сан.	0,2				
		клопіралід, 100 г/л +	0,15	ріпак (олія)	не потр.	2,0	0,01	0,04 сан.-токс.	0,1	-	-	-	
		флуроксипір 1-метилгептиловий ефір, 21,6 г/л	0,2		не потр.	1,0	0,003	0,01 заг.-сан.	0,2				
164	Шлях, КЕ			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та тебуконазолом		Контроль за протіоконазолом (2) та тебуконазолом		Контроль за протіоконазолом-дестіо (1) та тебуконазолом					3 (високостійкий у воді)
		тебуконазол, 160 г/л +	0,03	ріпак (насіння)	0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	30*	не потр.*	3*	
		протіоконазол, 80 г/л	0,001 (1,2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		тебуконазол, 160 г/л +	0,03	ріпак (олія)	0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	-	-	-	
		протіоконазол, 80 г/л	0,001 (1,2)		не потр.	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				
		тебуконазол, 160 г/л +	0,03	Пшениця	0,2	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0	30*	не потр.*	3*	
		протіоконазол, 80 г/л	0,001 (1,2)		0,1 (1)	0,2 (2)	0,003 (2)	0,001 (2) заг.-сан.	0,2 (1)				

* — термін дії нормативу — 3 роки.

** — термін дії нормативу — 2 роки.

¹ Препарат рекомендовано для внесення з повітря за допомогою безпілотного повітряного судна (БПС).

² Препарат рекомендовано для роздрібного продажу населенню.» .

{Зміни із з змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 694 від 22.04.2025}

**В. о. Директора департаменту
громадського здоров'я**

Ігор ПОВОРОЗНИК