

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
06 червня 2025 року № 954

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 червня 2025 року
за № 978/44384

Зміни

до Державних медико-санітарних нормативів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів,
затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 02 лютого 2016 року № 55,
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2016 року за № 207/28337
(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України від 28 травня 2020 року № 1276)

1. У таблиці 6:

1) рядок 7 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	Актуптенд Мікс, ТН (Actuptend Mixx, FS)			Контроль за тіаметоксамом						не потр.	не потр.	не потр.	3 (високостійкий у воді)
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	пшениця, ячмінь	0,2	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,02	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		0,05	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	соя (зерно)	0,04	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не потр.	не потр.	не потр.	

		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,4	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		0,05	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	соя (олія)	не потр.	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	—	—	—	
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		не потр.	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		не потр.	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				
		тіаметоксам, 262,5 г/л +	0,02	картопля	0,08	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1	не потр.	не потр.	не потр.	
		флудіоксоніл, 25 г/л +	0,015		0,02	/1,0	/0,002	0,1/ орг.	/0,2				
		дифеноконазол, 25 г/л	0,002		0,08	/0,2	/0,001	0,001/ сан.-токс.	/0,3				

»;

2) рядок 51 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
51	Джоуст Про, КС			Контроль за протіоконазолом-дестіо (1), протіоконазолом (2), азоксистробіном									2 (високостійкий у воді)
		протіоконазол, 150 г/л	0,001 (1,2)	пшениця	0,1 (1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)	35	не потр.	3	
		азоксистробін, 150 г/л	0,03		0,5*	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (насіння)	0,1 (1)	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)	50	не потр.	3	

		азоксистробін, 150 г/л	0,03		0,2	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				
		протіоконазол, 150 г/л +	0,001 (1,2)	соняшник (олія)	не потр.	/0,2 (2)	/0,003 (2)	0,001/ (2) заг.- сан.	/0,2 (1)	—	—	—	
		азоксистробін, 150 г/л	0,03		не потр.	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,3				

»;

3) рядок 70 викласти у такій редакції:

«

70	Карнадін, РК (Carnadine, SL)	ацетаміпрід, 200 г/л	0,01	ріпак (насіння)	0,05	/0,2	/0,003	0,02/ сан.- токс.	/0,1	35	не потр.	3	3 (високостійкий у воді)
				ріпак (олія)	не потр.					—	—	—	

»;

4) рядок 72 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
72	Керамокс Екстра (Ceramox Xtra), ВГ	фамоксадон, 250 г/кг +	0,01	<i>Контроль за фамоксадоном та цимоксанілом</i>						40	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей)
				соняшник (насіння)	0,04	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4				
		цимоксаніл, 250 г/кг	0,05		0,04	/1,0	/0,03	0,06/ сан.- токс.	/0,04				
		фамоксадон, 250 г/кг +	0,01	соняшник (олія)	0,1	/1,0	/0,01	0,01/ заг.-сан.	/0,4	—	—	—	
		цимоксаніл, 250 г/кг	0,05		не потр.	/1,0	/0,03	0,06/ сан.- токс.	/0,04				

»;

5) рядок 75 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

75	Колам Плюс, ФК (Colam Plus, ZC)	Контроль за лямбда-цигалотрином та тіаметоксамом								35	не потр.	4	2
	лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	пшениця, ячмінь	0,05	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05					
	тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,2	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1					
	лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	соняшник (насіння)	0,2	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05	30	не потр.	4		
	тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,4	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1					
	лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	соняшник (олія)	0,4	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05	—	—	—		
	тіаметоксам, 141 г/л	0,02		не потр.	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1					
	лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	картопля	0,01	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05	20	10	4		
	тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,08	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1					
	лямбда-цигалотрин, 106 г/л +	0,003	буряки цукрові	0,01	/0,1 небезпечний при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/сан.-токс.	/0,05	30	не потр.	4		
	тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,1	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/сан.-токс.	/0,1					
	лямбда-	0,003	томати	0,01	/0,1	/0,001	0,01/	/0,05	20	10	4		

		цигалотрин, 106 г/л +				небезпечни й при потраплянні на шкіру		сан.-токс.					
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,04	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л +	0,003	томатний сік	0,05	/0,1 небезпечни й при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	—	—	—	
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,1	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л +	0,003	яблука	0,01	/0,1 небезпечни й при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	30	10	4	
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,1	/0,5 аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				
		лямбда- цигалотрин, 106 г/л +	0,003	яблучний сік	0,05	/0,1 небезпечни й при потраплянні на шкіру	/0,001	0,01/ сан.-токс.	/0,05	—	—	—	
		тіаметоксам, 141 г/л	0,02		0,05	/0,5 Аерозоль	/0,03	0,04/ сан.-токс.	/0,1				

»;

6) рядок 79 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
79	Кромстар Плюс, КС (Kromstar Plus, SC)	пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	Контроль за пікоксистробіном та ципроконазолом						35	не потр.	3	2 (високостійкий у воді та ґрунті)
				пшениця	0,05	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2				

		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,05	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01			
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	буряки цукрові	0,05	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	35	7	3
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,1	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01			
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,1	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	35	не потр.	3
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01			
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	соя (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	—	—	—
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01			
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,1	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	50	не потр.	3
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01			
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	—	—	—
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01			
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	ріпак (насіння)	0,1	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	40	не потр.	3
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01			
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	ріпак (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	—	—	—

		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,1	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	35	не потр.	3	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		0,2	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				
		пікоксистробін, 200 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,003/ заг.- сан.	/0,2	—	—	—	
		ципроконазол, 80 г/л	0,002		не потр.	/0,1	/0,01	0,03/ сан.- токс.	/0,01				

»;

7) рядки 111, 112 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
111	Пресслар Плюс, CE (Presslar Plus, SE)			Контроль за пропізохлором та тербутилазином						не потр.	не потр.	3	3 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	кукурудза (зерно)	0,2	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6				
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,4	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	кукурудза (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	—	—	—	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соя (зерно)	0,2	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,2	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л	0,01	соя (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	—	—	—	

		+ тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соняшник (насіння)	0,2	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		0,4	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
		пропізохлор, 450 г/л +	0,01	соняшник (олія)	не потр.	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	—	—	—	
		тербутилазин, 187,5 г/л	0,003		не потр.	/1,0	/0,05	0,005/ заг.- сан.	/0,04				
112	Пресслар, KE (Presslar, EC)	пропізохлор, 720 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,2	/1,0	/0,01	0,002/ орг.	/0,6	не потр.	не потр.	3	3 (високостійкий у воді)
				соняшник (олія)	не потр.					—	—	—	
				соя (зерно)	0,2					не потр.	не потр.	3	
				соя (олія)	не потр.					—	—	—	
				ріпак (насіння)	0,2					не потр.	не потр.	3	
				ріпак (олія)	не потр.					—	—	—	
				кукурудза (зерно)	0,2					не потр.	не потр.	3	
				кукурудза (олія)	не потр.					—	—	—	

»;

8) рядок 121 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----

121	Рейнпріта Плюс, КС (Rainprita Plus, SC)			Контроль за імідаклопридом		Контроль за імідаклопридом та бета- цифлутрином		Контроль за імідаклопридом					2 (високостійки й у воді)
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	пшениця, ячмінь	0,1	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	35	не потр.	3	
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,05	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	соя (зерно)	0,05	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	50	не потр.	3	
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,02	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	соя (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	—	—	—	
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		не потр.	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	ріпак (насіння)	0,1	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	40	не потр.	3	
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,1	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	ріпак (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	—	—	—	
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		не потр.	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л +	0,06	кукурудза (зерно)	0,05	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	40	не потр.	3	
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,05	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л	0,06	кукурудза (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	—	—	—	

		+											
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,1	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л	0,06	соняшник (насіння)	0,05	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	35	не потр.	3	
		+											
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,05	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04				
		імідаклоприд, 100 г/л	0,06	соняшник (олія)	не потр.	/0,2	/0,005	0,007/ заг.-сан.	/0,04	—	—	—	
		+											
		бета-цифлутрин, 12,5 г/л	0,01		0,1	/0,01	/0,001	0,001/ заг.-сан.	/0,04				

»;

9) рядок 146 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
146	Тетрапрід Плюс, КС (Tetraprid Plus SC)			<i>Контроль за сумою спіротетрамату і спіротетрамат- єнолу, вираженою як спіротетрамат, та тіаклопридом</i>		<i>Контроль за спіротетраматом та тіаклопридом</i>							2 (високостійки й у воді)
		спіротетрамат, 120 г/л	0,01	соняшник (насіння)	0,04	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	45	не потр.	3	
		+											
		тіаклоприд, 120 г/л	0,006		0,02	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.- мігр., фітотокс.				
		спіротетрамат, 120 г/л	0,01	соняшник (олія)	0,04	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	—	—	—	
		+											
		тіаклоприд, 120 г/л	0,006		не потр.	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.- мігр., фітотокс.				
		спіротетрамат, 120 г/л	0,01	ріпак	0,04	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	45	не потр.	3	

		120 г/л + тіаклоприд, 120 г/л	0,006	(насіння)	0,05	/0,3	/0,002	заг.-сан. 0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.- мігр., фітотокс.				
		спіротетрамат, 120 г/л + тіаклоприд, 120 г/л	0,01	ріпак (олія)	0,04	/1,0	/0,003	0,005/ заг.-сан.	/0,25	—	—	—	
		тіаклоприд, 120 г/л	0,006		0,05	/0,3	/0,002	0,005/ заг.-сан.	0,09/ водн.- мігр., фітотокс.				

»;

10) рядок 150 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
150	Трісолот Мікс, МД (Trisolut Mixx OD)			<i>Контроль за М-4-хлор- феноксиоцтовою кислотою (2М-4Х) (1), мезосульфурон- метилом та флорасуламом</i>		<i>Контроль за 2М- 4Х ІОЕ</i>	<i>Контроль за М-4-хлорфеноксиоцтовою кислотою (2М-4Х) (1), мезосульфурон-метилом та флорасуламом</i>						3
		2-метил- 4-хлорфенокси- оцтової кислоти ізооктиловий ефір (2М-4Х ІОЕ), 240 г/л + мезосульфурон- метил, 9 г/л + флорасулам, 6 г/л + мефенпір-діетил,	0,008 (1)	пшениця, ячмінь	0,2 (1)	/ 1,0 (2)	/0,02 (1)	0,003/ орг. (1)	/0,02 (1)	не потр.	не потр.	3	
			0,1		0,01	/0,6	/0,02	0,001/ заг.-сан.	/0,2				
			0,05		0,01	/1,0	/0,003	0,1/ ан.- токс.	0,05/ фітотокс.				
			не		не потр.	не потр.	не потр.	не потр.	не потр.				

		25,2 г/л (антидот)	потр.										
--	--	-----------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

»;

11) рядки 155, 156 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
155	Флока Екстра, ВГ (Floca Xtra, WG)	флонікамід, 500 г/кг	0,004	Контроль за сумою флонікамідів та метаболітів TFNA та TFNG у перерахунку на флонікамід		/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	35 —	7 —	3 —	2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)
				яблука	0,3								
				яблучний сік	0,03								
				Яблучний сік не рекомендується для використання у дитячому харчуванні									
				ріпак (насіння)	0,06								
				ріпак (олія)	не потр.								
				картопля	0,09					49 — 28	не потр. — 7	3 — 3	
156	Флоупрід Плюс, ВГ (Flowprid Plus, WG)			Контроль за сумою флонікамідів та метаболітів TFNA та TFNG у перерахунку на флонікамід, та ацетаміпридом		Контроль за флонікамідом та ацетаміпридом						2 (небезпечний при потраплянні на слизові оболонки очей, високостійкий у воді)	

		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	яблука	0,3	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	42	7	3	
		ацетаміприд, 150 г/кг	0,01		0,05	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	яблучний сік	0,03	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	—	—	—	
		ацетаміприд, 150 г/кг	0,01		0,01	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	ріпак (насіння)	0,06	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	49	не потр.	3	
		ацетаміприд, 150 г/кг	0,01		0,05	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	ріпак (олія)	не потр.	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	—	—	—	
		ацетаміприд, 150 г/кг	0,01		не потр.	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	соя (зерно)	0,06	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	56	не потр.	3	
		ацетаміприд, 150 г/кг	0,01		0,1	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				
		флонікамід, 200 г/кг +	0,004	соя (олія)	не потр.	/1,0	/0,002	0,008/ сан.-токс,	/0,4	—	—	—	
		ацетаміприд, 150 г/кг	0,01		не потр.	/0,2	/0,003	0,02/ сан.-токс.	/0,1				

».

2. У таблиці 7:

рядок 28 викласти у такій редакції:

«

28	Веранго 400 SC, КС	флуопірам, 400 г/л	0,01	картопля	0,03	1,0	0,003	0,02 сан.- токс., заг.-сан.	0,08	не потр. (внесення в борозни	не потр.	не потр. (внесен ня	2 (високостійки й у воді
----	-----------------------	-----------------------	------	----------	------	-----	-------	-----------------------------------	------	------------------------------------	----------	---------------------------	--------------------------------

				цибуля (ріпка)	0,1					грунту при садінні)	3 (після штангово ї обробки грунту) 7 (після крапельн ого поливу)	в борозн и ґрунту при садінні)	та ґрунті)
				Томати	0,1					20	3 (після штангово ї обробки грунту) 7 (після крапельн ого поливу)	3	
				томатний сік	0,05					—	—	—	
				Суниця	0,1					14	3 (після штангово ї обробки грунту) 7 (після крапельн ого поливу)	3	
				суничний сік	0,05					—	—	—	

»;

2) після рядка 58 доповнити рядком 59 такого змісту:

«

59	Камео 75, ВГ / Пойнтер, 75, ВГ	трибенурон-метил, 750 г/кг	0,005	соняшник (насіння)	0,02	0,1	0,003	0,06 заг.- сан.	0,01	не потр.	не потр.	3	3 (високостійки й у воді)
				соняшник (олія)	не потр.					—	—	—	

»;

У зв'язку з цим рядки 59–164 вважати відповідно рядками 60–165.

3) рядок 78 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
78	Магнелло 350 ЕС, КЕ			<i>Контроль за дифеноконазолом та тебуконазолом</i>									2 (високостійки й у воді та ґрунті)
		дифеноконазол, 100 г/л +	0,002	ріпак (насіння)	0,1	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	50	не потр.	3	
		тебуконазол, 250 г/л	0,03		0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				
		дифеноконазол, 100 г/л +	0,002	ріпак (олія)	0,2	0,2	0,001	0,001 сан.-токс.	0,3	—	—	—	
		тебуконазол, 250 г/л	0,03		0,5	0,4	0,02	0,025 заг.-сан.	1,0				

»;

4) рядок 122 викласти у такій редакції:

«

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
122	СПАТАРО, КС			<i>Контроль за сумою спіротетрамату і спіротетрамат- енолу, вираженою як спіротетрамат</i>									3

		спіротетрамат, 100 г/л	0,01	яблука	0,3	1,0	0,003	0,005 заг.-сан.	0,25	21*	7*	3*	
				яблучний сік	0,1					—	—	—	
				томати	1,0					21*	7*	3*	
				томатний сік	0,1					—	—	—	

».

{Зміни до Державних медико-санітарних нормативів із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони здоров'я № 1032 від 27.06.2025}